Feldşer

1) Təmizləyici imaləyə əks-göstəriş hansıdır?

A) Dərman imaləsindən əvvəl
B) Qanayan babasil olduqda
C) Bağırsaq keçməməzliyi olduqda
D) Qarın boşluğundakı əməliyyatlardan əvvəl
E) Doğuşdan əvvəl

Ədəbiyyat:C.N.Hacıyev, R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh.203 “Təhsil” Bakı 1998

2) Mədə qanaxmasında həkimə qədər yardıma nə daxildir?

A) Aclıq və buz qovuğunun tətbiqi
B) Qansaxlayıcı preparatlar, buz qovuğunun tətbiqi
C) Aclıq və qansaxlayıcı preparatların tətbiqi.
D) Mədənin yuyulması, buz qovuğunun tətbiqi
E) Spazmolitik preparatlar, buz qovuğunun tətbiqi

Ədəbiyyat:: C.N.Hacıyev, R.Y.Əliyev.Xəstələrə qulluq. Səh.188 “Təhsil” Bakı 1998

3) 1 Təsir Vahidi (TV) insulin 5 qr qlükozanı qlikogenə çevirirsə , 200 qram qlükozanı qlukogenə çevirmək üçün neçə TV insulin götürülməlidir?

A) 60 TV
B) 10 TV
C) 25 TV
D) 20 TV
E) 40 TV

Ədəbiyyat:N .R Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı “.Səh.158“ Çıraq “ 2008.

4) Sidik ifrazının azalması necə adlanır?

A) Poliuriya
B) Oliquriya
C) Anuriya
D) Nikturiya
E) Opsouriya

Ədəbiyyat:: C.N.Hacıyev, R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq .Səh.223 “Təhsil”Bakı1998/

5) Sidikdə qanın olması necə adlanır?

A) Nikturiya
B) Hematuriya
C) Qlükozuriya
D) Albuminurieya

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Piuriya

Ədəbiyyat:: C.N. Hacıyev, R.Y. Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh. 224 “Təhsil” Bakı1998

6) Qazçıxarıcı borunu bağırsaqda maksimum nə qədər saxlamaq olar?

A) 30 dəqiqə
B) 1, 5 saat
C) 3 saat
D) 45 dəqiqə
E) 1 saat

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı” Səh.27” “Çıraq” 2008.

7) Onikibarmaq bağırsaq xorasında ağrılar nə vaxt müşahidə edilir?

A) Gecə və acqarına
B) Qida qəbulundan dərhal sonra
C) Qida qəbulundan 2 - 3 saat sonra
D) Qida qəbulundan 15 - 30 dəq sonra
E) Qida qəbulu zamanı

Ədəbiyyat: :N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı” Səh.147 “Çıraq” 2008

8) Tənəffüsün olması necə təyin edilir?

A) Ağız boşluğuna nəzarət etməklə
B) Döş qəfəsinin hərəkətinə nəzarət, tənəffüs küylərinə qulaq asmaqla
C) Xəstənin ağzına güzgü yaxınlaşdırmaqla
D) Xəstənin rənginə nəzarət etməklə
E) Ətrafların hərəkətlərinə nəzarət etməklə

Ədəbiyyat:N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı” Səh. 5 “Çıraq” 2008

9) Duodenal zondlama zamanı neçə porsiya öd götürülür?

A) 3
B) 2
C) 5
D) 1
E) 4

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”.Səh.36 “Çıraq” 2008.

10) Aşağıdakılardan hansı instrumental müayinəyə aid deyil?

A) Palpasiya
B) EKQ (elektrokardioqrafiya)
C) Kompyuter tomoqrafiyası
D) EXQ (exokardioqrafiya)
E) Ultrasəs müayinəsi

Ədəbiyyat:С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными. Стр. 24 «Медицина» Москва 1989

11) Əzələdaxili inyeksiya hansı bucaq altında aparılır?

A) 75°
B) 60°
C) 45°
D) 30°
E) 90°

Ədəbiyyat:C.N.Hacıyev. R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq .Səh.152 “Təhsil” Bakı 1998.

12) Hipovolemik şok zamanı təxirəsalınmaz yardımın əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

A) Dövr edən qanın həcminin bərpası
B) Damar büzücü preparatların vena daxilinə yeridilməsi
C) Qanəvəzedicilərin köçürülməsi
D) Dehidratasiya
E) Ürəyin yığılma fəaliyyətinin stimulyasiyası

Ədəbiyyat: «Справочнык врача скорой и неотложной помощи».«Феникс» 2001.Стр102-103.

13) Anafilaktik şok zamanı aşağıdakılardan hansı ilk növbədə yerinə yetirilməlidir?

A) Vena daxilinə steroid hormonlar yeridilir
B) Əzələ daxilinə pipolfen məhlulu (2, 5 % - 2 - 4 ml) yeridilir
C) Dərman yeridilən yerə adrenalin məhlulu (0, 1 % - 0, 5 ml, d/a) vurulur
D) Xəstəni intubasiya edirlər
E) Dərmanın yeridilməsi dayandırılır, dərman yeridilən yerdən yuxarıda jqut qoyulur

Ədəbiyyat:: «Справочнык врача скорой и неотложной помощи». «Феникс» 2001.Стр105

14) Yoğun bağırsağın selikli qişasının endoskopik müayinəsi necə adlanır?

sinik.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Sistoskopiya
B) Qastroskopiya
C) Ezofaqoskopiya
D) Duodenoskopiya
E) Kolonoskopiya

Ədəbiyyat:C.N.Hacıyev. R.Y..Əliyev. Xəstələrə qulluq . Səh.217. “Təhsil” Bakı 1998.

15) Alimentar yolla orqanizmə daxil olan zəhərli maddələri çıxarmaq üçün hansı imalədən isitfadə olunur?

A) Qidalandırıcı
B) Təmizləyici
C) Dərman
D) Sifon
E) Yağlı

Ədəbiyyat:: C.N.Hacıyev. R.Y.Əliyev . Xəstələrə qulluq . Səh.203 “Təhsil” Bakı 1998

16) Mədə qanaxması zamanı istifadə olunan preparatlar hansılardır?

A) Aspirin, prednizolon
B) Dimedrol, kordiamin
C) Heparin, dibazol
D) Aminokapron turşusu, jelatinol
E) Fentanil, relanium

Ədəbiyyat:: В.М.Богомобов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр. 353

17) 1 ml – də neçə vahid insulin vardır?

A) 10 vahid
B) 30 vahid
C) 20 vahid
D) 25 vahid
E) 40 vahid

Ədəbiyyat:N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı “. Səh.159 “Çıraq “2008.

18) Tibbi bankaları hansı nahiyəyə qoymaq olmaz?

A) Döş qəfəsinin yan tərəflərinə
B) Döş qəfəsinin aşağı hissəsinə
C) Onurğa ətrafı nahiyəyə
D) Onurğaya
E) Kürəkaltı nahiyəyə

Ədəbiyyat:: C.N. Hacıyev. R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh.113. “Təhsil”. Bakı 1998

snsk.az ödənissiz istifadə üçün

19) Şəkərli diabet zamanı qanda nə müşahidə edilir?

A) Hiperqlikemiya
B) Hiperproteinemiya
C) Hiperbilirubinemiya
D) Hipoproteinemiya
E) Hipoqlikemiya

Ədəbiyyat: N.R. Paleyevin redaktəsi ilı “Tibb bacısının məlumat kitabı” .Səh. 158 “Çıraq” 2008.

20) Şəkərli diabet xəstəliyinin ağırlaşması nə ola bilər?

A) Ürək çatmamazlığı
B) Metabolik alkaloz
C) Hipertonik kriz
D) Hiperqlikemik koma
E) Metabolik asidoz

Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.159 “Çıraq” 2008

21) Hiperqlikemik koma zamanı xəstənin nəfəsində hansı iy hiss olunur?

A) Aseton iyi
B) Ammonyak iyi
C) Alkoqol iyi
D) Heç nə hiss olunmur
E) Lax yumurta iyi

Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.159 “Cıraq” 2008.

22) Dərman maddələrinin vena daxilinə yeridilməsinin əsas üstünlüyü nədən ibarətdir?

A) Müxtəlif dərman preparatlarının yeridilə bilməsi
B) Təxirəsalınmaz yardım zamanı effektin tez əldə edilməsi
C) Asan olması
D) Allegik reaksiyanın olmaması
E) Qaraciyərin baryer rolunun kənarda qalması

Ədəbiyyat:: Qaqunova Y.Y “Xəstələrə ümumi qulluq”. Səh 182-186. “Maarif” 1974

sesk.az ödənişsiz istifadə üçün

23) Yataq yaralarının yaranmaması üçün ağır xəstələrin vəziyyətini neçə saatdan bir dəyişmək lazımdır?

A) 2
B) 1
C) 1, 5
D) 3
E) 2, 5

Ədəbiyyat:C.N. Hacıyev. R .Y. Əlyev. Xəstələrə qulluq. Səh.63 “Təhsil” Bakı 1998.

24) Aşağıdakılardan hansı obyektiv metoda aid deyil?

A) Baxış
B) Auskultasiya
C) Palpasiya
D) Anamnez (sorğu)
E) Perkussiya

Ədəbiyyat:В.М.Богомобов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр. 150

25) Bayılma zamanı istifadə olunan dərmanlar hansılardır?

A) Analgin, fentanil
B) Kordiamin, mezaton
C) Strofantin, eufillin
D) Prednizolon, poliqlükin
E) Vikasol, qlükoza

Ədəbiyyat:: В.М.Богомобов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр. 321

26) Endemik urun profilaktikası üçün hansı məhsulları yodlaşdırırlar?

A) Ət məhsulları
B) Xörək duzu
C) Qənd, konfet
D) Süd məhsulları
E) Bitki yağları

Ədəbiyyat:N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı” .Səh. 117. “Çıraq” 2008

27) Qanın ümumi analizində nəyi müəyyən etmək olmur?
A) Hemoqlobini
B) Hormonları
C) Leykositləri
D) Eritrositlərin çökmə sürətini
E) Eritrositləri

sua.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh. 27 “Çıraq” 2008

28) UYT (ultra yüksək tezlikli) cərəyan ilə müalicə zamanı xəstə nə hiss edir?

A) Sancma
B) Tirtrətmə
C) Vibrasiya
D) Yüngül istilik
E) Qarışqa gəzintisi

Ədəbiyyat:: Y.İ. Pasınkov. Umumi fizioterapiya. Səh.112 “Maarif” Bakı 1980

29) Plevral punksiya hansı nahiyədə aparılır?

A) Döş qəfəsi, orta qoltuqaltı xətt, VI-VII qabırğaarası nahiyə
B) Döş qəfəsi, arxa qoltuqaltı xətt, VI-VII qabırğaarası nahiyə
C) Döş qəfəsi, ön qoltuqaltı xətt, VII-VIII qabırğaarası nahiyə
D) Döş qəfəsi, ön qoltuqaltı xətt, V-VI qabırğaarası nahiyə
E) Döş qəfəsi, arxa qoltuqaltı xətt, VII-VIII qabırğaarası nahiyə

Ədəbiyyat:: В.М.Богомобов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр. 94-95

30) Masaj qaydalarına uyğun gəlməyən nədir?

A) Masaj otağının hərarəti + 35° - 37 ° olmalıdır
B) 1 çarpayı üçün 8 m² sahə ayrılmalıdır
C) İşıqlı olmalıdır
D) Hava quru olmalıdır
E) Ventilyasiyalı olmalıdır

Ədəbiyyat:Y.İ.Pasınkov. Ümumi fizioterapiya. Səh.278 “Maarif” Bakı 2008

31) Masaj zamanı dəri qıcıqlanmasın deyə nədən istifadə etmək olmaz?

A) Bitki yağından
B) Talk tozundan
C) Vazelindən
D) Uşaq tozundan
E) Sudan

Ədəbiyyat:Y.İ.Pasınkov. Ümumi fizioterapiya. Səh.279 . “Maarif” bakı 2008

32) Bədən temperaturu hansı dərəcəyə qalxdıqda xəstənin huşu pozula bilər (C°)?

A) 37, 0 - 38, 0
B) 38, 0 - 38, 5
C) 38, 5 - 39, 0

Şərh az ödənişsiz istifadə üçün

D) 40, 5 - 41, 0
E) 39, 0 – 40, 0

Ədəbiyyat:Qaqunova Y.Y “Xəstələrə ümumi qulluq”. Səh 125. “Maarif” 1974

33) Hipoqlikemik koma zamanı təxirəsalınmaz yardım məqsədi ilə vena daxilinə hansı dərmanı yeritmək lazımdır?

A) İnsulin
B) Dibazol
C) Qlükoza
D) Heparin
E) Kofein

Ədəbiyyat:: N.R. Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.162 “Çıraq” 2008

34) İsti vannaları hansı halda tətbiq etmək olmaz?

A) Kəskin respirator xəstəlik
B) Yüksək hərarət
C) Xroniki rinit
D) Xroniki pnevmoniya
E) Xroniki bronxit

Ədəbiyyat:C.N. Hacıyev. R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh.105 “Təhsil” Bakı1998

35) Uremik koma zamanı xəstənin nəfəsindən hansı iy gəlir?

A) Aseton
B) Ammonyak
C) Alkoqol
D) Tütün
E) Lax yumurta

Ədəbiyyat:: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». «Медицина». Москва 1983 . Səh. 122

36) Hansı halda masaj etmək olmaz?

A) Spastik iflic
B) Limfa düyünləri şişdikdə
C) Oynaq xəstəlikləri
D) Piylənmə
E) Bağların dartınması

Ədəbiyyat: Y.İ.Pasınkov. Ümumi fizioterapiya. Səh.272. “Maarif” Bakı 1980

snsk az ödənişsiz istifadə üçün

37) Bunlardan hansı masajın əsas metodu deyil?

A) Sığallama
B) Sürtmə
C) Basmalama
D) Kəsmələmə
E) Döyəcləmə

Ədəbiyyat:: Y.İ.Pasınkov. Ümumi fizioterapiya .Səh.274 “Maarif” Bakı 1980

38) Tənəffüsün xüsusiyyətlərinə hansılar aiddir?

A) Tezlik
B) Dolğunluq
C) Gərginlik
D) Tonus
E) Yüksəklik

Ədəbiyyat: Qaqunova Y.Y “Xəstələrə ümumi qulluq”. Səh 190. “Maarif” 1974

39) Hirudoterapiya nədir?

A) İqlimlə müalicə
B) Qanburaxma
C) Zəli ilə müalicə
D) İşıqla müalicə
E) Su ilə müalicə

Ədəbiyyat: N.R. Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı” .Səh.39 “Çıraq” 2008

40) “Qəhvə xıltı” şəklində qusma nəyi bildirir?

A) Ağciyər qanaxmasını
B) Ağız boşluğunda travmanı
C) Qida borusu qanaxmasını
D) Qida toksikoinfeksiyasını
E) Mədə qanaxmasını

Ədəbiyyat:: В.М.Богомобов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр. 354

41) Hipertonik krizin müalicəsində hansı preparatın istifadəsi əks göstərişdir?

A) Mezaton
B) Maqnezium – sulfat
C) Dibazol
D) Hipotiazid
E) Nifedipin

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: В.М.Богомобов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр. 306

42) Göstərilənlərdən hansı nəbzin xüsusiyyətlərindən biridir?

A) Hipertoniya
B) Taxipnoe
C) Ritm
D) Hipotoniya
E) Atoniya

Ədəbiyyat: Qaqunova Y.Y "Xəstələrə ümumi qulluq". Səh 223. "Maarif" 1974

43) 10 %-li kalsium-xlorid vena daxilinə düzgün vurulmadıqda hansı fəsad verir?

A) Kvinke ödemi
B) Yumşaq toxumanın nekrozu
C) Abses
D) Anafilaktik şok
E) Yağ emboliyası

Ədəbiyyat:: C.N. Hacıyev. R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh.160 "Təhsil" Bakı1998

44) Arterial hipertoniyalı xəstələr qida rasionunda nəyi azaltmalıdırlar?

A) Ədviyyatlar
B) Şəkəri
C) Xörək duzunu
D) Tərəvəzləri
E) Un məmulatlarını

Ədəbiyyat: N.R. Paleyevin redaktəsi ilə "Tibb bacısının məlumat kitabı". Səh.138 "Çıraq" 2008

45) Uzun müddət yataqda qaldıqda xəstənin vəziyyətini nə ağırlaşdıra bilər?

A) Arterial təzyiqin qalxması
B) Yataq yarası
C) İştahsızlıq
D) Baş gicəllənmə
E) Kollaps

Ədəbiyyat: C.N.Hacıyev. R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh.63 "Təhsil" Bakı 1998

46) Döş sümüyünün arxasında sıxıcı ağrılar zamanı həkimə qədərki ilk yardım hansıdır?

A) Əzələ daxilinə analgin-dimedrol vurmaq
B) Morfinin yeridilməsi

Şərtsiz az ödənişsiz istifadə üçün

C) Daxilə dimedrol
D) Analginin yeridilməsi
E) Nitroqliserini dil altına qoymaq

Ədəbiyyat: N.Y.Paleyevin redaktəsi ilə"Tibb bacısının məlumat kitabı". Səh. 506 "Çıraq" 2008

47) Xəstənin nəbzi bir dəqiqədə 118 vurğudursa, bu nəyi göstərir?

A) Bradipnoe
B) Bradikardiya
C) Aritmiya
D) Taxipnoe
E) Taxikardiya

Ədəbiyyat:Qaqunova Y.Y "Xəstələrə ümumi qulluq". Səh 223. "Maarif" 1974

48) Yağlı məhlulun hansı üsulla yeridilməsi yağ emboliyasına səbəb olur?

A) Dərialtı
B) Venadaxili
C) Daxilə qəbulu
D) Əzələdaxili
E) Dəriiçi

Ədəbiyyat:C.N.Hacıyev. R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh.160 "Təhsil" Bakı1998

49) Havanın məhlulla birgə necə yeridilməsi hava emboliyasına səbəb ola bilər?
A) Əzələ daxili
B) Dəri altina
C) Dəri içi
D) Bronx daxili
E) Vena daxili

Ədəbiyyat: C.N.Hacıyev. R.Y. Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh. 160 "Təhsil" Bakı 1998

50) Əzələdaxili inyeksiya üçün iynənin uzunluğu necə mm olmalıdır?

A) 30 mm
B) 60 mm
C) 80 - 90 mm
D) 40 mm
E) 50 mm

Ədəbiyyat:N.R.Paleyevin redaktəsi ilə "Tibb bacısının məlumat kitabı". Səh. 49 "Çıraq" 2008

ünek.az ödənişsiz istifadə üçün

51) Mədənin yuyulmasına göstəriş hansıdır?

A) Kəskin xolesistit
B) Xroniki enterit
C) Xroniki kolit
D) Kəskin qastrit
E) Kəskin kolit

Ədəbiyyat:: N.R. Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.59 “Çıraq” 2008

52) Anafilaktik şok zamanı təxirəsalınmaz yardım harada göstərilməlidir?

A) Qəbul şöbəsində
B) Təcili yardım maşınında
C) Prosedur otağında
D) Palatada
E) Hadisə baş verdiyi yerdə

Ədəbiyyat: Г.П.Матвейков «Справочник терапевта». Минск «Беларусь». Səh. 736

53) Xardal yaxmasının dəri üzərində qalma müddəti nə qədərdir?

A) 20 – 30 dəqiqə
B) 20 – 25 dəqiqə
C) 3 – 5 dəqiqə
D) 10 – 15 dəqiqə
E) 15 – 20 dəqiqə

Ədəbiyyat:C.H. Hacıyev, R.Y. Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh. 115. “Təhsil”, Bakı 1998

54) Sifon imaləsi üçün neçə litr su götürülməlidir?

A) 5 – 7
B) 10 – 12
C) 4 – 6
D) 6 – 8
E) 1- 2

Ədəbiyyat:C.N.Hacıyev; R.Y. Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh.206. “Təhsil” Bakı 1998

55) Spastik qəbizlik zamanı təmizləyici imalənin temperaturu necə dərəcə olmalıdır?

A) 38° – 40°
B) 30° - 32°
C) 15° – 20°
D) 20° – 25°
E) 45° - 50°

Ədəbiyyat:: C.H. Hacıyev, R.Y. Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh.203“Təhsil”, Bakı 1998

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

56) Arterial hipertenziya nədir?

A) Mərkəzi venoz təzyiqin azalması
B) Arterial təzyiqin azalması
C) Damar tonusunun azalması
D) Arterial təzyiqin artması
E) Mərkəzi venoz təzyiqin artması

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh. 138 “Çıraq” 2008

57) Biokimyəvi müayinə üçün qan nə vaxt götürülür?

A) Ac qarına, səhər
B) Qida qəbulundan 45 dəqiqə sonra
C) Qida qəbulundan 30 dəqiqə sonra
D) Qida qəbulundan asılı olmayaraq
E) Qida qəbulundan 15 dəqiqə sonra

Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.27 “Çıraq” 2008

58) HIV/AIDS(QİÇS-in (qazanılmış immun çatışmazlıq sidromu))mümkün olan yoluxma yolu hansıdır?

A) Əl ilə təmas
B) Yoluxmuş qanın köçürülməsi
C) Həşəratların dişləməsi
D) Eyni qabdan qida qəbulu
E) Hava damcı yolu

Ədəbiyyat: «Справочник терапевта». Г.П.Матвейков. Минск «Беларусь» 2000. Səh. 672

59) BCJ vaksininin yararlılıq müddəti nə qədərdir?

A) 2 il
B) 6 ay
C) 3 ay
D) 1 il 6 ay
E) 1 il

Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısınn məlumat kitabı”.Səh.167“Çıraq” 2008.

60) Ürək astması zamanı təxirəsalınmaz yardımda hansı preparatlardan istifadə olunur?

A) Droperidol, baralgin, prednizolon
B) Vikasol, jelatinol,poliqlükin

ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Eufillin, laziks, nitroqliserin
D) Atropin, no-şpa, platfillin
E) Mezaton, kordiamin, panangin

Ədəbiyyat:: «Справочнык врача скорой и неотложной помощи». «Феникс» 2001. Стр. 141-142.

61) Qanhayxırma nədir?

A) “Qəhvə xıltı ” şəklində qusma
B) Qan lifləri olan köpüklü bəlğəm
C) Öskürək zamanı qan və ya qanlı bəlğəm ifrazı
D) Bəlğəmdə nöqtələr və saplar şəklində qanın olması
E) Paslı bəlğəm ifrazı

Ədəbiyyat:N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.511 “Çıraq” 2008

62) Kollaps zamanı istifadə olunan dərman preparatları hansılardır?

A) Nitroqliserin, nifedipin
B) Baralgin, no-şpa
C) Laziks, furosemid
D) Poliqlükin, vikasol
E) Mezaton, kofein

Ədəbiyyat:: В.М.Богомобов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр. 321

63) Ağciyər qanaxması zamanı xəstəyə hansı vəziyyəti verilməlidir?

A) Xəstənin başı aşağı salınır
B) Xəstəni uzandırılır
C) Xəstəni böyrü üstə uzadırılır
D) Xəstəni otuzdurulur
E) Xəstəyə yarımoturaq vəziyyət verib, ayaqlarını aşağı salınır

Ədəbiyyat:: Е.И.Чазов. «Неотложные состояния и экстренная помощъ». Москва «Медицина» 1990. Стр. 209.

64) Rektoromanoskopiya hansı orqanın müayinə üsuludur?

A) 12 barmaq bağırsağın
B) Mədənin
C) Qida borusunun
D) Öd yollarının
E) Düz bağırsağın

Ədəbiyyat: C.N.Hacıyev. R.Y..Əliyev. Xəstələrə qulluq . Səh.215. “Təhsil” Bakı 1998.

sırf az ödənişsiz istifadə üçün

65) Anafilaktik şok dərman preparatlarının ən çox hansı yolla yeridilməsi zamanı baş verir?

A) İnhalyasion
B) Sublinqval (dilaltına)
C) Daxilə
D) Xaricə (məlhəm şəklində)
E) Parenteral

Ədəbiyyat: Г.П.Матвейков «Справочник терапевта». Минск «Беларусь». Səh. 735

66) Kolonoskopiya hansı orqanın müayinə üsuludur?

A) Yoğun bağırsağın
B) Qida borusunun
C) Düz bağırsağın
D) 12 barmaq bağırsağın
E) Öd yollarının

Ədəbiyyat: C.N.Hacıyev. R.Y..Əliyev. Xəstələrə qulluq . Səh.214. "Təhsil" Bakı 1998.

67) Yağ imaləsi nə vaxt aparılır?

A) Zəhərlənmələrdə
B) Uzun sürən qəbizlikdə
C) Ağır xəstələri qidalandırmaq üçün
D) Qarın boşluğunda aparılacaq əməliyyatdan qabaq
E) Doğuşdan qabaq

Ədəbiyyat: C.N.Hacıyev. R.Y..Əliyev. Xəstələrə qulluq . Səh.205 "Təhsil" Bakı 1998.

68) İnhalyasiya dərman maddələrinin hansı yolla orqanizmə daxil edilmə üsuludur?

A) Mədə-bağırsaq
B) Əzələ daxili
C) Dəri altı
D) Tənəffüs
E) Vena daxili

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə " Tibb bacısının məlumat kitabı". Səh. 50 " Çıraq" 2008.

69) Kişilər üçün istifadə olunan kateterin uzunluğu nə qədərdir?

A) 15 sm
B) 30 sm
C) 10 sm
D) 40 sm
E) 5 sm

unik.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh. 56 “ Çıraq” 2008

70) Dəm qazı ilə zəhərlənmənin ilkin əlamətləri hansılardır?

A) Yanıqlar, səpkilər
B) İshal, qarında ağrılar
C) Başgicəllənmə, lənglik, huşun itməsi
D) Tənqnəfəslik, qıcolma
E) Ürəkdöyünmə, qusma

Ədəbiyyat: Е.И.Чазов. «Неотлож состояние экстренная помощъ». Москва «Медицина» 1990. Стр. 265

71) Öd kisəsinin rentgen müayinəsi üçün göstərilən maddələrdən hansı istifadə edilmir?

A) Biliqnost
B) Barium
C) Bilitrast
D) Xolevid
E) Biliqrafin

Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı” . Səh. 102 “ Çıraq ” 2008.

72) Hansı vitamin suda həll olur?

A) K
B) E
C) A
D) C
E) D

Ədəbiyyat:N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.113. “ Çıraq ” 2008

73) Hansı vitamin çatışmadıqda xəstədə gecə və ya toyuq korluğu olur?

A) D
B) E
C) K
D) C
E) A

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı ”. Səh. 116 “ Çıraq ” 2008

sesk.az ödənişsiz istifadə üçün

74) Sümüklərin normal inkişafı üçün hansı duzlar vacibdir?

A) Barrium
B) Natrium
C) Kalsium
D) Maqnezium
E) Kalium

Ədəbiyyat:: N.R. Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı” Səh.117. “ Çıraq ” 2008

75) Kəskin sol mədəcik çatışmazlığı(ürək astması) tutması zamanı ətraflara turna qoyarkən tibb işçisi nəyə fikir verməlidir?

A) Turna qoyulan ətraflar qaralmasın
B) Turnalar ətrafların hamısından eyni vaxtda açılmasın
C) Sadalananların hamısına
D) Arteriyalarda nəbz yaxşı əllənsin
E) Turna ancaq venaları sıxsın

Ədəbiyyat:N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı ”. Səh.505 “ Çıraq ” 2008

76) Meteorizm hansı sistemin xəstəliklərinin əsas simptomlarındandır?

A) Həzm sistemi
B) Sidik – ifrazat sistemi
C) Tənəffüs sistemi
D) Ürək-qan-damar sistemi
E) Cinsiyyət sistemi

Ədəbiyyat: N.R. Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı ”. Səh. 56 “ Çıraq ” 2008.

77) Nikturiya nədir?

A) Sidikdə qanın olması
B) Gecə sidiyinin miqdarının çox olması
C) Gecikmiş sidiyin xaric olması
D) Sidikdə irinin olması
E) Sidiyin xüsusi çəkisinin sabit qalması

Ədəbiyyat: :C.N.Hacıyev ; R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq . Səh.224. “Təhsil” .Bakı 1998.

78) Dəm qazı ilə zəhərlənmə zamanı təxirəsalınmaz yardım?

A) Xəstəyə antihistamin preparatı vurmaq
B) Xəstənin mədəsini yumaq
C) Xəstəni təmiz havaya çıxartmaq, oksigen inhalyasiyası aparmaq
D) Xəstəyə vena daxili NaHCO3 yeritmək

tik.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Xəstəni intubasiya etmək

Ədəbiyyat: Е.И.Чазов. «Неотложные состояния и экстренная помощъ». Москва «Медицина» 1990. Стр. 268

79) Sidikdə şəkərin miqdarını təyin etmək üçün sidik necə toplanır?

A) Xəstəyə acqarına 1, 5 l maye içirdikdən sonra ilk 4 saat ərzində
B) Səhər yuxudan durduqdan sonra 100 - 200 ml
C) Bir sutka ərzində
D) Yalnız gecə saat 22-dən səhərə qədər ifraz etdiyi sidik
E) Steril sınaq şüşəsinə 10 ml sidik yığılır

Ədəbiyyat: C.N. Hacıyev; R.Y. Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh.225. "Təhsil". Bakı 1998

80) Zimnitski sınağı aparmaq üçün sidik neçə porsiyada yığılır?

A) 6
B) 8
C) 4
D) 3
E) 2

Ədəbiyyat:C.N. Hacıyev ; R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh. 228 "Təhsil". Bakı 1998

81) Sidik kisəsinin kateterizasiyası nə zaman aparılır?

A) Sidik kisəsini antiseptik məhlullarla yumaq üçün
B) Sidik kisəsindəki sidiyi boşaltmaq üçün
C) Sidik kisəsinə rentgenokontrast maddə yeritmək üçün
D) Sadalanan bütün hallarda
E) Sidik kisəsinə müxtəlif dərmanlar yeritmək üçün

Ədəbiyyat:: C.N. Hacıyev; R.Y. Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səhə 229. "Təhsil " Bakı 1998

82) Böyrək daşı sancısı zamanı ilk yardım göstərərkən tibb işçisi xəstəyə hansı vanna tətbiq edə bilər?

A) İlıq vanna
B) İndifferent vanna
C) Soyuq vanna
D) Sərin vanna
E) İsti vanna

Ədəbiyyat:: N.R Paleyevin redaktəsi ilə "Tibb bacısının məlumat kitabı". Səh.158. " Çıraq " 2008

83) Qəbizlik zamanı xəstəyə hansı qidadan istifadə etmək məsləhət görülür?

snik.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Yumurta
B) Kartof
C) Noxud
D) Çuğundur
E) Ağ çörək

Ədəbiyyat: N.R. Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.40 “Azərnəşr” Bakı 1984

84) Stenokardiya tutması zamanı aşağıdakılardan hansı əks göstərişdir?

A) Nifedipin
B) Baralgin
C) İzoket
D) Nitroqliserin
E) Mezaton

Ədəbiyyat:: В.М.Богомобов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр. 308.

85) Stenokardiya tutması zamanı göstərilən yardımdan sonra xəstənin vəziyyəti yaxşılaşmırsa, bu nəyə şübhə yaradır?

A) Miokard infarktı
B) Ağciyər ödemi
C) Hipotonik kriz
D) Aortanın anevrizması
E) Hipertonik kriz

Ədəbiyyat:: В.М.Богомобов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр. 309-310.

86) Miokard infarktı zamanı həkiməqədər yardım nədən ibarətdir?

A) Xəstənin mədəsini yumaq
B) Xəstəyə tam fiziki (yarımoturaq) və psixi sakitlik vermək,dil altına nitroqliserin
C) Xəstəyə sidikqovucu vurmaq
D) Xəstəni sakitləşdirmək
E) Xəstəyə tam üfiqi vəziyyət verib, əzələ daxilinə analgin vurmaq

Ədəbiyyat:: В.М.Богомобов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр. 310-311.

87) Göstərilənlərdən hansı stasionar tipli müalicə müəssisəsidir?

A) Təcili yardım stansiyası
B) Həkim məntəqəsi
C) Poliklinika
D) Qadın məsləhətxanası
E) Xəstəxana

sınaq üçün istifadə üçün

Ədəbiyyat: C.N.Hacıyev ; R.Y. Əliyev . Xəstələrə qulluq . Səh. 19. “ Təhsil ” Bakı 1998.

88) Hiperqlikemik komanın əlamətləri hansılardır?

A) Quru dəri, küylü tənəffüs, ağızdan aseton iyinin gəlməsi
B) Arterial təzyiqin kəskin qalxması
C) Qıcolmalar
D) Tərləmə, oyanıqlıq
E) Qarın nahiyyəsində ağrı, temperaturun qalxması

Ədəbiyyat:: В.М.Богомобов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр. 436

89) Hiperqlikemik koma zamanı təxirəsalınmaz yardım nədən ibarətdir?

A) Vena daxili poliqlükin məhlulu
B) Vena daxili 5 % - 200 ml Qlükoza məhlulu
C) Dehidratasiya
D) Əzələ daxilinə ağrıkəsicilər
E) İnsulin terapiyası, rehidratasiya

Ədəbiyyat:: В.М.Богомобов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр. 436-437

90) Kəskin damar çatışmazlığı olan xəstə xərəkdə hansı vəziyyətdə nəql edilməlidir?

A) Başın səviyyəsi aşağı vəziyyətdə
B) İstənilən vəziyyətdə
C) Sağ böyrü üstə
D) Oturaq vəziyyətdə
E) Yarımoturaq vəziyyətdə

Ədəbiyyat: : C.N.Hacıyev ; R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq .Səh. 43. “ Təhsil ” Bakı 1998.

91) Hipertonik krizin başlıca əlamətləri hansılardır?

A) Arterial təzyiqin enməsi, qusma
B) Ürəkbulanma, qusma, qarında ağrılar
C) Arterial təzyiqin enməsi, baş ağrısı
D) Ürəkbulanma, döş sümüyü arxasında ağrı
E) Baş ağrısı, qusma, arterial təzyiqin qalxması

Ədəbiyyat:В.М.Богомобов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр. 303

92) Hansı növ qanaxmalarda köpüklü qan müşahidə edilir?

A) Düz bağırsaq qanaxması
B) Uşaqlıq qanaxması

Sırf az odənişsiz istifadə üçün

C) Burun qanaxması
D) Mədə qanaxması
E) Ağciyər qanaxması

Ədəbiyyat:Е.И.Чазов. «Неотложные состояния и экстренная помощъ». Москва «Медицина» 1990. Стр. 209

93) Xəstəlik tarixçəsində olan temperatur vərəqində aşağıda göstərilənlərdən hansıları qeyd olunmalıdır?

A) Nəbz və tənəffüsün sayı
B) Xəstənin hərarətinin dəyişməsi
C) Hamısı
D) Diurezin miqdarı
E) Arterial təzyiq

Ədəbiyyat: C.N.Hacıyev ; R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq . Səh. 52 . " Təhsil " Bakı 1998.

94) Rektal süni qidalanma nə vaxt əks-göstəriş sayılır?

A) Orqanizm çox su itirdikdə
B) Anusda çatlar olduqda
C) Qida borusunun tam keçməməzliyində
D) Mədədə aparılan operasiyadan sonra
E) Massiv yanıqlar zamanı

Ədəbiyyat: N.R Paleyevin redaktəsi ilə " Tibb bacısının məlumat kitabı ". Səh.130 " Çıraq " 2008.

95) Xəstənin dərmana həsaslığını yoxlamaq üçün iynə hansı nahiyəyə vurulur?

A) Əzələ daxilinə
B) Dəri içinə
C) Göstərilən bütün nahiyələrə vurmaq olar
D) Vena daxilinə
E) Dəri altına

Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə " Tibb bacısının məlumat kitabı ". Səh.48 " Çıraq"2008.

96) Dərialtı inyeksiyadan sonra inyeksiya yeri bərkidikdə aşağıda sadalanan tədbirlərdən hansı əks- göstəriş sayılır?

A) Bərkiyən nahiyəyə yod sürtmək
B) Bərkiyən nahiyəyə isti kompres qoymaq
C) Bərkiyən nahiyəyə 40 %-li spirtlə isidici kompres qoymaq
D) Bərkiyən nahiyəyə isitqac qoymaq
E) Bərkiyən nahiyəyə buz qovuğu qoymaq

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı ”. Səh. 48 “ Çıraq ”2008.

97) Qıcolma sindromu zamanı hansı dərman preparatının istifadəsi daha məqsədəuyğundur?

A) Kalium-yodid
B) Vikasol
C) Kamfora
D) Kordiamin
E) Seduksen, relanium

Ədəbiyyat:: М.Д.Машковский. «Лекарственные средства». Част I. Москва «Медицина» 1986. Стр. 69-70

98) Kardiogen şokun əlamətləri hansılardır?

A) Arterial təzyiqin kəskin qalxması, qusma
B) Qıcolma, dilin qatlanması
C) Arterial təzyiqin kəskin qalxması, qızarma
D) Arterial təzyiqin kəskin enməsi, sianoz
E) Qıcolma, huşun itməsi

Ədəbiyyat:: В.М.Богомобов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр. 313

99) Pedikulyozlu xəstənin müayinəsindən sonra otağın dezinfeksiyası üçün istifadə olunan məhlul hansıdır?

A) 3 % - li xlor əhəngi
B) 8 % - li lizol məhlulu
C) 6 % - li hidrogen-peroksid məhlulu
D) 0, 02 % -li furasillin məhlulu
E) 3 % - li xloramin məhlulu

Ədəbiyyat:: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». «Медицина». Москва 1983 . Səh. 27

100) Xəstənin qəbul otağından şöbəyə nəql olunma üsulunu kim təyin edir?

A) Kiçik tibb bacısı
B) Qəbul şöbəsinin tibb bacısı
C) Qəbul şöbəsinin həkimi
D) Qəbul şöbəsinin böyük tibb bacısı
E) Baş həkim

Ədəbiyyat:: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». «Медицина». Москва 1983 . Səh.29

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

101) Trankvilizatorlarla zəhərlənmələr zamanı təxirəsalınmaz yardım nədən başlanmalıdır?

A) Sakitləşdirici preparatların verilməsindən
B) Mədənin yuyulmasından
C) Qan köçürmədən
D) Ağrıkəsicilərin verilməsindən
E) Sifon imaləsindən

Ədəbiyyat:: Е.И.Чазов. «Неотложные состояния и экстренная медицинская помощ». Москва «Медицина» Стр 530

102) "Xəncər" ağrısı simptomu hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorası
B) Pankreatit
C) Böyrəkdaşı xəstəliyi
D) Xoralı kolit
E) Xolesistit

Ədəbiyyat:: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр 350-351

103) Sidik qəbulediciləri, ifrazat qablarını boşaltdıqdan sonra onları xloraminin hansı məhlulunda və neçə dəqiqə saxlamaq lazımdır?

A) 60 dəq 3%-li xloramin məhlulunda
B) 120 dəq 1%-li xloramin məhlulunda
C) 15 dəq 1%-li xloramin məhlulunda
D) 5 dəq 1%-li xloramin məhlulunda
E) 30 dəq 3%-li xloramin məhlulunda

Ədəbiyyat:: N.R. Paleyevin redaktəsi ilə "Tibb bacısının məlumat kitabı". Səh.215 "Azərnəşr" Bakı 1984

104) Ağır xəstələrin dərisini silmək üçün hansı məhluldan istifadə olunur?

A) 10%-li naşatır spirti
B) 10%-li kalium-permanqanat məhlulu
C) 0,05%-li kalium-permanqanat məhlulu
D) 10%-li kamfora spirti
E) Furasillin məhlulu

Ədəbiyyat:: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». «Медицина». Москва 1983 . Səh. 32-33

105) "Kəmərvari" ağrı hansı xəstəlik zamanı rast gəlinir?

A) Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorası
B) Xolesistit

Yalnız ödənişsiz istifadə üçün

C) Pankreatit
D) Kəskin qastrit
E) Xoralı kolit

Ədəbiyyat:В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр 389

106) Qızdırmanın üçüncü dövründə tətbiq edilməsi vacibdir:

A) İsitqac
B) Yaş bürümə
C) Çoxlu miqdarda tünd şirin çay və ya kofe qəbulu
D) Sərin vitaminli içkilərin qəbulu
E) Buz qovuğu

Ədəbiyyat:В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». «Медицина». Москва 1983 . Səh. 47

107) Qızdırmanın inkişafında neçə dövr ayırd edilir?

A) 1
B) 3
C) 4
D) 2
E) 5

Ədəbiyyat:: Qaqunova Y.Y "Xəstələrə ümumi qulluq". Səh 123. "Maarif" 1974

108) Hansı maddə dəri içinə yeridilir?

A) No-spa
B) Kordiamin
C) Tuberkulin
D) Ampisillin
E) Klofellin

Ədəbiyyat:: N.R. Paleyevin redaktəsi ilə "Tibb bacısının məlumat kitabı". "Azərnəşr" Bakı 1984. Səh.56-57.

109) Dəri altı inyeksiya hansı bucaq altında aparılır?

A) 45
B) 5
C) 90
D) 60
E) 70

Ədəbiyyat:N.R. Paleyevin redaktəsi ilə "Tibb bacısının məlumat kitabı". Səh.57 "Azərnəşr" Bakı 1984

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

110) Vena daxili inyeksiyadan əvvəl turnanın düzgün qoyulmasının göstəricisi nədir?

A) Mil arteriyasında nəbzin olmaması
B) Turnadan aşağı hissədə dərinin qızarması
C) Turnadan aşağı hissədə dərinin göyərməsi
D) Turna qoyulan nahiyədə qansızmaların olması
E) Turnadan aşağı hissədə dəri örtüyünün avazıması

Ədəbiyyat:: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». «Медицина». Москва 1983 . Səh. 86

111) Meteorizm zamanı qaz çıxarıcı borunun yeridilmə dərinliyi nə qədər olmalıdır (sm-lə)?

A) 10-12
B) 20-30
C) 10-15
D) 50
E) 2-4

Ədəbiyyat:В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». «Медицина». Москва 1983 . Səh. 114

112) Yağ imaləsini aparmaq üçün bitki yağının miqdarı (ml-lə)?

A) 1000
B) 500
C) 50
D) 100
E) 10

Ədəbiyyat:: N.R. Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.50 “Azərnəşr” Bakı 1984

113) Göstərilən inyeksiyalardan hansını tibb bacısı aparmamalıdır?

A) Arteriya daxilinə
B) Vena daxilinə
C) Dəri altına
D) Dəri içinə
E) Əzələ daxilinə

Ədəbiyyat:: C.N. Hacıyev ; R.Y. Əliyev . Xəstələrə qulluq. Səh. 137. “ Təhsil ” Bakı 1998.

114) Xəstəyə O2 (oksigen) verilməsi üçün ən çox hansı üsuldan istifadə olunur?

A) Burun kanyulası
B) Duodenal zond
C) O2 (oksigen) yastığının qıfı

Şəxsi az ödənişsiz istifadə üçün

D) Burun kateteri
E) Mədə zondu

Ədəbiyyat: Qaqunova Y.Y “Xəstələrə ümumi qulluq”. Səh 223. “Maarif” 1974.

115) Xəstənin hərarəti yüksək olduqda(qızdırmanın II dövründə)tibb bacısı ona aşağıda sadalanan yardımlardan hansını göstərməlidir?

A) Ayaqlarına isti vanna etməlidir
B) Xəstənin ayaqlarına isitqac qoymalıdır
C) Xəstənin alnına soyuq kompres qoyub, içməyə maye verməlidir
D) Xəstənin üstünü yorğanla örtməlidir
E) Xəstəyə isti çay verməlidir

Ədəbiyyat:: C.N. Hacıyev ;.R.Y.Əliyev . Xəstələrə qulluq . Səh. 105. “ Təhsil ” Bakı 1998.

116) Ağciyərlərin süni ventilyasiyasını apararkən əsas maneə nədir?

A) Tənəffüs əzələlərinin rigidliyi
B) Dilin qatlanması
C) Süni tənəffüs aparatının işləməməsi
D) Xəstənin ağzının qıc olması
E) Xəstənin oyanıqlığı

Ədəbiyyat:: С.А.Мухина ,Общий уход за больными.Москва ,Медицина, 1989 .Стр.248

117) Aşağıda göstərilən temperaturlardan hansı subfebril temperaturdur?

A) 37-38.0
B) 36-36,5
C) 38-39
D) 40-41
E) 39-40.0

Ədəbiyyat:: C.N.Hacıyev ; R.Y.Əliyev . Xəstələrə qulluq . Səh . 103 . “ Təhsil ” Bakı 1998.

118) Venepunksiya apararkən tibb işçisi aşağıda göstərilənlərdən nəyi düz etmir?

A) Xəstənin dirsəyi altına kiçik yastıq qoyur
B) Bazunun ortasından turnanı elə bağlayır ki, mil arteriyasında pulsasiya kəsilsin
C) Xəstəyə əlini açıb-yummağı təklif edir
D) Iynə venaya düşən kimi turnanı açır
E) İnyeksiya nahiyəsini 2 dəfə spirtli tamponla silir

Ədəbiyyat: : N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı ”. Səh. 25 “ Çıraq” 2008.

ismek.az ödənişsiz istifadə üçün

119) Aşağıdakı hansı dərman forması orqanizmə enteral yolla qəbul edilmir?

A) Mikstura
B) Kapsul
C) Draje
D) Tablet
E) Məlhəm

Ədəbiyyat:C.N.Hacıyev ; R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq . Səh. 135. " Təhsil " Bakı 1998.

120) Stasionarda A və B siyahısına daxil olan, xüsusi seyflərdə saxlanılan dərmanlar hansılardır?

A) Narkotik analgetiklər, trankvilizatorlar
B) Hipotenziv dərmanlar
C) Antibiotiklər
D) Vaksinlər
E) Zərdablar

Ədəbiyyat:C.N.Hacıyev ; R.Y.Əliyev . Xəstələrə qulluq .Səh. 127. " Təhsil " Bakı 1998.

121) Kolloid məhlullara hansılar aiddir?

A) 20%-li qlükoza məhlulu
B) Asesol
C) 0,9%-li Natrium-xlorid məhlulu
D) Poliqlükin, jelatinol
E) 5%-li qlükoza məhlulu

Ədəbiyyat:О.А.Долина. «Анестезиология и реанимация». ГЭОТАР-Медиа,Москва.2007. Стр 86

122) Hansı üsul dərmanların xaricə tətbiq edilməsinə aid deyil?
1. Kompress
2. Toz şəklində səpmək
3. Damcı şəklində dəri səthindəki yaraya damılatmaq
4. Dilin altına qoymaq
5. Dəri səthindəki yaraya sürtmək
6. Dəri içinə yeritmək

A) 2,4
B) 2,6
C) 3,5
D) 4,6
E) 1,4

Ədəbiyyat:: C.N. Hacıyev ; R.Y.Əliyev . Xəstələrə qulluq . Səh . 131 . " Təhsil " Bakı 1998.

Sitat az ödənişsiz istifadə üçün

123) Hansı halda tibb işçisi xəstəyə qızdırıcı kompress qoymalıdır?

A) İnyeksiyadan sonra infiltrat olduqda
B) Yüksək qızdırma olduqda
C) Yerli irinli proseslər olduqda
D) Dəridə allergik səpgilər olduqda
E) Dərinin tamlığı pozulduqda

Ədəbiyyat:C.N. Hacıyev ; R.Y.Əliyev . Xəstələrə qulluq . Səh . 118 . " Təhsil " Bakı 1998.

124) Xəstəyə xardal yaxması qoyarkən tibb işçisi aşağıda göstərilənlərdən hansını düz etmir?

A) Xardal kağızının üstünü dəsmalla örtüb, xəstəni yorğana bürüyür
B) Xardal kağızını götürdükdən sonra dərini ilıq suda isladılmış dəsmalla silir
C) Tibb bacısı xardal kağızını soyuq suda isladıb, xəstənin bədəninə qoyur
D) Xardal kağızını 5-15 dəqiqə xəstənin bədənində saxlayır
E) Xardal qoyulacaq nahiyənin üstünü açır

Ədəbiyyat:C.N. Hacıyev ; R.Y.Əliyev . Xəstələrə qulluq . Səh. 115 . " Təhsil " Bakı 1998.

125) Hansı hallarda parenteral qidalanma mütləq göstəriş deyil?

A) İri həcmli əməliyyatlardan sonra (qida borusunda, qarın boşluğunda və s.)
B) Ürəyin işemik xəstəliklərində
C) Ağız boşluğunda, udlaqda patoloji proses olduqda
D) Bəzi infeksion xəstəliklərdə
E) Ağır irinli-septik proseslər zamanı

Ədəbiyyat: О.А.Долина. «Анестезиология и реанимация».ГЭОТАР -Медиа, Москва.2007. Стр 86-90

126) Aşağıda göstərilən vəziyyətlərdən hansında tibb işçisi xəstəyə buz qovuğu tətbiq edə bilməz?

A) Əzilmələr zamanı 3-cü gündə
B) Daxili qanaxmalar olduqda
C) Kəskin appendisit zamanı
D) Böyrək sancılarında
E) Yüksək qızdırma olduqda

Ədəbiyyat: C.N. Hacıyev ; R.Y.Əliyev . Xəstələrə qulluq . Səh . 122. " Təhsil " Bakı 1998.

127) Iri arteriyalarda nəbzin itməsi nə adlanır?

A) Asistoliya
B) Atelektaz
C) Aritmiya
D) Koma
E) Apnoe

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:С.А.Мухина. «Общий уход за болъными». Москва «Медицина» 1983. Стр 243-250

128) Klinik ölümə şübhə olduqda reanimasion tədbirlər nə zaman başlanmalıdır?

A) Reanimasiya şöbəsində
B) Təcili yardım maşınında
C) Yaxınlıqda yerləşən tibb müəssisəsində
D) Dərhal, yerindən asılı olmayaraq
E) Xəstəxananın qəbul şöbəsində

Ədəbiyyat: С.А.Мухина. «Общий уход за болъными». Москва «Медицина» 1983. Стр 243-250

129) Bədən temperaturu 1 dərəcə artanda ürək döyüntüsü necə dəyişir?

A) 10 vurğu artır
B) 20 vurğu artır
C) Dəyişmir
D) 20 vurğu azalır
E) 10 vurğu azalır

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı ” Səh. 29 “ Çıraq ” 2008.

130) Spastik qəbizlik zamanı xəstəyə hansı imalə edilir?

A) Adi təmizləyci
B) Hipertonik
C) Qidalandırıcı
D) Sifon
E) Yağlı

Ədəbiyyat:N.R. Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.50 “Azərnəşr” Bakı 1984

131) Spirometriyadan hansı məqsədlə istifadə olunur?

A) Bədən kütləsinin ölçülməsi
B) Boyun ölçülməsi
C) Ağciyərlərin tənəffüs həcminin ölçülməsi
D) Döş çevrəsinin ölçülməsi
E) Əzələ gücünün ölçülməsi

Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı ” Səh. 8 “ Çıraq ” 2008

132) Sifon imaləsini aparmaq üçün hansı məhlulu hazırlamaq lazımdır?

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) 100 ml natrium-hidrokarbonat məhlulu
B) 1-2 litr təmiz su
C) 100 ml 25%-li maqnezium-sulfat məhlulu
D) 100 ml natrium-xlorid məhlulu
E) 10 litr təmiz su

Ədəbiyyat: N.R. Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.49-50 “Azərnəşr” Bakı 1984

133) Yoğun bağırsaqda iltihabi proses olduqda yerli müalicə kimi hansı imalədən istifadə olunur?

A) Hipertonik imalədən
B) Təmizləyici imalədən
C) Yağ imaləsindən
D) Sifon imaləsindən
E) Dərman imaləsindən

Ədəbiyyat: N.R.Paleyevi redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı ”. Səh. 43 “Çıraq ” 2008.

134) Hirudoterapiya zamanı hansı nahiyələrə zəli qoymaq olmaz?

A) Ənsə nahiyəsinə
B) Qaraciyər nahiyəsinə
C) Əlin ovuc səthinə və ayağın altına
D) Qulaq seyvanının arxasına
E) Ayaqlara

Ədəbiyyat:: N.R. Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı ”. Səh.41 “Çıraq ” 2008.

135) Qadınlarda sidik kisəsini kateterizasiya etmək üçün hansı kateterdən istifadə olunur?

A) Yumşaq
B) Sərt
C) Polietilen
D) Şüşə
E) Yarım sərt

Ədəbiyyat: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh(303)

136) Dərialtı inyeksiya zamanı ən çox nə qədər maye yeritmək olar?

A) 4 ml
B) 2 ml
C) 5 ml
D) 10 ml
E) 8 ml

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı ”. Səh.63 “Çıraq ” 2008

137) Xəstənin rektoromanoskopiyaya hazırlanmasında aşağıdakılardan hansından istifadə olunur.

A) Müayinədən bir gün əvvəl təmizləyici imalə
B) Düz bağırsaqda temperaturun ölçülməsi
C) Düz bağırsağa qidalandırıcı məhlulların yeridilməsi
D) Kontrast maddənin yeridilməsi
E) Axşam-səhər təmizləyici imalə

Ədəbiyyat: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». «Медицина». Москва 1983 . Səh. 345

138) Damcı üsulu ilə venaya məhlul yeridilən zaman iynənin ucu trombla tutularsa tibb işçisi nə etməlidir?

A) Proseduranı tamamilə dayandırmalıdır
B) Sistemdə təzyiqi qaldırmalıdır
C) İynəni dəyişdirməlidir
D) Dərhal həkimi çağırmalıdır
E) Kanyulanı təmizləməlidir

Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı ”. Səh. 60 “Çıraq ” 2008.

139) Xəstədə gəyirmə baş verərsə bu nəyi göstərir?

A) Mədə möhtəviyyatının ağızdan xaric olmasını
B) Mədə möhtəviyyatının qida borusuna keçməsini
C) Mədədəki qazların qida borusu vasitəsilə ağızdan xaric olmasını
D) Qazların bağırsaq vasitəsilə xaric olmasını
E) Bağırsaqlarda patoloji qaz əmələ gəlməsini

Ədəbiyyat:N.R.Paleyevi redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı ”. Səh. 56 “Çıraq” 2008.

140) Xəstədə meteorizm olduqda aşağıda sadalanan yardımlardan hansı effekt vermir?

A) Qazçıxarıcı boru qoymaq
B) Qara çörək, kələm, süd və s. qaz əmələ gətirən qidaları yeməyi qadağan etmək
C) Xəstənin mədəsinin yuyulması
D) Çobanyastığı dəmləməsi ilə imalə etmək
E) Xəstəyə aktivləşdirilmiş kömür vermək

Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı ”. Səh.56 “Çıraq ” 2008 .

ünsk az ödənişsiz istifadə üçün

141) Göstərilənlərdən hansı dərmanların enteral yolla yeridilməsinə aiddir?

A) Gözə damızdırmaq
B) Həb şəklində qəbul etmək
C) Dəriyə sürtmək
D) Dəriiçi inyeksiya
E) Vena daxili inyeksiya

Ədəbiyyat: C.N.Hacıyev ; R.Y.Əliyev . Xəstələrə qulluq. Səh.130 . " Təhsil " Bakı 1998 .

142) Əzələ daxili inyeksiya sağrının hansı nahiyəsində(kvadrantında) aparılır?

A) Aşağı xarici
B) Aşağı içəri
C) Sağrının orta hissəsində
D) Yuxarı xarici
E) Yuxarı içəri

Ədəbiyyat: C.N.Hacıyev ; R.Y.Əliyev . Xəstələrə qulluq . Səh . 152 . " Təhsil " Bakı 1998.

143) Mədənin yuyulmasına əks- göstəriş hansıdır?

A) Qida borusundan olan qanaxmalar
B) Mədə turşuluğunun artması
C) Dərman zəhərlənmələri
D) Alkoqolla zəhərlənmələr
E) Qida zəhərlənmələri

Ədəbiyyat: C.N.Hacıyev ; R.Y.Əliyev . Xəstələrə qulluq. Səh .190 ." Təhsil " Bakı 1998.

144) Aşağıda göstərilənlərdən hansı zondun ucunun mədədə olmadığını göstərir?

A) Xəstə hıçqırır
B) Zonddan mədə möhtəviyyatı xaric olur.
C) Xəstə öyüyür
D) Xəstə göyərir,narahat olur
E) Zondla mədəyə maye yeridilir

Ədəbiyyat: N.R. Paleyevin redaktəsi ilə " Tibb bacısının məlumat kitabı " .Səh. 57 "Çıraq " 2008

145) İnyeksiyadan dərhal sonra xəstədə təngnəfəslik, taxikardiya, huşun itməsi baş verərsə bu hansı ağırlaşmanın baş verdiyini göstərir?

A) Anafilaktik şok
B) Sinir kötüklərinin zədələnməsi
C) Abses
D) Tromboflebit
E) Sepsis

Şəxsi az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:C.N.Hacıyev : R.Y.Əliyev . Xəstələrə qulluq .Səh. 162 . “ Təhsil ” Bakı 1998.

146) Lipodistrofiya (inyeksiya yerində piy toxumasının itməsi) əsasən hansı dərmanın yeridilməsindən sonra müşahidə olunur?

A) Narkotiklər
B) Antibiotiklər
C) İnsulin
D) Vaksinlər
E) Vitaminlər

Ədəbiyyat:C.N.Hacıyev ; R.Y.Əliyev . Xəstələrə qulluq . Səh.160 . “ Təhsil ” Bakı 1998

147) Müayinə üçün əsnəkdən material götürərkən tibb işçisi aşağıda sadalananlardan hansını düz etmir?

A) Yaxmanı zədələnmiş nahiyə ilə sağlam selikli qişa arasındakı sərhəddən götürür.
B) Analiz üçün materialı əsnəkdən steril pambıq tamponla götürür
C) Əsnəkdən yaxma götürərkən dili şpatellə tutub saxlayır
D) Əsnəkdən götürülən yaxma tez quruduğuna görə laboratoriyaya tez çatdırır
E) Yaxmanı xəstə ağzını dezinfeksiyaedici məhlulla yaxaladıqdan dərhal sonra götürür

Ədəbiyyat: : N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı ”. Səh.51 Bakı 2008

148) Nəbzi hansı arteriyalarda saymaq mümkündür?

A) Gicgah arteriyasında
B) Sadalanan bütün arteriyalarda
C) Bud arteriyasnda
D) Yuxu arteriyasında
E) Mil arteriyasında

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı ”. Səh.64 Bakı 2008.

149) Stasionarda müalicə alan zaman yataq rejimində olan xəstəyə aşağıda sadalananlardan hansına icazə verilir?

A) Şöbədə gəzmək
B) Yalnız ayaqyoluna getmək
C) Xəstəxananın həyətində gəzmək
D) Xəstəxananın ərazisindən kənarda gəzmək
E) Yalnız çarpayıda hərəkət etmək

Ədəbiyyat:C.N. Hacıyev ; R.Y.Əliyev . Xəstələrə qulluq. Səh. 31. “ Təhsil ” Bakı 1998.

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

150) Böyüklərdə mədənin yuyulması üçün təmiz suyun miqdarını göstərin (litrlə).

A) 2
B) 0,5
C) 1
D) 10
E) 4

Ədəbiyyat: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». «Медицина». Москва 1983 . Səh. 106

151) Sadalanan simptomlardan hansı həzm sistemi xəstəliklərinin əsas simptomlarındandır?

A) Boğulma
B) Təngnəfəslik
C) Bəlğəm ifrazı
D) Qusma
E) Öskürək

Ədəbiyyat: C.N. Hacıyev ; R.Y.Əliyev . Xəstələrə qulluq . Səh. 187. " Təhsil " Bakı 1998 .

152) Yataq yaralarının profilaktikasına nə aiddir?
1. Yataq ağlarının tez-tez dəyişdirilməsi
2. Xəstəyə tənəffüs gimnastikası etdirmək
3. Yataq ağlarının həftədə bir dəfə dəyişdirilməsi
4. Xəstənin dərisinin dezinfeksiya edici məhlullarla silinməsi
5. Xəstəni rejimlə qidalandırmaq

A) 1,4
B) 2,5
C) 4,5
D) 1,3
E) 2,4

Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə " Tibb bacısının məlumat kitabı ". Səh. 58-59 Bakı 2008

153) Dodaqların və barmaq uclarının göyərməsi necə adlanır?

A) Akrosianoz
B) Hipotermiya
C) Avazıma
D) Diffuz sianoz
E) Hiperemiya

Ədəbiyyat:С.А.Мухина. «Общий уход за болъными». Москва «Медицина» 1983. Стр 197

154) Qızdırıcı kompresin düzgün qoyulmaması özünü nə ilə göstərir?

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Kompres qoyulan yerdə qan damarları genişlənir
B) Xəstə üşüyür
C) Kompres qoyulan yerdə ağrı azalır
D) Kompres qoyulan yerdə iltihabi proses sorulur
E) Kompres qoyulan yer isinir

Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı ”. Səh. 55 “ Çıraq ” 2008.

155) Tac damarların aterosklerozu zamanı əsas simptom hansıdır?

A) Baş ağrısı
B) Ürəkbulanma
C) Təngnəfəslik
D) Döş sümüyü arxası ağrı
E) Hipertenziya

Ədəbiyyat: A.C.Сметнев. «Внутренние болезни». Москва «Медицина». 1990 Стр 194-198

156) Miokard infarktının hansı forması atipik forma deyil?

A) Anginoz forma
B) Aritmik forma
C) Serebral forma
D) Astmatik forma
E) Abdominal forma

Ədəbiyyat: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр 307-317

157) Bədənin hansı nahiyələrində temperatur digər nahiyələrdən 1 dərəcə yüksək olur?
1. Düz bağırsaqda;
2. Uşaqlıqda;
3. Qoltuqaltında;
4. Qasıqda;

A) 1; 4
B) 2; 4
C) 1; 2
D) 2; 3
E) 1; 3

Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh. 82 “ Çıraq ” 2008

158) Yetkin şəxsdə sakit halda tənəffüs hərəkətlərinin sayı 1 dəqiqədə neçədir?

ensiz.az ödənişsiz istifadə üçün

A) 20-30
B) 16-20
C) 35-40
D) 30-35
E) 10-16

Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı ”. Səh. 83 “ Çıraq ” 2008.

159) Qida borusu, mədə və 12 barmaq bağırsağın endoskopik müayinəsinə hazırlarkən xəstəyə imalə nə zaman qoyulur?

A) Həmin gün səhər
B) Qoyulmur
C) Müayinədən əvvəl
D) Bir gün əvvəl axşam
E) Bir gün əvvəl səhər-axşam

Ədəbiyyat: С.А.Мухина. «Общий уход за болъными». Москва «Медицина» 1983. Стр 207

160) Xroniki qastritin müalicəsi üçün istifadə olunan ferment preparatları hansılardır?

A) Atropin, festal
B) Atropin, qastrosepin
C) Panzinozm, festal
D) Vikalin, simetidin
E) Vikalin, platifillin

Ədəbiyyat: А.С.Сметнев. «Внутренние болезни». Москва «Медицина». 1990 Стр 299-300

161) Ürək qüsurlarının yaranması ilə fəsadlaşan xəstəlik hansıdır?

A) Revmatizm
B) ÜİX
C) Eksudativ plevrit
D) Kəskin qastrit
E) Hipertoniya

Ədəbiyyat: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр 287

162) Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorasının ağırlaşmasına aid deyil?

A) Xoranın penetrasiyası
B) Perforasiya
C) Başqa orqanlara metastaz
D) Bədxassəli transformasiya

sek.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Qanaxma

Ədəbiyyat: В.М.Богомобов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр 349

163) Kəskin qlomerulonefrit xəstəliyi zamanı hansı müayinə metodları ilk növbədə aparılmalıdır?

A) Böyrəklərin R-Skopiyası
B) Böyrəklərin USM-si
C) Ekskretor Uroqrafiya
D) Qanın və sidiyin ümumi müayinəsi
E) Sistoskopiya

Ədəbiyyat: В.М.Богомобов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр 396

164) Böyrəkdaşı sancısı zamanı həkiməqədər ilk yardım nədən ibarətdir?

A) Dəri altına promedol
B) Xəstəyə üfüqi vəziyyət verib, ayaqlarını azacıq qaldırmaq
C) Bel nahiyəsinə quru isti, ilıq vannalar, analgetiklər və spazmolitiklər
D) Xəstəyə sidikqovucular vermək
E) Xəstəni hospitalizasiya etmək

Ədəbiyyat: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр 414

165) Uzun müddət yataqda olan xəstədə yataq yaraları hansı nahiyədə müşahidə edilmir?

A) Qarın nahiyəsində
B) Dabanda
C) Omada
D) Kürəkdə
E) Ənsədə

Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı ”.Səh.52 “Çıraq ” 2008

166) Hansı xəstəliklər zamanı xəstə passiv vəziyyətdə olmalıdır?

A) Pielonefrit
B) Xroniki qastrit
C) Xolesistit
D) Ağciyər vərəmi
E) Miokard infarktı

Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı ”. Səh.107 “Çıraq ” 2008.

smk.az ödənişsiz istifadə üçün

167) “Çəlləyəbənzər” döş qəfəsi hansı xəstəlik üçün xarakterik sayılır?

A) Ağciyərlərin emfizeması
B) Xroniki bronxit
C) Krupoz pnevmoniya
D) Bronxial astma
E) Quru plevrit

Ədəbiyyat: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр 234

168) Krupoz pnevmoniya üçün xarakterik olan bəlğəm hansıdır?

A) “Paslı” bəlğəm
B) Selikli bəlğəm
C) İrinli bəlğəm
D) Selikli-irinli bəlğəm
E) Bəlğəm olmur

Ədəbiyyat: А.С.Сметнев. «Внутренние болезни». Москва «Медицина». 1990. Стр 20.

169) Bronxial astma xəstəliyinin əsas ağırlaşması hansıdır?

A) Miokardit
B) Ağciyər qanaxması
C) Astmatik status- Tənəffüs çatışmazlığı
D) Ürək çatışmazlığı
E) Spontan pnevmotoraks

Ədəbiyyat: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр 215-216

170) Xəstəxanada aşağıda göstərilən dərman maddələrindən hansını soyuducuda saxlamağa ehtiyac yoxdur?

A) Məlhəmləri
B) Vaksinləri
C) Dərman şamlarını
D) Narkotikləri
E) Zərdabları

Ədəbiyyat: C.N.Hacıyev ; R.Y. Əliyev . Xəstələrə qulluq . Səh.128 . “ Təhsil ” Bakı 1998.

171) Xroniki böyrək çatışmazlığı zamanı qidada hansı maddələri məhdudlaşdırmaq lazımdır?

A) Yağları
B) Duzları
C) Karbohidratları
D) Vitaminləri

sok.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Zülalları

Ədəbiyyat: N.R. Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.178-179. “Azərnəşr” Bakı 1984

172) Xəstənin qidalanması zamanı göstərilən üsullardan hansı süni qidalanmaya aid deyil?

A) Xəstənin qaşıqla yedizdirilməsi
B) Fistula vasitəsilə yedizdirilmə
C) Parenteral yolla qidalanma
D) Qida maddələrini düz bağırsaqdan yeritmək
E) Qidanın zondla yeridilməsi

Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.129 “ Çıraq ” 2008.

173) Ocaqlı pnevmoniya zamanı hansı müayinələrin aparılması daha məqsədəuyğundur?

A) Döş qəfəsinin R-qrafiyası, bəlğəmin müayinəsi, qanın ümumi müayinəsi
B) EKQ
C) Bronxoskopiya
D) Qanın ümumi və biokimyəvi müayinəsi
E) Qanın və sidiyin ümumi müayinəsi

Ədəbiyyat: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни».Москва«Медицина»1983.Стр 221-223

174) Miokard infarktı olan xəstəyə tibb işçisi nəyi qadağan edə bilər?

A) Suda bişmiş balığı
B) Qaz əmələ gətirən qidaları (lobya, kartof, qara çörək və s.)
C) Suda bişmiş əti
D) Meyvə şirələrini
E) Buxarda bişmiş kotleti

Ədəbiyyat:N.R. Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.141 “Çıraq ” 2008.

175) Ocaqlı pnevmoniya xəstəliyinin mümkün fəsadı hansıdır?

A) Quru plevrit
B) Xroniki bronxit
C) Abseslənmə
D) Eksudativ plevrit
E) Bronxial astma

Ədəbiyyat: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983.Стр 221-223

sınaq üçün istifadə üçün ödənişsiz

176) Əzələ daxilinə inyeksiya zamanı ən çox nə qədər məhlul yeritmək olar?

A) 10 ml
B) 20 ml
C) 3 ml
D) 2 ml
E) 5 ml

Ədəbiyyat: C.N. Hacıyev ; R.Y.Əliyev . Xəstələrə qulluq .Səh.152 . " Təhsil " Bakı 1998.

177) Sadalananlardan hansı inyeksiyanın ağırlaşması deyil?

A) Dəridə damar ulduzcuqlarının olması
B) İnfiltrat
C) Fleqmona
D) Abses
E) Hematoma

Ədəbiyyat:C.N.Hacıyev ; R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq . Səh. 160. " Təhsil " Bakı 1998.

178) Xəstəni nəcisdə gizli qana görə müayinəyə hazırlayarkən qidadan hansı ərzaq çıxarılmalıdır?

A) Ət
B) Süd
C) Yağ
D) Südlü sıyıq
E) Çörək

Ədəbiyyat: N.R. Paleyevin redaktəsi ilə "Tibb bacısının məlumat kitabı". Səh.78 "Azərnəşr" Bakı 1984

179) Daxili qanaxmalar zamanı xəstələri nəql edərkən onlara hansı vəziyyət verilməlidir?

A) Xəstəni xərəyə baş hissəsi aşağı salınmış vəziyyətdə uzandırırlar
B) Xəstə xərəkdə arxası üstə, ayaqları dizdən bükülmüş vəziyyətdə uzanmalıdır
C) Xəstə xərəkdə bir böyrü üstdə uzanmalıdır
D) Xəstəyə xərəkdə yarımoturaq vəziyyət verilməlidir
E) Xəstə xərəkdə arxası üstə, başı yana çevrilmiş vəziyyətdə uzanmalıdır

Ədəbiyyat: C.N.Hacıyev ; R.Y. Əliyev . Xəstələrə qulluq . Səh. 45 . " Təhsil " Bakı 1998.

180) Qida zəhərlənmələri zamanı göstərilən təxirəsalınmaz yardım nə ilə başlanılır?

A) Dəri altına atropin vurmaqla
B) Ürək-damar preparatları vurmaqla
C) Dəri altına və ya venaya məhlul yeritməklə
D) Mədənin yuyulması ilə
E) İmalə ilə

Sitə az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı ”.Səh.514 “Çıraq ” 2008.

181) Elektrotravma zamanı aşağıda göstərilən yardımlardan hansı qəti qadağandır?

A) Elektrik vurma nəticəsində əmələ gələn yanıq nahiyəsinə aseptik sarğı qoymaq
B) Xəstəni ən yaxın xəstəxanaya aparmaq
C) Xəstəni dərhal cərəyan mənbəyindən ayırmaq
D) Dərialtına kofein, kordiamin, kamfora vurmaq (damar çatışmazlığı olarsa)
E) Elektrik vurmuş şəxsi torpağa basdırmaq

Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı ”. Səh.521 “Çıraq ” 2008.

182) Poliuriya nədir?

A) Sidik ifrazının olmaması
B) Gün ərzində ifraz olunan sidiyin miqdarının azalması
C) Gün ərzində ifraz olunan sidiyin miqdarının artması
D) Sidik kisəsinin boşalmasının mümkün olmaması
E) Tez-tez az miqdarda sidik ifrazının olması

Ədəbiyyat: N.R. Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.90 “Azərnəşr” Bakı 1984 В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». «Медицина». Москва 1983 . Səh. 122

183) Sadalananlardan hansı ağciyərlərin irinli xəstəliklərinə aiddir?

A) Ağciyər absesi və qanqrenası
B) Bronxial astma
C) Krupoz pnevmoniya
D) Ağciyərlərin emfizeması
E) Kəskin bronxit

Ədəbiyyat: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983.Стр 226-231

184) Bu xəstəliklərdən hansının kəskin forması mövcud deyil?

A) Bronxit
B) Qastrit
C) Pnevmoniya
D) Bronxial astma
E) Pielonefrit

Ədəbiyyat: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр 215

sesk.az ödənissiz istifadə üçün

185) Bu xəstəliklərdən hansı yalnız xroniki formada olur?

A) Qastrit
B) Pnevmoniya
C) Pielonefrit
D) Bronxit
E) Hipertoniya xəstəliyi

Ədəbiyyat: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр 302

186) Aşağıdakı müayinələrdən hansı bronxit xəstəliyi zamanı lazım olan məlumatı vermir?

A) Qastroskopiya
B) Döş qəfəsinin R-skopiyası
C) Döş qəfəsinin R-qrafiyası
D) Ağciyərlərin auskultasiyası
E) Bronxoskopiya

Ədəbiyyat: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр 174

187) Aşağıdakı dərmanlardan hansıları tənəffüs sistemi xəstəliklərində məqsədəuyğun deyil?

A) Vitaminlər
B) Bəlğəmgətiricilər
C) İltihabəleyhi preparatlar
D) Antibiotiklər
E) Mədə fermentləri

Ədəbiyyat:В.М.Боголюбов, ,,Внутренние болезни,,.Москва ,,Медицина,,1983.Стр.225

188) Hipoqlikemik koma zamanı həkim gələnə qədər tibb işçisinin göstərdiyi yardımlardan hansı xəstənin vəziyyətini daha da ağırlaşdırar?

A) Xəstəyə bir neçə parça qənd vermək
B) Xəstəyə şirin çay vermək
C) Xəstəyə bir qaşıq bal vermək
D) Dərialtına insulin vurmaq
E) Venaya 20-40 ml 40 %-li qlükoza məhlulu yeritmək

Ədəbiyyat:N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı ”. Səh.511 “Çıraq ”2008.

189) Nəbz kəsiri nədir?

A) Nəbzin sayının normadan az olması
B) Nəbzin ritminin pozulması

Sitkaz ödənişsiz istifadə üçün

C) Periferik nəbzin sayı ilə ürək yığılmalarının sayı arasındakı fərq
D) Sağ və sol qolda nəbzin sayının müxtəlif olması
E) Nəbzin sayının normadan çox olması

Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə " Tibb bacısının məlumat kitabı". Səh.65 "Çıraq " 2008.

190) Bakterioloji müayinə üçün sidik toplayarkən tbb işçisi nəyi düzgün etmir?

A) Sidiyin ilk porsiyasını tullayıb, ikinci porsiyadan toplayır.
B) Sidiyi götürən kimi dərhal analizə göndərir.
C) Sidik götürməzdən əvvəl uretranı şırınqalıyır.
D) Sidiyi kateterlə götürür.
E) Sidiyi ilk porsiyası ilə birgə qaba toplayır.

Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə " Tibb bacısının məlumat kitabı ".Səh.78 " Çıraq " 2008.

191) Disfagiya nədir?

A) Qidanın mədədən 12 barmaq bağırsağa keçməsinin ləngiməsi
B) Mədə möhtəviyyatının qida borusuna keçməsi
C) Yoğun bağısaqların distal hissəsinin boşalması
D) Udma aktının pozulması
E) Mədə möhtəviyyatının ağızdan xaric olması

Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə " Tibb bacısının məlumat kitabı ". Səh.35 "Çıraq" 2008.

192) Anuriya nədir?

A) Sidik ifrazının ağrılı olması
B) Sidik ifrazının olmaması
C) Gün ərzində sidik ifrazının azalması
D) Tez-tez az miqdarda sidik ifrazının olması
E) Gün ərzində sidik ifrazının artması

Ədəbiyyat:: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». «Медицина». Москва 1983 . Səh. 122

193) Işuriya nədir?

A) Sidik kisəsinin boşalmasının mümkün olmaması
B) Tez-tez az miqdarda sidik ifrazının olması
C) Gün ərzində sidik ifrazının azalması
D) Gün ərzində sidik ifrazının artması
E) Sidik ifrazının tam olmaması

Ədəbiyyat: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». «Медицина». Москва 1983 . Səh. 123

smk.az ödənişsiz istifadə üçün

194) Sonuncu qida qəbulu mədə zondlanmasından nə qədər əvvəl olmalıdır?

A) Müayinə olunan gün səhər
B) Müayinədən əvvəlki gün axşam
C) Müayinədən əvvəlki gün günorta
D) Müayinədən əvvəlki gün səhər
E) Müayinədən iki saat əvvəl

Ədəbiyyat:В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». «Медицина». Москва 1983 . Səh. 106

195) Döş sümüyü arxasında deşici, yandırıcı ağrıların olması zamanı tibb bacısının taktikası?

A) Xəstənin hərəkətsizliyini təmin etmək
B) Mədəsini yumaq
C) Narkotiklərdən istifadə etmək
D) Ayaqlarını isti vanna etmək
E) Analgetiklərdən istifadə etmək

Ədəbiyyat:: N.R. Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.158 “Azərnəşr” Bakı 1984

196) Stenokardiya tutması zamanı təxirəsalınmaz yardım?

A) Əzələ daxilinə baralgin
B) Vena daxilinə prednizolon
C) Dəri altına morfin
D) Vena daxilinə dimedrol
E) Dil altına nitroqliserin

Ədəbiyyat:: N.R. Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.158 “Azərnəşr” Bakı 1984

197) Xolesistoqrafiya hansı orqanın rentgenoloji müayinə metodudur?

A) Öd kisəsinin
B) Mədənin
C) Qara ciyərin
D) Süd vəzisinin
E) Ağ ciyərlərin

Ədəbiyyat: N.R. Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.501 “ Çıraq “ 2008

198) Uroqrafiya hansı orqanın rentgenoloji müayinə metodudur?

A) Süd vəzisinin
B) Öd kisəsinin
C) Sidik sisteminin

sdk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Ağ ciyərlərin
E) Qara ciyərin

Ədəbiyyat:: N.R. Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.499 “Çıraq “ 2008

199) Qəbul şöbəsində sanitar işləmə zamanı xəstə qəflətən huşunu itirdikdə tibb bacısının taktikası nədən ibarətdir.

A) Arterial təzyiqi ölçür
B) Kordiamin inyeksiyası edir, həkimi çağırır
C) Xəstəni uzandırıb, naşatır spirti ilə isladılmış pambığı iylədir və həkimi çağırır
D) Tənəffüsü sayır
E) Ürək-ağciyər reanimasiyası tədbirlərinə başlayır

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh. 513 “Çıraq “ 2008.

200) Hipertonik kriz zamanı göstərilən qulluq elementləri hansılardır?

A) Nəmləndirilmiş oksigenin verilməsi
B) Qusma zamanı yardım
C) Termometriya
D) Qanın müayinə edilməsi
E) Su balansının təyini

Ədəbiyyat: : N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.507. “Çıraq “ 2008

201) Ürəyin işemik xəstəliyi zamanı xəstənin qidasında hansı məhsullar məhdudlaşdırılır?

A) Şəkər
B) Xörək duzu
C) Ədviyyatlar
D) Bitki mənşəli yağlar
E) Meyvə

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.141 “Çıraq “ 2008.

202) Arterial hipertoniya xəstəliyi zamanı hansı pəhriz məsləhət görülür?

A) Yağların və karbohidratların məhdudlaşdırılması
B) Maye və duzların məhdudlaşdırılması
C) Yağların və zülalların artırılması
D) Maye və zülalların istifadəsinin artırılması
E) Maye və yağların məhdudlaşdırılması

Snsk az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: : N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb basının məlumat kitabı”. Səh. 138. “ Çıraq “ 2008.

203) Nitroqliserinin effektiv təsiri qəbul edildikdən neçə dəqiqə sonra başlayır?

A) 40-50
B) 30-40
C) 10-15
D) 20-25
E) 3-5

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı” .Səh. 506 “ Çıraq “ 2008.

204) Ağciyər qanaxması zamanı tibb işçisinin taktikası nədən ibarətdir?

A) Xardal və banka qoymaq
B) Ayaqları vanna etmək
C) Qanəvəzedicilər vurmaq
D) Tam sakitliyi təmin etmək, həkimi çağırmaq
E) Oksigenoterapiya aparmaq

Ədəbiyyat: : N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh. 511 “ Çıraq” 2008.

205) Bronxial astma tutması zamanı xəstə hansı məcburi vəziyyəti alır?

A) Əllərini dayaq verərək oturur
B) Başı aşağı əyilmiş şəkildə oturmuş
C) Yan tərəfi üstə
D) Ayaqlarını qaldırmaqla horizontal
E) Horizontal

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh. 504 “ Çıraq “ 2008.

206) Bəlğəmi ümumi analizə görə yığmaq üçün xəstə nə ilə təmin olunmalıdır?

A) Plastmas qab ilə
B) Steril sınaq borusu ilə
C) İçində su olan banka ilə
D) Quru banka ilə
E) Quru sınaq borusu ilə

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı “ .Səh.15 “ Çıraq “ 2008.

207) Xəstəni mədə zondlanmasına hazırlayarkən təmizləyici imalə nə zaman aparılır?

sntk.az odənişsiz istifadə üçün

A) Axşam və səhər
B) Aparılmır.
C) Müayinədən 5 dəqiqə əvvəl
D) Müayinə olunan gün səhər
E) Müayinədən əvvəlki axşam

Ədəbiyyat: : C.N.Hacıyev ; R.Y.Əliyev . Xəstələrə qulluq. Səh.203.“Təhsil” Bakı 1998

208) Xəstənin mədə zondlanmasına hazırlanması necə həyata keçirilir?

A) Səhər və axşam sifon imaləsi
B) Axşam-təmizləyici imalə
C) Səhər və axşam təmizləyici imalə
D) Axşam-yüngül şam yeməyi, səhər-acqarına
E) Səhər- sifon imaləsi

Ədəbiyyat: : C.N.Hacıyev; R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh. 194.“Təhsil” Bakı 1998.

209) Xəstənin qida borusu, mədə və 12 barmaq bağırsağın endoskopik müayinəsinə hazırlanması necə həyata keçirilir?

A) Axşam-təmizləyici imalə
B) Səhər- sifon imaləsi
C) Səhər və axşam təmizləyici imalə
D) Səhər və axşam sifon imaləsi
E) Axşam-yüngül şam yeməyi, səhər-acqarına

Ədəbiyyat:: C.N.hacıyev ; R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh. 212 “ Təhsil “Bakı” 1998

210) Xəstənin mədə rentgenoqrafiyasına hazırlanması necə həyata keçirilir?

A) Müayinədən üç gün əvvəl tərkibində dəmir olan qidaları rasiondan çıxarmaq
B) Axşam-yüngül şam yeməyi, səhər-acqarına
C) Səhər və axşam təmizləyici imalə
D) Səhər- sifon imaləsi
E) Axşam-təmizləyici imalə

Ədəbiyyat: : C.N.Hacıyev ; R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh.210 “ Təhsil” Bakı 1998.

211) Xəstənin rektoromanoskopiyaya hazırlanması necə həyata keçirilir?

A) Səhər yağ imaləsi
B) Səhər sifon imaləsi
C) Axşam sifon imaləsi
D) Axşam təmizləyici imalə
E) Axşam və səhər təmizləyici imalə etmək

Ədəbiyyat: : C.N. hacıyev ; R.Y.Əliyev. Xəstlərə qulluq. Səh. 215. “ Təhsil” Bakı 1998.

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

212) Çox miqdarda, irinli-üfunətli bəlğəm ifrazı hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Ağciyər absesi
B) Bronxial astma
C) Eksudativ plevrit
D) Ağciyərlərin emfizeması
E) Xronik bronxit

Ədəbiyyat:: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр226-229

213) Qidada yod çatışmazlığı hansı xəstəliyin əmələ gəlməsinə səbəb olur?

A) Kəskin qastrit
B) Diffuz toksiki ur
C) Piylənmə
D) Şəkərli diabet
E) Endemik ur

Ədəbiyyat:: В.М.Боголюбов. Внутренние болезни. Стр.424 Москва. «Медицина» 1983.

214) Klinik ölümün əsas əlamətlərinə aiddir?

A) Sapvari nəbz, bəbəklərin genişlənməsi, sianoz
B) Huşun itməsi, ürəyin və tənəffüsün dayanması, bəbəklərin genişlənməsi, iri arteriyalarda nəbzin itməsi
C) Tənəffüsün dayanması, genəlmiş bəbəklərin işığa reaksiyasının olmaması
D) Huşun itməsi, yuxu arteriyasında nəbzin itməsi
E) Huşun itməsi, sianoz, bəbəklərin genişlənməsi

Ədəbiyyat:C.N.Hacıyev ; R.Y.Əliyev . Xəstələrə qulluq. Səh.242. " Təhsil" Bakı 1998

215) Anafilaktik şokun əsas əlamətləri hansıdır?

A) Bel nahiyəsində ağrı, ödem, hipertoniya
B) Ödem, hipotoniya, sianoz
C) Mədə qıcqırması, gəyirmə
D) Tənginəfəslik, paslı bəlğəmli öskürək
E) İstilik hissi, arterial təzyiqin enməsi,huşun itməsi

Ədəbiyyat:N.R.Paleyevin redaktəsi ilə " Tibb bacısının məlumat kitabı". Səh. 504. " Çıraq" 2008.

216) Sutka ərzində 1 l-ə qədər bəlğəm ifrazı hansı xəstəlikdə rast gəlinir?

A) Ocaqlı pnevmaniya
B) Ağciyər xərçəngi
C) Bronxial astma
D) Ağciyər abses
E) Bronxit

Sınaq üzrə ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни».Москва«Медицина» 1983.Стр .226-231

217) Sadalananlardan hansı Kəskin miokard infarktı zamanı həkiməqədərki yardıma aiddir?
1. Nitroqliserin vermək
2. Fiziki sakitliyi təmin etmək
3. Təcili hospitalizasiya etmək
4. Kardioloji briqada çağırmaq
5. Spazmolitiklər vermək

A) 4, 1, 3
B) 3, 4, 5
C) 3, 2, 5
D) 1, 3,5
E) 1, 2, 4

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitab”. Səh.506. “ Çıraq” 2008.

218) Dərman maddələrinin sublinqval qəbulu hansı üsuldur?

A) Dilaltı
B) Dəriyə
C) Düzbağırsağa
D) Uşaqlıq yoluna
E) Tənəffüs yoluna

Ədəbiyyat:: C.N.Hacıyev ; R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh. 135. “ Təhsil” Bakı 1998.

219) Dərman maddələrinin xaricə işlənmə üsulu hansıdır?

A) Dəriyə, selikli qişaya
B) Düz bağırsaqdan
C) Ağızdan
D) Dəriiçi
E) Dərialtı

Ədəbiyyat:: C.N. Hacıyev ; R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh. 131. “ Təhsil” Bakı 1998.

220) Qazçıxarıcı borunu nə üçün bağırsaqda çox saxlamaq olmaz?

A) Qeyri-iradi nəcis ifraz olunur
B) Xəstəni narahat edir
C) Sterilliyi pozulur
D) Müalicə effekti olmur
E) Bağırsaq divarında yara əmələ gələ bilər

Ədəbiyyat:: C.N.Hacıyev ; R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh. 202. “ Təhsil” Bakı 1998.

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

221) Kateterizasiyadan əvvəl kateterə nə sürtülür?

A) Qliserin
B) Steril vazelin yağı
C) Antiseptik məhlul
D) Təmiz su
E) Bitki yağı

Ədəbiyyat:: C.N. hac.yev; R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh. 229.“ Təhsil” Bakı 1998.

222) İnhalyasion üsulla hansı dərman maddələri yeridilir?

A) Maye halda olan
B) Qaz halında olan
C) Suspenziyalar
D) Bərk halda olan
E) Məlhəmlər

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı” . Səh. 50 “Çıraq” 2008.

223) Kapsula daxilə necə qəbul olunmalıdır?

A) Xırda hissələrə bölərək
B) Dilin üzərinə səpilmiş
C) Dəyişilməmiş halda
D) Suda həll edərək içmək
E) Çeynənmiş halda

Ədəbiyyat:: C.N.Hacıyev ; R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh.135. “ Təhsil” Bakı 1998.

224) “Acqarnına” təyin olunmuş dərmanlar nə vaxt qəbul edilir?

A) Bilavasitə yeməkdən əvvəl
B) Yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl
C) Yeməkdən 10 dəqiqə əvvəl
D) Yeməkdən 15-20 dəqiqə əvvəl
E) Yeməkdən 1 saat əvvəl

Ədəbiyyat:: C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 135. “Təhsil” Bakı 1998.

225) Dərman maddələri hansı yolla yeridilməsi inhalyasiya adlanır?

A) Dilaltına
B) Toxumalara
C) Tənəffüs yoluna
D) Qarın boşluğuna
E) Selikli qişalara

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı” . Səh. 50 “Çıraq “ 2008.

226) “B” siyahısına aid dərman maddələri hansıdır?

A) Güclü təsir göstərən
B) Zəhərli
C) Yuxugətirici
D) Bahalı
E) Antibiotiklər

Ədəbiyyat: : N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı” . Səh. 108. “Çıraq “ 2008

227) “A” siyahısına aid dərman maddələri hansıdır?

A) Desensibilizasiyaedici
B) Yuxugətirici
C) Hipotenziv
D) Güclü təsir göstərən
E) Zəhərli

Ədəbiyyat: : N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı” . Səh. 108. “Çıraq” 2008

228) Dəriiçi inyeksiya hansı nahiyədə aparılır?

A) Budun bayır səthi
B) Bazunun içəri səthi
C) Saidin içəri səthi
D) Sağrı
E) Göbək ətrafı nahiyyəyə

Ədəbiyyat:: C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev, Xəstələrə qulluq. Səh. 150. “ Təhsil” Bakı 1998.

229) Dərman maddələri əzələdaxili hansı nahiyyəyə yeridilir?

A) Saidin bayır səthi
B) Sağrı əzələsi (Deltayabənzər əzələ)
C) Saidin içəri səthi
D) Qarnın ön divarı
E) Kürəkaltı nahiyyə

Ədəbiyyat:: C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 152. “ Təhsil” Bakı 1998

230) Əzələdaxili inyeksiya zamanı baş verə biləcək ağırlaşma hansıdır?

A) Qanaxma

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) İnfiltrat
C) Yağ emboliyası
D) Tromboflebit
E) Hava emboliyası

Ədəbiyyat: : C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 160. “ Təhsil” Bakı 1998

231) Əzələdaxili inyeksiya zamanı iynənin uzunluğu nə qədər olmalıdır (mm-lə)?

A) 20
B) 30
C) 80
D) 10
E) 40

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı” . Səh. 49. “Çıraq” 2008

232) Venadaxilinə damcı üsulu ilə dərman yeridilərkən xəstənin vəziyyəti necə olmalıdır?

A) Ayaq üstə
B) Qarnı üstə uzanmış
C) Oturmuş
D) Arxası üstə uzanmış
E) Sağ və ya sol tərəfi üstə uzanmış

Ədəbiyyat:: C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 156. “ Təhsil “ Bakı 1998

233) İnsulinlə müalicə zamanı baş verə biləcək ağırlaşma hansıdır?

A) Tromboflebit
B) Lipodistrofiya
C) Nekroz
D) Qanaxma
E) Hepatit

Ədəbiyyat: : C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 160. “ Təhsil “ Bakı 1998

234) İnyeksiya yerini işləmək üçün neçə dərəcəli spirtdən istifadə edilir?

A) 80
B) 70
C) 60
D) 96
E) 75

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı” . Səh. 48. “Çıraq” 2008

smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

235) Venadaxili inyeksiyanın ani ölümlə nəticələnən ağırlaşması hansıdır?

A) Hava emboliyası
B) Qanaxma
C) Hematoma
D) Nekroz
E) Sepsis

Ədəbiyyat:: C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 162. “ Təhsil” Bakı 1998

236) Mədə-bağırsağı qıcıqlandıran dərman maddələrini nə vaxt qəbul etmək lazımdır?

A) Yemək vaxtı
B) Yeməkdən əvvəl
C) 2 yemək arasında
D) Yeməkdən sonra, su ilə
E) Yeməkdən 2 saat sonra

Ədəbiyyat:: C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh. 135. “ Təhsil” Bakı 1998

237) 10%-li kalsium-xloridin vena daxili düzgün yeridilməməsi nəticəsində hansı ağırlaşma inkişaf edir?

A) Nekroz
B) Abses
C) Qanaxma
D) Hepatit
E) Tromboflebit

Ədəbiyyat: : C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 161. “ Təhsil” Bakı 1998

238) İnyeksiya (dərialtı, əzələdaxili) yerində infiltrat əmələ gələrsə nə etmək vacibdir?

A) Yerli isidici kompress
B) Aseptik sarğı
C) İnyeksiya yerindən aşağıda turna qoymaq
D) İnyeksiya yerindən yuxarıda turna qoymaq
E) Buz qovuğu

Ədəbiyyat: : C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 160. “ Təhsil” Bakı 1998

239) Yağlı steril məhlulları hansı üsulla yeritmək olmaz?

A) Əzələdaxili
B) Düzbağırsağa
C) Venadaxili
D) Dərialtı

yk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Bütün cavablar düzdür

Ədəbiyyat:: C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 162. “ Təhsil” Bakı 1998

240) Dərman maddələrinin parenteral yeridilməsinə aiddir:

A) Dilaltı
B) Düz bağırsağa
C) Uşaqlıq yolu ilə
D) Tənəffüs yolları ilə
E) Əzələdaxili, venadaxili

Ədəbiyyat:: C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 137. “ Təhsil” Bakı 1998

241) Havanın damar mənfəzinə keçməsi hansı ağırlaşmaya səbəb olur?

A) Ödem
B) Nekroz
C) İnfiltrat
D) Hava emboliyası
E) Tromboflebit

Ədəbiyyat:: C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 162. “ Təhsil” Bakı 1998

242) Dərman maddələrinin venadaxili yeridilməsinin əsas üstünlüyü nədən ibarətdir?

A) Asan olması
B) Müxtəlif preparatların yeridilməsinin mümkün olmaması
C) Təxirəsalınmaz tibbi yardım zamanı effektivliyin yüksək olması
D) Xəstədə narahatlıq yaratmaması
E) Qaraciyərin baryer rolunun kənarda qalması

Ədəbiyyat:: C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 154. “ Təhsil” Bakı 1998

243) Venadaxili inyeksiya zamanı iynə damara hansı dərinlikdə yeridilir?

A) Damarın necə yerləşməsindən asılıdır
B) İynənin 1/3 (üçdə biri) yeridilir
C) İynənin 2/3 (üçdə ikisi) yeridilir
D) Yalnız iynənin en kəsiyi yeridilir
E) İynənin bütün uzunluğu yeridilir

Ədəbiyyat: : C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 154. “ Təhsil” Bakı 1998

244) Vena daxili yeridilən 10%-li kalsium-xlorid səhvən dəri altına düşərsə tibb bacısı həmin nahiyəyə nə yeritməlidir?

A) 3%-li hidrogen-peroksid

ask.az ödənişsiz istifadə üçün

B) 5%-li qlükoza
C) 10%-li natrium-xlorid
D) Fizioloji məhlul
E) 2%-li novokain

Ədəbiyyat:C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 161. “ Təhsil” Bakı 1998

245) Təmizləyici imalənin aparılması üçün nədən istifadə olunur?

A) Jane şprisindən
B) Qazçıxarıcı borudan
C) Esmarx parçından
D) Armudabənzər balondan
E) Ucunda qıf olan zonddan

Ədəbiyyat:: C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 203. “ Təhsil” Bakı 1998

246) Təmizləyici imalə qoyulan zaman ucluq hansı dərinliyə yeridilməlidir (sm-lə)?

A) 30
B) 20
C) 10-12
D) 40
E) 2-4

Ədəbiyyat:N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı” . Səh. 41. “Çıraq “ 2008

247) Təmizləyici imalə qoyulan zaman xəstə hansı vəziyyətdə olmalıdır?

A) Dizləri və dirsəkələri yerə dayanmış vəziyyətdə
B) Qarnı üstə
C) Arxası üstə
D) Sol tərəfi üstə
E) Sağ tərəfi üstə

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı” . Səh. 41.“Çıraq “ 2008

248) Ağır xəstənin dərisini hər gün hansı məhlulla silmək lazımdır?

A) 960-li etil spirti ilə
B) 10%-lı kalium permanqanatla
C) 10%-lı naşatır spirti ilə
D) 10%-lı kamfora spirti ilə
E) 0,02%-lı furasillin məhlulu ilə

Ədəbiyyat:: C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 63. “ Təhsil” Bakı 1998

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

249) Ağciyərlərin irinli xəstəliklərinin müalicəsində əsasən hansı qrup dərmanlara üstünlük verilir?

A) Ağrıkəsicilər
B) Antibiotiklər
C) Vitaminlər
D) Bronxolitiklər
E) Xolinolitiklər

Ədəbiyyat:: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр226-231

250) Ikinci dərəcəli yataq yarasının əlaməti hansıdır?

A) Ödem
B) Qızartı
C) Yara
D) Avazıma
E) Ödem və suluqlar

Ədəbiyyat: C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev, Xəstələrə qulluq. Səh. 63. " Təhsil" Bakı 1998

251) Üçüncü dərəcəli yataq yarasının müalicəsi necə aparılmalıdır?

A) Cərrahi üsulla
B) Vazelin sürtmək
C) Masaj etmək
D) 10%-lı kamfora spirti ilə silmək
E) 70-li etil spirti ilə silmək

Ədəbiyyat:N.R.Paleyevin redaktəsi ilə " Tibb bacısının məlumat kitabı". Səh 53. "Çıraq " 2008

252) Soyuq kompresi neçə dəqiqədən bir dəyişirlər?

A) 2-3
B) 10
C) 30
D) 40
E) 60

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə " Tibb bacısının məlumat kitabı" . Səh. 56. "Çıraq " 2008

253) İsti kompresi neçə dəqiqədən bir dəyişirlər?

A) 50
B) 2-3
C) 60
D) 30

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) 10 -15

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh. 56. “Çıraq “ 2008

254) Gün ərzində bədən temperaturu hansı həddə dəyişir (C°)?
A) 0,3-0,8
B) 0,8-1,0
C) 1,5-2,0
D) 1,0-1,5
E) 0,1-0,3

Ədəbiyyat:N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı” . Səh. 82. “Çıraq “ 2008

255) Febril bədən temperaturu hansı həddə dəyişir (C0)?

A) 36,0-37,0
B) 39,0-41,0
C) 37,1-38,0
D) 38,1-39,0
E) 36,5-37,5

Ədəbiyyat: C.N Hacıyev; R.Y.Əliyev, Xəstələrə qulluq. Səh. 103. “ Təhsil” Bakı 1998

256) Dərman maddələrinin hansı üsulla yeridilməsi enteral qəbul adlanır?

A) Venadaxili
B) Əzələdaxili
C) Dərialtı
D) Peroral (ağızdan)
E) İntraspinal (onurğa kanalına)

Ədəbiyyat:: C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev, Xəstələrə qulluq. Səh. 135. “ Təhsil” Bakı 1998

257) Bir xörək qaşığının tutumu nə qədərdir (ml-lə)?

A) 5
B) 10
C) 30
D) 15
E) 20

Ədəbiyyat:: C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 135. “ Təhsil” Bakı 1998

258) Bir desert qaşığının tutumu nə qədərdir (ml-lə)?

A) 5
B) 10

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) 15
D) 20
E) 30

Ədəbiyyat:: C.N Hacıyev; R.Y.Əliyev, Xəstələrə qulluq. Səh. 135. “ Təhsil” Bakı 1998

259) Bir çay qaşığının tutumu nə qədərdir (ml-lə)?

A) 15
B) 5
C) 30
D) 10
E) 20

Ədəbiyyat:: C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 135. “ Təhsil” Bakı 1998

260) Həzmi asanlaşdıran ferment preparatlarını nə vaxt qəbul etmək lazımdır?

A) Yeməkdən 2 saat sonra
B) Yeməkdən əvvəl
C) Yeməkdən 1 saat sonra
D) Yemək arasında
E) Yemək vaxtı

Ədəbiyyat:: C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 135. “ Təhsil “ Bakı 1998

261) Yuxugətirici dərman maddələrini yatmazdan neçə dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır?

A) 40
B) 60
C) 50
D) 15
E) 30

Ədəbiyyat: C.N Hacıyev; R.Y.Əliyev, Xəstələrə qulluq. Səh. 135. “ Təhsil” Bakı 1998

262) Sidikdə zülalın olması necə adlanır?

A) Proteinuriya
B) Disproteinemiya
C) Bakteriemiya
D) Piuriya
E) Hipoproteinemiya

Ədəbiyyat:: C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 224. “ Təhsil” Bakı 1998

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

263) Böyrək sancısı zamanı bağırsağın peristaltikası necə dəyişir?

A) Kəskin artır
B) Azalır
C) Olmur
D) Dəyişmir
E) Artır

Ədəbiyyat:C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 220. “ Təhsil” Bakı 1998

264) Sidik kanalının strikturası dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) Deşilməsi
B) Daralması
C) Genişlənməsi
D) Qısalması
E) Tutulması

Ədəbiyyat:C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 222. “ Təhsil” Bakı 1998

265) Sistit hansı orqanın iltihabıdır?

A) Sidik axarlarının
B) Sidik kanalının
C) Böyrək ləyəninin
D) Böyrəklərin
E) Sidik kisəsinin

Ədəbiyyat:: C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev, Xəstələrə qulluq. Səh. 232. “ Təhsil” Bakı 1998

266) Ürək yığılmalarının sayı dəqiqədə 110 vurğudur - bu nədir?

A) Ekstrasistoliya
B) Səyrici aritmiya
C) Norma
D) Taxikardiya
E) Bradikardiya

Ədəbiyyat:C.N Hacıyev; R.Y.Əliyev, Xəstələrə qulluq. Səh. 180. “ Təhsil” Bakı 1998

267) Arterial təzyiq 180-110 mm civə st-dur - bu nədir?

A) Hipotenziya
B) Hipertenziya
C) Kollaps
D) Şok
E) Norma

Ədəbiyyat:C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 183. “ Təhsil” Bakı 1998

sns.az ödənişsiz istifadə üçün

268) Ürək yığılmalarının sayı dəqiqədə 54 vurğudur – bu nədir?

A) Səyrici aritmiya
B) Taxikardiya
C) Bradikardiya
D) Norma
E) Ekstrasistoliya

Ədəbiyyat:: C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 183. " Təhsil" Bakı 1998

269) Xronik qastritin kəskinləşməsi zamanı rasiondan hansı qidalar çıxarılır?

A) Tərəvəzlər
B) Meyvələr
C) Sıyıqlar
D) Südlü məhsullar
E) Yağlı, qızardılmış

Ədəbiyyat:C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 78. " Təhsil" Bakı 1998

270) Hansı bağırsağın qanaxması zamanı nəcisin rəngi qara olur?

A) Siqmayabənzər
B) Onikibarmaq bağırsağın
C) Enən çənbər
D) Köndələn çənbər
E) Düz

Ədəbiyyat:N.R.Paleyevin redaktəsi ilə " Tibb bacısının məlumat kitabı" . Səh. 148. "Çıraq " 2008

271) Nəcisdə gizli qanın müayinəsinə xəstəni hazırlayarkən hansı preparatların qəbulu dayandırılmalıdır?

A) Maqnezium
B) Kalium
C) Kalsium
D) Dəmir
E) Natrium

Ədəbiyyat:В.М.Боголюбов. Внутренние болезни. Стр.195 .Москва. «Медицина « 1983.

272) Sutkalıq diurezin 350 ml-ə qədər azalması necə adlanır?

A) Anuriya
B) Nikturiya
C) Nollakiuriya
D) Oliquriya
E) Poliuriya

sisk.az-dən icazəsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:: C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 223. “ Təhsil” Bakı 1998

273) Gecə diurezinin gündüz diurezindən çox olması necə adlanır?

A) Poliuriya
B) Oliquriya
C) Nikturiya
D) Pollakiuriya
E) Anuriya

Ədəbiyyat:C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 224. “ Təhsil” Bakı 1998

274) Sutkalıq diurezin 2000 ml-dən çox olması necə adlanır?

A) Pollakiuriya
B) Oliquriya
C) Nikturiya
D) Poliuriya
E) Anuriya

Ədəbiyyat:C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 223. “ Təhsil “ Bakı 1998

275) Dəriiçi inyeksiyanı aparmaq üçün iynə hansı dərinlikdə yeridilir?

A) İynənin ucu- kəsik hissəsi
B) İynənin bütün uzunluğu
C) İynənin 1/3 hissəsi
D) İynənin 2/3 hissəsi
E) Damarın yerləşməsindən asılıdır

Ədəbiyyat:: C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 150. “ Təhsil “ Bakı 1998

276) Steril yağlı məhlulu bədənə yeritmək üçün necə dərəcəyə qədər qızdırmaq lazımdır?

A) 40
B) 25
C) 38
D) 28
E) 34

Ədəbiyyat:C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 152. “ Təhsil “ Bakı 1998

277) Dəriiçi inyeksiyanı aparmaq üçün hansı uzunluqda iynədən istifadə olunur (mm-lə)?

A) 15
B) 20
C) 25

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) 30
E) 10

Ədəbiyyat:C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 150. “ Təhsil “ Bakı 1998

278) Dərialtına nə qədər yağlı məhlul yeritmək olar (ml-lə)?

A) 4
B) 2
C) 3
D) 6
E) 5

Ədəbiyyat:C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 151. “ Təhsil “ Bakı 1998

279) Dərman maddələrinin yeridilməsi zamanı baş verən allergik reaksiyanın ən ağır forması hansıdır?

A) Övrə
B) Qızartı
C) Kvinke ödemi
D) Anafilaktik şok
E) Ekzema

Ədəbiyyat:C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 162. “ Təhsil” Bakı 1998

280) Parenteral yeritmək üçün dərman maddələrinin hansı formasından istifadə olunur?

A) Drajelərdən
B) Kapsulalardan
C) Poroşoklardan
D) Həblərdən
E) Steril məhlullardan

Ədəbiyyat:C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 137. “ Təhsil” Bakı 1998

281) İnsulin yeridildikdən sonra tibb bacısı xəstəyə hansı qulluğu göstərir?

A) Uzandırır
B) Tənəffüsü və nəbzi sayır
C) 30 dəqiqədən sonra yedizdirir
D) İnyeksiya yerinə isitqac qoyur
E) Arterial təzyiqi ölçür

Ədəbiyyat:N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh. 158. “Çıraq” 2008

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

282) İnsulin artıq dozada yeridildikdə hansı ağırlaşma baş verə bilər?

A) Hipoqlikemik koma
B) Ketoasidotik koma
C) Kvinke ödemi
D) Ortostatik kollaps
E) Arterial təzyiqin artması

Ədəbiyyat:В.М.Боголюбов. Внутренние болезни. Стр.437. Москва. «Медицина « 1983.

283) Quru plevrit zamanı xəstə hansı məcburi vəziyyəti alır?

A) Xəstə sağlam tərəfə uzanır
B) Xəstə arxası üstə uzanır
C) Xəstə əllərini çarpayının kənarına dirəyərək önə əyilir
D) Xəstə ağrıyan tərəfi üstə uzanır
E) Xəstə yarımoturaq vəziyyətdə uzanır

Ədəbiyyat:: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр 248

284) Hansı preparatlar kəskin pielonefrit xəstəliyi zamanı istifadə olunmur?

A) Ürək qlikozidləri
B) Nitrofuran sırası
C) Analgetiklər və spazmolitiklər
D) Sulfanilamid qrupu
E) Antibiotiklər

Ədəbiyyat: В.М.Боголюбов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр 406.

285) Yüksək kalorili və güclü qidalanma hansı xəstəlik zamanı təyin edilir?

A) Hepatit B
B) Ürəyin işemik xəstəliyi
C) Kəskin qastrit
D) Ağciyər vərəmi
E) Kəskin pielonefrit

Ədəbiyyat: : C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 88. “ Təhsil” Bakı 1998

286) Sıfır pəhriz nə zaman təyin olunur?

A) Şəkərli diabetdə
B) Podaqra zamanı
C) Piylənmə zamanı
D) Mədə və 12 barmaq bağırsaq əməliyyatlarından sonrakı ilk günlərdə
E) Hepatit zamanı

Ədəbiyyat:C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 90. “ Təhsil” Bakı 1998

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

287) Süni qidalanma üçün lazım olan qulluq aləti hansıdır?

A) Ucluqlu qab
B) Qaşıq
C) Qazçıxarıcı boru
D) Nazik zond
E) Kateter

Ədəbiyyat:C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 74. " Təhsil" Bakı 1998

288) Isidici kompress üçün neçə qatlı tənzif salfetlərdən istifadə edilir?

A) 2
B) 8
C) 3
D) 1
E) 5

Ədəbiyyat:C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 118. " Təhsil " Bakı 1998

289) İsitqaca göstəriş hansıdır?

A) İnsult
B) Travma
C) Soyuqlama
D) Kəskin appendisit
E) Qanaxma

Ədəbiyyat:C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 121. " Təhsil" Bakı 1998

290) Isidici kompres hansı halda əks-göstərişdir:

A) Əzilmənin ilk saatlarında
B) Böyrək sancısında
C) İnfiltrat
D) Tonzillit
E) Otit

Ədəbiyyat:C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 118. " Təhsil" Bakı 1998

291) Hansı preparatların tənəffüs sistemi xəstəliklərində istifadəsi məqsədəuyğun deyil?

A) Bəlğəmgətiricilər
B) İltihabəleyhinə preparatlar
C) Mədə fermentləri
D) Vitaminlər
E) Antibiotiklər

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:В.М.Боголюбов, ,Внутренние болезни,.Москва ,Медицина,,1983.Стр.225-230

292) Mədə yuyulması üçün istifadə olunan qıfın tutumu nə qədər olmalıdır (ml-lə)?

A) 100
B) 50
C) 1000
D) 500
E) 200

Ədəbiyyat:: С.А.Мухина. «Общий уход за болъными». Москва «Медицина» 1989. Стр 204

293) Qanburaxma zamanı turna nə zaman açılır?

A) Lazımi miqdarda qan götürüldükdən sonra, lakin iynə venadan çıxarılmazdan əvvəl
B) Lazımi miqdarda qan götürüb iynə çıxarıldıqdan sonra
C) İynə venadan çıxarıldıqdan sonra
D) İstənilən vaxt
E) İynə venaya yeridildikdən sonra

Ədəbiyyat:C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 156 " Təhsil" Bakı 1998

294) Ağciyərlərin kütləvi müayinə metodu hansıdır?

A) Uroqrafiya
B) Flüoroqrafiya
C) Bronxoqrafiya
D) Rentgenoqrafiya
E) Xolesistoqrafiya

Ədəbiyyat:C.N Hacıyev ; R.Y.Əliyev , Xəstələrə qulluq. Səh. 501 "Təhsil" Bakı 1998

295) Sekretor çatışmazlıqla gedən xroniki qastrit zamanı sadalananlardan hansı xarakterikdir?

A) Lax yumurta iyi verən gəyirmə
B) Nəcisdə gizli qanın olması
C) Qəbizlik
D) Meteorizm
E) Qıcqırma

Ədəbiyyat::Daxili xəstəliklər.F.İ.Komarov ;V.Q.Kukes;A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə.Səh. 312. Bakı."Təbib"1998.

296) Hiperasid qastritdə hansı dərman preparatları təyin edilir?

A) Baralgin

Ünsiz az ödənişsiz istifadə üçün

B) No-Şpa
C) Allaxol
D) Levomisetin
E) Almagel

Ədəbiyyat:: Daxili xəstəliklər. F.İ.Komarov;V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh. 316.Bakı "Təbib "1998.

297) Hipoasid qastrit zamanı remissiya dövründə əvəzedici terapiya nədən ibarətdir?

A) Almagel
B) Abomin
C) Atropin
D) Vikalin
E) Spazmolitin

Ədəbiyyat:: Daxili xəstəliklər. F.İ.Komarov;V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh. 316. Bakı. " Təbib " 1998.

298) Hansı xəstəlikdə mövsümi kəskinləşmə olur?

A) Xroniki kolit
B) Qaraciyər sirrozu
C) Öd daşı xəstəliyi
D) Xora xəstəliyi
E) Mədə xərçəngi

Ədəbiyyat:: Daxili xəstəliklər.F.İ.Komarov;V.Q.Kukes;A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh. 317. Bakı."Təbib "1998.

299) Hansı bağırsaqdan qanaxma zamanı qətranabənzər nəcis müşahidə edilir?

A) Siqmavari bağırsaq
B) 12 barmaq bağırsaq
C) Yoğun bağırsaq
D) Nazik bağırsaq
E) Düz bağırsaq

Ədəbiyyat:Daxili xəstəliklər:F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ;A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə.Səh325. Bakı. "Təbib"1998.

300) Hansı xroniki qastrit mədə xərçənginə gətirib çıxarır?
1. Anasid ;
2. Hiperasid ;
3. Normoasid ;
4. Hipoasid

A) 1,2
B) 3,4

Sınaq üz ödənişsiz istifadə üçün

C) 1,3
D) 2,3
E) 1,4

Ədəbiyyat:Daxili xəstəliklər. F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh. 315. Bakı. “Təbib “ 1998.

301) Proqressiv arıqlama ən çox hansı xəstəlikdə müşahidə olunur?

A) Hepatit B
B) 12 barmaq bağırsaq xorası
C) Xroniki xolesistit
D) Mədə xərçəngi
E) Xroniki hiperasid qastrit

Ədəbiyyat: : Daxili xəstəliklər. F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh. 338. Bakı. “Təbib “1998.

302) Rentgenoqrafiyada, dolma defekti,, hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) 12 barmaq bağırsaq xorası
B) Mədə xərçəngi
C) Qastrit
D) Mədə xorası
E) Mədə sallanması

Ədəbiyyat:Daxili xəstəliklər. F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh. 338.Bakı.“Təbib“1998.

303) Xoranın xərçəngə çevrilməsi necə adlanır?

A) Penetrasiya
B) Maliqnizasiya
C) Perforasiya
D) Pilorostenoz
E) Regenerasiya

Ədəbiyyat:Daxili xəstəliklər. F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə.Səh. 327 Bakı.“Təbib“1998.

304) Qida qəbulundan 30 dəqiqə sonra epiqastral nahiyədə əmələ gələn ağrılar hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Ezofagit
B) Mədə xorası
C) Xroniki qastrit
D) Kəskin pankreatit
E) 12 barmaq bağırsaq xorası

sırf az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:: Daxili xəstəliklər F.İ.Komarov;V.Q.Kukes;A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh. 327. Bakı. “Təbib “1998

305) 36 yaşlı xəstə epiqastral nahiyədə yeməkdən 30 dəqiqə sonra başlanan ağrılarla feldşerə müraciət edib. Ağrılar çox intensiv olduqda qusma baş verir, dediyinə görə qusmadan sonra ağrılar nisbətən azalır , bu səbəbdən hətta bəzən xəstə süni qusma yaradır , iştahası saxlanılıb. Bir neçə ildir xəstədir , xəstəliyi yaz – payız fəsillərində kəskinləşir.Feldşer hansı xəstəlikdən şübhələnməlidir?

A) Ezofagit
B) Kəskin pankreatit
C) 12 barmaq bağırsaq xorası
D) Kəskinləşmə mərhələsində olan mədə xorası
E) Xroniki qastrit

Ədəbiyyat::Daxili xəstəliklər.F.İ.Komarov;V.Q.Kukes;A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh. 321. Bakı.“Təbib “1998

306) Mədə xorası zamanı xəstənin vəziyyətini nə yüngülləşdirir?
1. Qusma ;
2. Gəyirmə;
3. Ağrı zamanı qida qəbulu
4. Qələviləşdirən maddələrin qəbulu

A) 2;3
B) 2; 4
C) 3,4
D) 1; 4
E) 1;2

Ədəbiyyat:: Daxili xəstəliklər. F.İ.Komarov;V.Q.Kukes;A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh.321. Bakı.“Təbib “1998

307) Epiqastral nahiyədə gecə, acqarına və gecikmiş ağrılar hansı xəstəliyə xasdır?

A) Mədə xorası
B) Kəskin qastrit
C) 12 barmaq bağırsaq xorası
D) Mədə xərçəngi
E) Kəskin pankreatit

Ədəbiyyat::Daxili xəstəliklər.F.İ.Komarov ;V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə.Səh. 321. Bakı.“Təbib “1998

308) 12 barmaq bağırsağın xorası zamanı hansı preparatın qəbulu xəstənin ağrılarını azaltmır?

A) Biseptol
B) Almagel
C) Fosfolügel

sor.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Natrium hidrokarbonat
E) Maaloks

Ədəbiyyat:: Daxili xəstəliklər. F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh. 328. Bakı. “Təbib“ 1998

309) Xroniki qastrit zamanı xəstəyə hansı qida qadağan edilir?

A) Kartof püresi
B) Düyü sıyığı
C) Manna sıyığı
D) Qızardılmış ət
E) Suda bişmiş toyuq

Ədəbiyyat:: Daxili xəstəliklər.F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ;A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh.310. Bakı. “Təbib“ 1998

310) Mədə qanaxması zamanı xəstənin qusuntusu necə olur?

A) Pis qoxulu
B) Selikli
C) Al qırmızı qanlı
D) “Qəhvə xıltı” şəklində
E) Öd qarışıqlı

Ədəbiyyat::Daxili xəstəliklər. F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ;A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh.325. Bakı.“Təbib “1998

311) Mədə xərçəngi zamanı xəstədə hansı qidaya qarşı ikrah hissi olur?

A) Süd
B) Yumurta
C) Ət
D) Tərəvəz
E) Meyvə

Ədəbiyyat:: Daxili xəstəliklər. F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh. 337. Bakı. “Təbib “1998

312) 20 yaşlı xəstə qarnında yeməkdən 4-5 saat sonra ,acqarnına, bəzən gecə başlanan ağrılarla feldşerə müraciət edib. Dediyinə görə qida qəbulundan sonra ağrıları azalır, qəbizliyə meyllidir, iştahası pozulmayıb. Anamnezdən məlum olur ki, xəstə içkiyə aludədir.Baxış zamanı xəstənin rəngi avazımış, dili ağ ərplə örtülüdür.Palpasiya zamanı 12 barmaq bağırsağın proyeksiyası bərk ağrılıdır.Təxmin edilən diaqnoz aşağıdakılardan hansı ola bilər?

A) Kəskin pankreatit
B) Kəskin qastrit
C) 12 barmaq bağırsaq xorası, kəskinləşmə mərhələsində
D) Mədə xorası

snk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Mədə xərçəngi

Ədəbiyyat:: Daxili xəstəliklər.F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh. 328. Bakı.“Təbib“1998

313) Enterit hansı orqanın xəstəliyidir?

A) Yoğun bağırsağın
B) 12 barmaq bağırsağın
C) Soxulcanabənzər çıxıntının
D) Nazik bağırsağın
E) Düz bağırsağın

Ədəbiyyat:: Daxili xəstəliklər. F.İ.Komarov;V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh. 347. Bakı. “Təbib“1998

314) Xroniki enterit zamanı hansı qrup preparatların təyini məsləhət deyil?

A) Vitaminlər
B) Həzm fermentləri
C) Disbakteriozu aradan qaldıran probiotiklər
D) Antibiotiklər
E) Patogen floranı zəiflədən antibakterial dərmanlar

Ədəbiyyat:Daxili xəstəliklər. F.İ.Komarov ;V.Q.Kukes ;A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh. 353. Bakı. “Təbib“1998

315) 27 yaşlı qadın göbək ətrafında yeməkdən 3-4 saat sonra başlanan küt ağrılar , qarının köpməsi , qarında güclü qurultu, gün ərzində 3-4 dəfə çoxlu miqdarda duru nəcis ifrazı, halsızlıq ,yorulma, arıqlama , südə qarşı tolerantlığın pozulması şikayətləri ilə feldşerə müraciət edib. Anamnezdən məlum olur ki , bu simptomlar xəstəni 2 ildir narahat edir, ədavalı ,istiotlu qida qəbulundan sonra halı pisləşir. Feldşer hansı xəstəlikdən şübhələnməlidir?

A) Mədə xorası
B) Kəskin pankreatit
C) Mədə xərçəngi
D) Kəskin qastrit
E) Kəskinləşmə mərhələsində olan xroniki enterit

Ədəbiyyat:Daxili xəstəliklər.F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh.348. Bakı. “Təbib “1998

316) Göstərilənlərdən hansı öd durğunluğuna səbəb olmur?

A) Hamiləlik
B) Az hərəkətli həyat tərzi
C) İdmanla müntəzəm məşgul olmaq
D) Qida qəbulunun seyrək olması
E) Piylənmə

sırf az olanlarsız istifadə üçün

Ədəbiyyat: : Daxili xəstəliklər. F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh. 439. Bakı. “ Təbib “ 1998

317) Xoranın hansı ağırlaşması penetrasiya adlanır?

A) Çapıqlaşması
B) Deşilməsi
C) Qanaxma verməsi
D) Xərçəngə çevrilməsi
E) Qonşu orqana keçməsi

Ədəbiyyat:Daxili xəstəliklər.F.İ.Komarov;V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh. 326. Bakı.“Təbib“1998

318) 42 yaşlı kişi feldşerə müraciət edib. Obyektiv müayinə zamanı bədən temperaturu 37,3 dərəcə , ümumi vəziyyəti qənaətbəxşdir.Skleralar və yumşaq damaq subikterikdir(zəif sarılıq). Dilin üzəri sarıyaçalan ərplə örtülüdür.Palpasiyada qarnı yumşaq , sağ qabırğaaltı zəif ağrılıdır. Qaraciyər sağ qabırğaaltından 3 sm çıxıb. Dalaq əllənmir.Anamnezə görə 10 il əvvəl kəskin viruslu hepatit keçirib. Xəstəyə ilk olaraq hansı diaqnozu qoymaq olar?

A) Qaraciyər sirrozu
B) Mədə xərçəngi
C) Kəskin pankreatit
D) Kəskinləşmə mərhələsində olan xroniki hepatit.
E) Kəskin qastrit

Ədəbiyyat: : Daxili xəstəliklər.F.İ.Komarov;V.Q.Kukes;A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh. 408. Bakı.“Təbib“1998

319) Feldşer 66 yaşlı xəstə qadına baxmaq üçün evə çağırılıb.Xəstə sağ qabırğaaltında olan , sağ çiyinə , sağ kürəyə vuran güclü ağrıdan , ürəkbulanma və qusmadan şikayət edir. Ağrılar gecə ,qəflətən başlayıb . Axşamüstü yağlı ət yeyib.Belə ağrılar ilk dəfədir baş verir. Palpasiyada sağqabırğaaltı bərk ağrılıdır və həmin nahiyədə əzələlər gərilib.Xəstəyə hansı diaqnozu qoymaq olar?

A) Qaraciyər çatmamazlığı
B) Böyrək daşı xəstəliyi , böyrək sancısı
C) Qaraciyər sirrozu
D) Kəskin pankreatit
E) Öd daşı xəstəliyi, qaraciyər sancısı.

Ədəbiyyat:Ədəbiyyat:Daxili xəstəliklər.F.İ.Komarov;V.Q.Kukes ;A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh. 445. Bakı. “Təbib“1998

320) İştahanın olmaması necə adlanır?

A) Anoreksiya
B) Disfagiya

Sərkəz özdənişsiz istifadə üçün

C) Bulimiya
D) Polidipsiya
E) Polifagiya

Ədəbiyyat:: Daxili xəstəliklər.F.İ.Komarov ;V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə.Səh.393. Bakı “Təbib“1998

321) 18 yaşlı xəstə başağrısı , bel nahiyəsində sızıldayıcı ağrı , ümumi halsızlıq, sidiyinin çəhrayı rəngdə olması şikayətləriylə feldşerə müraciət edib. Baxma zamanı xəstənin üzündə şişkinlik müşahidə edilir. Anamnezdən məlum olur ki , 3 gündür xəstədir , 2 həftə əvvəl angina keçirib. A/T (arterial təzyiq) 165/ 100 mm.c. süt. Təxmin edilən diaqnoz hansıdır?

A) Kəskin qlomerulonefrit
B) Xroniki böyrək çatmamazlığı
C) Sistit
D) Böyrək daşı
E) Kəskin pielonefrit

Ədəbiyyat: : Daxili xəstəliklər. F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh. 459. Bakı. “ Təbib “ 1998

322) Öd sancısı tutması zamanı hansı preparatın istifadəsi əks- göstərişdir?

A) Omnopon
B) Yessentuki -17
C) No-şpa
D) Papaverin
E) Allaxol

Ədəbiyyat: : Daxili xəstəliklər.F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh.445. Bakı. “Təbib “1998

323) Xroniki pankreatit zamanı sadalanan dərmanlardan hansının işlədilməsi məqsədəuyğun deyil?

A) Digestal
B) Festal
C) Xolenzim
D) Pankreatin
E) Almagel

Ədəbiyyat: : Daxili xəstəliklər.F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh.392. Bakı. “Təbib “1998

324) Assit zamanı maye hara yığılır?

A) Perikard boşluğuna
B) Oynaq kisəsinə
C) Plevra səhifələri arasına

usk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Qarın boşluğuna
E) Orta divararalığına

Ədəbiyyat:: Daxili xəstəliklər. F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh. 420.Bakı. “ Təbib“1998

325) Tübaj hansı xəstəlikdə tətbiq olunur?

A) Qara ciyər sirrozu
B) Duodenit
C) Qastrit
D) Xroniki xolesistit
E) Hepatit

Ədəbiyyat:: Daxili xəstəliklər. F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh.444. Bakı.“ Təbib “ 1998

326) Qlomerulonefrit zamanı ödemlər ilk əvvəl hansı nahiyədən başlayır?

A) Plevral boşluq
B) Qarın boşluğu
C) Ayaq
D) Üz
E) Perikard boşluğu

Ədəbiyyat:: Daxili xəstəliklər.F.İ.Komarov ;V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh. 461. Bakı. “ Təbib “1998

327) Sidik sindromuna sadalananlardan hansı aiddir?

A) Makrohematuriya
B) Silinduriya
C) Hamısı
D) Proteinuriya
E) Mikrohematuriya

Ədəbiyyat:Daxili xəstəliklər. F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh. 461. Bakı. “ Təbib “ 1998

328) Kəskin qlomerulonefritin profilaktikasında sadalananlardan hansı mühüm əhəmiyyət daşımır?

A) Kəskin infeksion xəstəliklərin qarşısının alınması
B) Virus infeksiyası zamanı vaksin və zərdabların yeridilməsinə qəti qadağa
C) Qidada xörək duzunun məhdudlaşdırılması
D) Orqanizmdəki infeksiya ocaqlarının sanasiyası
E) Kəskin soyuqdan qorunma

Ədəbiyyat:: Daxili xəstəliklər. F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə. Səh. 459.Bakı. “Təbib“1998

snk.az ödənişsiz istifadə üçün

329) Hansı xəstəlik zamanı sidiyin xüsusi çəkisi azalır?

A) Endemik ur
B) Şəkərsiz diabet
C) Sadalananların hamısı
D) Şəkərli diabet
E) Kəskin pielonefrit

Ədəbiyyat:Axunbəyli A.Ə ; Alimetov S.N. Daxili xəstəliklər. Səh.367. Şərq- Qərb. Bakı 1998.

330) Xroniki qlomerulonefrit zamanı ödemlər olduqda qidalanmada nə məhdudlaşdırılır?

A) Yağlar
B) Karbohidratlar
C) Zülallar
D) Vitaminlər
E) Natrium xlorid

Ədəbiyyat::F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə Daxili xəstəliklər. Səh.459. Bakı. " Təbib "1998

331) Hemodializə göstəriş hansıdır?

A) Kəskin ödem
B) Qanda kreatinin miqdarının 1,2 mmol/l- dən çox olması (XBÇ)
C) İnfeksion ağırlaşmalar
D) Salananların hamısı
E) Stabil arterial hipertenziya

Ədəbiyyat:F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə Daxili xəstəliklər. Səh.474. Bakı. "Təbib "1998

332) Xroniki böyrək çatışmazlığını təsdiqləyən əsas göstərici hansıdır?

A) Qanda kreatinin artması
B) Arterial təzyiqin yüksək olması
C) Hiperqlikemiya
D) Proteinuriya
E) Xəstənin apatiya vəziyyəti

Ədəbiyyat:Ədəbiyyat :F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə Daxili xəstəliklər. Səh. 478. Bakı. " Təbib " 1998

333) Böyrək sancısı zamanı sadalananlardan hansı feldşer edə biməz?

A) Çox miqdarda maye vermək

sesk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) 2%-li baralgin inyeksiyası
C) Oturaq isti vanna tətbiq etmək
D) 0,1 %-li atropin inyeksiyası
E) Cərrahi yolla daşı kənar etmək

Ədəbiyyat:: F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə Daxili xəstəliklər.Səh. 495. Bakı " Təbib"1998

334) Sadalanan məhsullardan hansında dəmirin miqdarı azdır?

A) Yumurtada
B) Paxlada
C) Ətdə
D) Süddə
E) Qaraciyərdə

Ədəbiyyat::F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə Daxili xəstəliklər. Səh. 543. Bakı."Təbib"1998

335) Sadalananlardan hansı anemik sindroma aid deyil?

A) Qulaqlarda küy
B) Zəiflik
C) Təngnəfəslik
D) Qusma
E) Başgicəllənmə

Ədəbiyyat: : F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə Daxili xəstəliklər. Səh. 556. Bakı. " Təbib " 1998

336) Hansı anemiyada xəstə təbaşir, əhəng, gil,torpaq yeməyə ehtiyac duyur?

A) B 12 defisitli
B) Aplastik
C) Hemolitik
D) Dəmir defisitli
E) Bütün anemiyalarda

Ədəbiyyat: : F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə Daxili xəstəliklər.Səh. 539. Bakı."Təbib "1998

337) Talassemiya hansı xəstəliklərə aiddir?

A) Endokrin sistem xəstəliklərinə
B) Maddələr mübadiləsinin pozulması
C) Oynaq xəstəlikləri
D) Qan xəstəliklərinə
E) Birləşdirici toxumanın sistem xəstəliklərinə

sesi.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:Axunbəyli A.Ə ; Alimetov S.N. Daxili xəstəliklər. Səh.319. Şərq- Qərb. Bakı 1998

338) Qlossit hansı orqanın xəstəliyidir?

A) Damağın
B) Qulağın
C) Yemək borusunun
D) Dilin
E) Burunun

Ədəbiyyat:: F.İ.Komarov ;V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə Daxili xəstəliklər. Səh. 539. Bakı. "Təbi "1998

339) Orqanizmdə hansı vitamin çatışmazlığı sinqa və ya skorbut xəstəliyinə səbəb olur?

A) Vitamin D
B) Vitamin C
C) Vitamin K
D) Vitamin A
E) Vitamin E

Ədəbiyyat::Справочник фельдшера .Под редакцией А.Н.Шабанова.Стр.4 Москва « Медицина «1983»

340) Ödem mayesinin döş qəfəsi boşluğunda toplanması necə adlanır?

A) Hidrotoraks
B) Hidroperikard
C) Assit
D) Anasarka
E) Sinovit

Ədəbiyyat:: F.İ.Komarov;V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə Daxili xəstəliklər. Səh. 87. Bakı. " Təbib " 1998

341) Ürək astması ürəyin hansı hissəsinin kəskin çatışmazlığında yaranır?

A) Sağ qulaqçığın
B) Periferik damarların
C) Sol qulaqçığın
D) Sağ mədəciyin
E) Sol mədəciyin

Ədəbiyyat:Axunbəyli A.Ə ;Alimetov S.N. Daxili xəstəliklər. Səh.221 Şərq- Qərb.Bakı 1998

342) Xroniki pankreatitin müalicəsində əvəzedici terapiya məqsədilə hansı dərman tətbiq edilir?

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Pankreatin
B) Fosfolügel
C) No-şpa
D) Morfin
E) Almagel

Ədəbiyyat:F.İ.Komarov ; V.Q.Kukes ; A.S.Smetnyovun redaktəsi ilə Daxili xəstəliklər. Səh. 391. Bakı “Təbib “1998

1suallı kliniki hal

343) İlk qışqırıq mexanizmi nə ilə bağlıdır?

A) Anemiya ilə
B) Hipertermiya ilə
C) Cinsi krizlə
D) Hipoksiya ilə
E) Hiperbilirubinemiya ilə

Ədəbiyyat:: N.Tağıyev “Neonatologiya” Bakı 2007 Səh 30.

344) Anadan gəlmə ürək qüsuru verən bətndaxili infeksiya hansıdır?

A) Toksoplazmoz
B) Məxmərək
C) Sifilis
D) Qızılca
E) Listerioz

Ədəbiyyat:: N.Tağıyev “Neonatologiya” Bakı 2007 Səh 380

345) Yarımçıq doğulmuş uşağın zondla qidalanmasına göstəriş nədir?

A) Əmmə-udma refleksinin olmaması
B) Donor südü ilə qidalanma
C) Hipertermiya
D) Pnevmopatiya
E) Bətndaxili infeksiya

Ədəbiyyat:: N.Tağıyev “Neonatologiya” .”Bakı” 2007 Səh 136

346) Vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlarda fizioloji sarılıq hansı əlamətlə səciyyələnir?

A) Gedişi uzun müddətli olur
B) Sarılıq gec əmələ gəlir
C) Cüzi olur

tek.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Sarılıq tez keçir
E) Anadan gəlmə olur

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya” Bakı 2007 Səh 124

347) Yenidoğulmuşun gözünün təmizlənməsində nədən istifadə edilir?

A) 5 % yod məhlulu
B) Bitki yağı
C) 3 % perekis məhlulu
D) 96 % spirt məhlulu
E) Qaynanmış su, 1 % - li tetrasiklin məlhəmi

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya” Bakı 2007 Səh 54

348) Sepsis nədir?

A) Bakterial infeksiyanın qan dövranında dövr etməsi
B) Qan dövranı pozğunluğu
C) Mübadilə pozğunluğu
D) Konstitusional anomaliyalar
E) Rh-konflikt

Ədəbiyyat:: N.Tağıyev “Neonatologiya” Bakı 2007 Səh 234

349) BCJ vaksinasiyasından sonra immunitet nə vaxt yaranır?

A) 3 həftəyə
B) 4 aya
C) 8 həftəyə
D) 10 həftəyə
E) 6 aya

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya” Bakı 2007 Səh 50.

350) Qarışıq qidalanma nə vaxt tətbiq edilir?

A) Süni qidalanmada
B) Yarımçıq doğulmuşlarda
C) İlin isti fəslində
D) Təbii qidalanmada
E) Ana südü çatmadıqda

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya”Bakı 2007 Səh 145.

351) Bətndaxili infeksiyalara hansılar aiddir?
1. Sitomeqalovirus
2. B hepatit virusu
3. Məxmərək virusu

ask.az ödənişsiz istifadə üçün

4. Herpes virusu
5. A hepatit virusu
6. Adenovirus

A) 1, 3, 4
B) 3, 5, 6
C) 2, 5, 6
D) 1, 3, 5
E) 2, 4, 6

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya” Bakı 2007 Səh 192 .

352) Yenidoğulmuşlarda cinsi krizin əlamətləri hansı müddətdən sonra yox olur?

A) 2 - 3 həftəyə
B) 2 - 3 günə
C) 2 aya
D) 3 aya
E) 5 - 6 günə

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya”Bakı 2007 Səh 70 .

353) Omfolit nəyin iltihabıdır?

A) Göbəyin
B) Dərinin
C) Qara ciyərin
D) Dalağın
E) Mədənin

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya” Bakı 2007 Səh 234 .

354) Hipoqalaktiya nədir?

A) Qan azlığı
B) Mədə-bağırsaq pozğunluğu
C) Ana südünün çatışmazlığı
D) Vitamin çatışmazlığı
E) Qida çatışmazlığı

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya”Bakı 2007 Səh 132 .

355) Yenidoğulmuşlarda tranzitor hipertermiyanın səbəbi hansıdır?

A) Yenidoğulmuşların asfiksiyası
B) Istilik mərkəzinin tam inkişaf etməməsi
C) Yenidoğulmuşların dəri xəstəlikləri
D) Hormonal kriz
E) Fizioloji sarılıq

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya”Bakı 2007 səh.72.

356) Yenidoğulmuşlarda ilkin çəkinin itməsinin səbəbi nədir?

A) Pis qulluq
B) Fizioloji mastit
C) Maye itkisi və süd azlığı
D) Fizioloji sarılıq
E) Virus infeksiyası

Ədəbiyyat:: N.Tağıyev “Neonatologiya”Bakı 2007 Səh 35 .

357) Yenidoğulmuşlarda hormonal krizə nə aiddir?

A) Tranzitor qızdırma
B) Sidik turşusu infarktı
C) Fizioloji mastit, fizioloji vulvovaginit
D) Çəki itkisi
E) Fizioloji eritema

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya”Bakı 2007 Səh 70 .

358) Uşaq doğulan kimi hansı infeksiyanın profilaktikası aparılır?

A) Sistitin
B) Dermatitin
C) Sepsisin
D) Omfolitin
E) Qonoblenoreyanın

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya” Bakı 2007 Səh 33 .

359) Yenidoğulmuşun vəziyyəti doğularkən hansı şkala ilə qiymətləndirilir?

A) Duboviç
B) Neçiporenko
C) Apqar
D) Ortner
E) Sinverman

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya”Bakı 2007 Səh 34 .

360) Yenidoğulmuşlarda əmələ gələn doğuş şişi nədir?

A) Öndə gələn hissənin ödemi
B) Dölyanı mayenin aspirasiyası
C) Sümük və sümüküstlüyü arasına qansızma
D) Bətndaxili infeksiya
E) Dölyanı mayenin toxumalara toplanması

sesk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya” Bakı 2007 Səh 163 .

361) Yenidoğulmuşlarda baş beyin zədələnməsinin əsas əlaməti nədir?

A) Hipotermiya
B) Hipertermiya
C) Qıcolma
D) Sarılıq
E) Hemorragik sindrom

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya” Bakı 2007 Səh 163 .

362) Hemolitik xəstəlik hansı hallarda baş verə bilər?

A) Anemiya
B) Hər ikisində Rh (-) qan
C) Hər ikisində Rh (+) qan
D) Anada Rh (+) və uşaqda Rh (-) qan
E) Anada Rh (-) və uşaqda Rh (+) qan

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya”Bakı 207 Səh 306 .

363) Doğum evində qonoblenoreyanın profilaktikası nə vaxt aparılır?

A) Doğuşdan 1 saat sonra
B) Doğuşdan 3 saat sonra
C) Doğuşdan 2 saat sonra
D) Doğuşdan sonra ilk 1 saat ərzində
E) Doğuşdan 4 saat sonra

Ədəbiyyat:: N.Tağıyev “Neonatologiya”. 2007, Səh 198.

364) Hamiləliyin antinatal risk faktoruna nə aid deyil?

A) Hamiləlik vaxtı qanaxma
B) Geçikmiş toksikozlar
C) Çox döllü hamiləlik
D) Vaxtı keçmiş hamiləlik
E) Doğuş vaxtı narkoz vermə

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya”Bakı 2007.səh.71

365) Yenidoğulmuşların asfiksiyası zamanı orta ağır asfiksiya neçə balla qiymətləndirilir?

A) 1 - 2 bal
B) 6 - 7 bal
C) 8 - 10 bal

tok.az ödənişsiz istifadə üçün

D) 4 -5 bal
E) 3 - 4 bal

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya” Bakı 2007 Səh 145 .

366) Yenidoğulmuşların asfiksiyası zamanı ürək vurğularının sayını artırmaq üçün hansı preparat istifadə edilir?

A) Noşpa
B) Adrenalin
C) ATF
D) Vitamin C
E) Kokarboksilaza

Ədəbiyyat:: N.Tağıyev “Neonatologiya”Bakı 2007 Səh 146 .

367) Tənəffüs çatışmazlığı sindromu hansı uşaqlar üçün xarakterikdir?

A) Çox saylı hamiləlik
B) Vaxtından gec doğulanlar
C) Vaxtında doğulanlar
D) Vaxtından əvvəl doğulmuşlar
E) Çox döllü hamiləlik

Ədəbiyyat:: N.Tağıyev “Neonatologiya” Bakı 2007 Səh 128 .

368) “B” virus hepatiti əleyhinə vaksin hara vurulur?

A) Dəri daxilinə
B) Vena daxilinə
C) Sağrı nahiyəsinə
D) Sağ çiyin nahiyəsinə
E) Budun ön nahiyəsinə

Ədəbiyyat:“Təcrübədə immunlaşdırma” (metodik göstərişlər) Modul 2 .2010səh.10

369) Tənəffüsün dayanması necə adlanır?

A) Taxikardiya
B) Apnoe
C) Kuss - Mayl tənəffüsü
D) Bradipnoe
E) Çeyn-Stoks tənəffüsü

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya”. 2007. Səh 146 .

370) Apqar şkalasına görə uşağın vəziyyəti balla qiymətləndirildikdə uşaq döşə qoyulur.Nöqtələrin yerinə uyğun gələn cavabı seçin.

sinek.az ödənişsiz istifadə üçün

A) 8 - 10
B) 4 - 5
C) 2 - 3
D) 6 - 7
E) 7 - 8

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya” Bakı 2007Səh 147

371) Feldşer 3yaşlı uşağa çağırışa gedib.Uşaq bağçaya gedir.3 gündür xəstədir.Uşağın temperaturu 38°-38,3°C-dir,ümumi vəziyyəti orta ağırlıqdadır.Əsnəyi qızarıb,konyuktivit əlamətləri var,işığa baxa bilmir,bədənində nöqtəvari səpkilər var.Uşaq 2 yaşında vaksinasiya edilib.AGDS vaksini vurulub və poliomielit damcısı verilib.Uşaqda hansı xəstəliyin olmasından şübhələnmək olar?
A) Qızılca
B) Adenovirus infeksiyası
C) Skarlatina
D) Məxmərək
E) Difteriya

Ədəbiyyat:: Л.А.Исааева,Л.К.Баженова.»Детские Болезни» Mockva1986 стр 488

372) Vərəmli xəstəni aşkar etmək üçün hansı üsul vacibdir?

A) Qanın biokimyəvi və bakterioloji müayinəsi
B) Qanın ümumi və biokimyəvi müayinəsi
C) Tuberkulin diaqnostikası və flüroqramma
D) Sidiyin ümumi və bakterioloji müayinəsi
E) Klinik əlamətlər,anamnez

Ədəbiyyat:: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 430

373) Hansı halda mantu sınağı müsbət sayılır?

A) 3-4 mm
B) 2-3 mm
C) 5-12 mm
D) 1-2 mm
E) 4-5 mm

Ədəbiyyat:Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 429

374) Vərəmin müalicəsində əsas müalicə prinsipləri hansılardır?
1. Törədiciyə təsir etmək
2. Müqaviməti yüksəltmək
3. Klinik əlamətləri aradan götürmək
4. Vitaminterapiya təyin etmək
5. Hormonlar təyin etmək
6. Pəhriz təyin etmək

smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) 2, 4, 6
B) 2, 4, 5
C) 1, 2, 3
D) 3, 5, 6
E) 1, 5, 6

Ədəbiyyat:Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 428

375) Tuberkulinin yeridilmə yolu hansıdır?

A) Əzələ daxilinə
B) Sublinqval
C) Dəri içi
D) Dərialtına
E) Vena daxilinə

Ədəbiyyat:Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр115

376) Meninqokokk bakteriyaları orqanizmə hansı yolla daxil olur?

A) Hematogen
B) Limfogen
C) Tənəffüs
D) Mədə-bağırsaq
E) Sidik-ifrazat

Ədəbiyyat:Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 441

377) Meningit xəstəliyinə yoluxmuş uşaqla təmasda olan uşaq neçə gün karantində olmalıdır?

A) 7 gün
B) 21 gün
C) 10 gün
D) 5 gün
E) Karantin müddəti qoyulmur

Ədəbiyyat:Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 442

378) Difteriya xəstəliyinin törədicisi nədir?

A) Viruslar
B) Borde-Janqu çöpləri
C) Löffler çöpləri
D) Streptokoklar

sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Göbələklər

Ədəbiyyat:Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 449

379) Difteriya xəstəliyinə yoluxma yolu hansıdır?

A) Limfogen
B) Fekal-oral
C) Hava-damcı
D) Kontakt-məişət
E) Hematogen

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 449

380) Hansı xəstəlik zamanı antitoksiki zərdab təyin edilir?

A) Qripp
B) Su çiçəyi
C) Qızılca
D) Difteriya
E) Skarlatina

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр280

381) Difteriyadan qorunmaq ücün ən etibarlı üsul hansıdır?

A) Hormonoterapiya
B) Aktiv immunizasiya
C) Antibiotikoterapiya
D) B vitaminoterapiya
E) Fizioterapiya

Ədəbiyyat: “Təcrübədə immunlaşdırma”.Metodik göstərişlər.Modul 2.Bakı 2010.səh7

382) Difteriyaya yoluxmuş uşaqla kontaktda olan uşaq neçə gün karantində olmalıdır?

A) 1, 5 ay
B) 2 ay
C) 1 ay
D) 5 gün
E) 7 gün

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр280

383) Skarlatinanın törədicisi hansıdır?

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

A) Stafilakoklar
B) Göbələklər
C) Löffler çöpləri
D) Viruslar
E) β hemolitik streptokoklar

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 460

384) Skarlatina zamanı əsas əlamət hansıdır?

A) Hipervolemiya
B) Travmatik şok
C) Hemoliz
D) Anemiya
E) Angina

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 səh 461

385) Skarlatina xəstəliyinə yoluxan uşaqlar neçə gün izolə edilir?

A) 1 gün
B) 7 gün
C) 1, 5 ay
D) 1 ay
E) 10 gün

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 462

386) Qızılca xəstəliyinin törədicisi hansıdır?

A) Streptokok
B) Göbələklər
C) Virus
D) Borde-Janqu çöpləri
E) Stafilokok

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 səh 463

387) Su çiçəyinə yoluxmuş uşaqla kontaktda olan uşaq neçə gün izolə (karantində) olmalıdır

A) 21 gün
B) 12 gün
C) 7 gün
D) 1 ay

sek.az ödənişsiz istifadə üçün

E) 10 gün

Ədəbiyyat:: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 470

388) Parotit infeksiyası zamanı hansı vəzilər zədələnir?
1. Qulaqdibi
2. Tüpürcək vəziləri
3. Qoltuqaltı vəziləri
4. Tər vəziləri
5. Piy vəziləri
6. Cinsi vəzilər

A) 3, 6
B) 2, 4
C) 1, 2
D) 3, 5
E) 5, 6

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 səh 471

389) Bağırsaq infeksiyaları zamanı eksikoz və toksikoz müşahidə olunursa, mübarizə üçün əsas terapevtik prinsip hansıdır?

A) Fitoterapiya
B) Hormonterapiya
C) Stimuləediciterapiya
D) Parenteral duz məhlullarının yeridilməsi
E) Vitaminoterapiya

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 səh 482

390) Hepatit A xəstəliyinin yoluxma yolu hansıdır?

A) Kontakt-məişət
B) Parenteral
C) Alimentar
D) Hava-damcı
E) Transfuzion

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 487

391) Hepatit B xəstəliyinin yoluxma yolu hansıdır?

A) Hava-damcı
B) Oral-fekal
C) Alimentar

sinaq.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Kontakt-məişət
E) Parenteral

Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 488

392) Hepatit A zamanı inkubasiya dövrü nə qədər davam edir?

A) 1 aya qədər
B) 3 aya qədər
C) 2 gün
D) 1 il
E) 1 həftə

Ədəbiyyat:: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 487

393) Hepatit B zamanı inkubasiya dövrü nə qədər davam edir?

A) 1-3 gün
B) 2 il
C) 6 həftə-6 ay
D) 2-4 həftə
E) 1 il

Ədəbiyyat:: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 489

394) Hepatit "B" xəstəliyi olan uşaqla təmasda olan uşaq üçün karantin neçə gündür?

A) 10 gün
B) 7 gün
C) 35 gün
D) 6 ay
E) 4 gün

Ədəbiyyat:Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 489

395) Adları cəkilən bakterial infeksiyalardan hansını idarəolunan xəstəliyə aid etmək olar?

A) Skarlatina
B) Botulizm
C) Salmanelyoz
D) Difteriya
E) Qara yara

Ədəbiyyat: “Təcrübədə immunlaşdırma” Modul 1 Bakı 2010 səh7

sprk.az ödənişsiz istifadə üçün

396) Hansı hallarda difteriyaya şübhəli şəxslərin udlağından bakterioloji müayinə üçün yaxma götürülür?

A) Diareya olduqda
B) Yüksək hərarət olduqda
C) Tənəffüs çətinləşdikdə
D) Badamcıqlarda ərp olduqda
E) Səpgi zamanı

Ədəbiyyat:: Л.А.Исаeva,Л.К.Баженova.»Детские Болезни» Москва1986 стр 562

397) Aşağıda sadalanan vaksinlərdən hansı cansız vaksinlərə aiddir?

A) Difteriya, göyöskürək və tetanusa qarşı kombinə olunmuş vaksin (AGDT)
B) Qızılcaya qarşı olan vaksin
C) Vərəm əleyhinə vaksin (BSJ)
D) Hepatit B-yə qarşı vaksin (EUVAX)
E) Poliomielitə qarşı oral vaksin (OPV)

Ədəbiyyat:"Təcrübədə immunlaşdırma" Bakı, 2010 Modul 2 (Metodik göstərişlər)səh 5

398) Aşağıda sadalanan vaksinlərdən hansı canlı vaksinlərə aiddir?

A) Qızılca, parotit və məxmərəyə qarşı vaksin (QPM)
B) Tetanusa qarşı anatoksin (AT)
C) Göy öskürək, difteriya, tetanusa qarşı vaksin (AGDT)
D) "B" hepatitinə qarşı vaksin
E) Hemofil β çöpləri tərəfindən törədilən xəstəliklərə qarşı vaksin

Ədəbiyyat:"Təcrübədə immunlaşdırma" Bakı, 2010(Modul 2) (Metodik göstərişlər)səh5

399) Cansız vaksinlərin əksəriyyəti hansı üsulla orqanizmə yeridilir?

A) Dərialtı
B) Per oral (ağızdan)
C) Vena daxilinə
D) Dəri içi
E) Əzələ daxili

Ədəbiyyat: "Təcrübədə immunlaşdırma" Bakı, 2010 Modul (Metodik göstərişlər) səh7-8

400) Cansız vaksinlərin yeridilməsindən sonra daha çox hansı reaksiyalar müşahidə olunur?

A) Diareya
B) 2 gün ərzində hərarət yüksəlir, vaksinin yerində ağrı və şişkinlik ola bilər
C) 3 gündən sonra hərarət yüksəlir
D) İnyeksiya yerində abses

study.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Ürəkbulanma, qusma

Ədəbiyyat:: “Təcrübədə immunlaşdırma” Bakı, 2010 Modul 2 (Metodik göstərişlər)səh8-9

401) Zimnitski sınağı qiymətləndirilən zaman əsas diaqnostik amil hansıdır?

A) Sidikdə zülalın miqdarı
B) Sidikdə formalı elementlər
C) Sidiyin xüsusi çəkisi
D) Sidik çöküntüsü
E) Sidikdə şəkərin miqdarı

Ədəbiyyat:A.A. Əyyubova. “Uşaq xəstəlikləri .” Bakı.2008 səh 267

402) Qlomerulonefrit patologiyası zamanı duzsuz pəhriz təyin etmənin səbəbi nədir?

A) Kalsium duzları osteopoezdə iştirak edir
B) Natrium duzları mayeni toxumalarda saxlayır
C) Maqnezium duzları sinir sistemini tənzimləyir
D) Selenium azad radikalları çıxarır
E) Kalium duzları ürəyə təsir edir

Ədəbiyyat:A.A. Əyyubova. “Uşaq xəstəlikləri .” Bakı.2008 səh 268

403) Pielonefrit dedikdə nə başa düşülür?

A) Böyrək daşı xəstəliyi
B) Böyrək və sidik yollarının infeksion-allergik xəstəliyi
C) Nefropatiya
D) Sidik kisəsinin infeksion iltihabı
E) Qurd invaziyası

Ədəbiyyat: A.A. Əyyubova. “Uşaq xəstəlikləri .” Bakı.2008 səh 270

404) Anemiya zamanı qanda nə baş verir?

A) Trombositlərin sayının azalması
B) Eritrositlərin sayının azalması
C) Hemoqlobin və eritrositlərin sayının azalması
D) Leykositlərin miqdarının azalması
E) Qanın formalı elementlərinin sayının azalması

Ədəbiyyat: A.A.Əyubova “Uşaq xəstəlikləri”Bakı 2008 səh 301

405) Hemofiliya xəstəliyinin yaranmasına nə səbəb olur?

A) Disbakterioz
B) Hipovolemiya
C) Hipervolemiya

Sırf az ödənişsiz istifadə üçün

D) Laxtalanmanın pozulması
E) Disproteinemiya

Ədəbiyyat: A.A.Əyubova “Uşaq xəstəlikləri”Bakı 2008 səh 316

406) Talassemiya xəstəliyini əmələ gətirən faktoru göstərin.

A) Hemoliz nəticəsində baş verən anemiya
B) B 12 defisitli anemiya
C) Posthemorragik qanaxma nəticəsində baş verən anemiya
D) Hemoqlobin sintezinin pozulması nəticəsində yaranan anemiya
E) Alimentar anemiya

Ədəbiyyat: Əyyubova A.A “Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008 səh 314

407) Şəkərli diabet zamanı hansı orqanın funksiyasının pozulması baş verir?

A) Epifiz vəzinin
B) Hipofiz vəzinin
C) Qara ciyərin
D) Qalxanvari vəzinin
E) Mədəaltı vəzinin

Ədəbiyyat: H Əyyubova A.A “Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008 səh 333

408) Uşaqlarda normada acqarına qanda şəkərin miqdarı nə qədərdir?

A) 5,5-7,7 mmol/l
B) 9,9-11,11 mmol/l
C) 7,7-9,9 mmol/l
D) 6,6-7,7 mmol/l
E) 3,3-5,5 mmol/l

Ədəbiyyat: H Əyyubova A.A “Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008 səh 335

409) Uşaqlarda normada sidikdə şəkərin miqdarı nə qədər olmalıdır.

A) 7 mmol/l
B) Olmamalıdır.
C) 6,5-7,5 mmol/l
D) 3,3-5,5 mmol/l
E) 0-3 mmol/l

Ədəbiyyat: H Əyyubova A.A “Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008 səh 336

410) Eksudativ kataral diatezli uşağın qidalanmasında aşagıdakılardan hansı düzgün deyil?
1. Şəkər-ksilit və ya sorbitlə əvəz edilir.
2. Ət bulyonu verilir.

ask.az ödənişsiz istifadə üçün

3. Balıqdan hazırlanmış qidalar verilir.
4. Heyvani yağ-bitki yağı ilə əvəz edilir.
5. Xörək duzu azaldılır.
6. İnək südü verilir.

A) 1,3,5
B) 2,3,6
C) 1,2,6
D) 2,4,6
E) 3,5,6

Ədəbiyyat: A.Əyyubova. Uşaq xəstəlikləri. Bakı, 2008səh69

411) Uşağın ilk qidası olan ağız südünün (molozivo) yetişmiş südə nisbətən üstünlüyü nədir?

A) tərkibində karbohidrat azdır
B) tərkibində immunoqlobulinlərin miqdarı çoxdur
C) tərkibində zülal azdır
D) tərkibində fermentlər çoxdur
E) tərkibində yağlar azdır

Ədəbiyyat:: N.Tağıyev Neontologiya Bakı 2007 səh 33

412) Təbii qidalanan 6 aylıq uşaq doymursa ana südünü əvəzedici nə vermək olar?

A) Çay,su
B) Yalnız ana südü verilir
C) Adaptaolunmuş qarışıqlar
D) 5% qlükoza məhlulu
E) Sadə qarışıqlar verilir

Ədəbiyyat: N.Tağıyev Neontologiya Bakı 2007 səh 33

413) Südəmər uşaq necə qidalanmalıdır?

A) Uşaq tələbatına görə, sərbəst qidalanır
B) 2 saatdan bir
C) 6 saatdan bir
D) 4 saatdan bir
E) 3 saatdan bir

Ədəbiyyat:: N.Tağıyev Neontologiya Bakı 2007 səh 34

414) Uşaq nə vaxta qədər ana südü ilə qidalanmalıdır?

A) 3 ayadək
B) 9 ayadək
C) 1,5-2 yaşınadək
D) 1 yaşınadək

test.az ödənişsiz istifadə üçün

E) 6 ayadək

Ədəbiyyat:: N. Tağıyev Neonatologiya Bakı 2007 səh 13

415) Südəmər uşaq əmizdirdikdən sonra qusursa nə etməli?

A) imalə edilir
B) su verilir,qarına isitqac qoyulur
C) üfüqi vəziyyətdə tutub sonra böyrü üstə uzandırılır
D) vertikal vəziyyətdə tutub sonra böyrü üstə uzandırılır
E) Dərmanlar təyin edilir.

Ədəbiyyat:N. Tağıyev Neonatologiya Bakı 2007 səh 135

416) 6 aylığına kimi uşağın qidalanması üçün ən optimal qidalanma üsulu hansıdır?

A) Təbii,qarışıq
B) Qarışıq
C) Süni
D) Təbii
E) Süni,qarışıq

Ədəbiyyat:N. Tağıyev Neonatologiya 2007 səh 136

417) Tənzimləyici qidalara hansı qidalar aiddir?

A) Adaptaolunmuş qarışıqlar
B) İnək südü
C) Ana südü
D) Meyvə və tərəvəz şirələri, kəsmik, yumurta sarısı
E) Sadə qarışıqlar

Ədəbiyyat:: N. Tağıyev Neonatologiya 2007 səh 136

418) Aşağıdakı qidalardan hansı əlavə qidaya aiddir?

A) Sıyıqlar, tərəvəz püresi, qatıq
B) Ət bulyonu, kəsmik
C) Ət əzməsi
D) Yumurta sarısı,qatıq
E) Kəsmik, yumurta sarısı

Ədəbiyyat:Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр82

419) Raxit xəstəliyi olan və südə allergiyası olan uşaqlar üçün sıyıqlar necə hazırlanır?

A) Süddə

Yalnız az ödənişsiz istifadə üçün

B) Tərəvəz həlimində və ya suda
C) Düyü həlimində
D) Ət bulyonunda
E) Toyuq bulyonunda

Ədəbiyyat:Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 80

420) Hansı uşaqlarda tərəvəz püresi daha erkən müddətdə təyin edilir?

A) Bətndaxili zədələnməsi olan uşaqlara
B) Ekiz doğulmuşlara
C) Raxit, anemiyası olan uşaqlara, yarımçıq doğulmuşlara
D) Kesəriyyə əməliyyatı ilə doğulmuş uşaqlara
E) Hipotrofiyalı uşaqlara

Ədəbiyyat:Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 84

421) Sünii qidalanmaya keçməyin səbəbi ola bilməz?

A) Ana südünün yararsız olması
B) Ana südünün çox olması
C) Ana südünün olmaması
D) Uşağın inkişaf qüsurları
E) Yarımçıq doğulmuş uşaq

Ədəbiyyat:: N.Tağıyev “Neontologiya” 2007 səh45

422) Doğulduqdan sonra yeni doğulma dövrü hansı müddət hesab edilir?

A) 1 ayadək
B) 2 ayadək
C) 10 ayadək
D) 3 ayadək
E) 4 ayadək

Ədəbiyyat:N. Tağıyev “Neonatologiya” Bakı 2007 səh 30

423) Uşaqda raxit xəstəliyinin yaranmasının səbəbi?

A) B qrup vitaminlərinin çatışmazlığı
B) D vitamininin çatışmazlığı
C) Dəmir çatışmazlığı
D) C vitaminin çatışmazlığı
E) A vitamininin çatışmazlığı

Ədəbiyyat:A.A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri “Bakı ,2008 , səh 13.

smk.az ödənissiz istifadə üçün

424) İsitqacın yerli təsiri hansıdır?

A) Dərini oyadır, qan dövranını yaxşılaşdırır
B) Qanaxamanı dayandırır.
C) Damarı daraldır.
D) Bədəni soyudur, iltihabı prosesin sorulmasına kömək edir
E) Qan dövranını yaxşılaşdırır,iltihabı prosesin sorulmasına kömək edir

Ədəbiyyat:: "Tibb bacısının məlumat kitabı" Bakı 1994 səh 60

425) Qanda şəkərin artması necə adlanır?

A) Hiperqlikemiya
B) Hipoqlikemiya
C) Leykopeniya
D) Hiperqlukozuriya
E) Hipoqlukozuriya

Ədəbiyyat:A.A. Əyyubova "Uşaq xəstəlikləri "Bakı 2008səh 335

426) Bronxial astmanı hansı faktorlar əmələ gətirir?

A) Zəhərli maddələrin tənəffüs yollarına təsiri
B) Orqanizmin reaktivliyinin aşağı düşməsi
C) Helmintozlar
D) İnfeksion- allegik amil
E) Bronxların yad cismlə tutulması

Ədəbiyyat:: A.A. Əyyubova "Uşaq xəstəlikləri " Bakı 2008, səh 190.

427) Bronxial astmalı xəstə tutmalar zamanı hansı məcburi vəziyyət alır?

A) Əlləri dayaq verməklə məcburi oturaq vəziyyət
B) Arxası üstə uzanmaq
C) Sağ tərəf üstə uzanır
D) Sol tərəf üstə uzanır
E) Ayaq üstə dayanır

Ədəbiyyat:A.A. Əyyubova "Uşaq xəstəlikləri " Bakı 2008,səh 192.

428) Anafilaktik şok nədir?

A) Arterial təzyiqin qalxması
B) Dərman preparatlarının təsirindən əmələ gələn reaksiya
C) Arterial təzyiqin düşməsi
D) Bradikardiya
E) Taxikardiya

Ədəbiyyat:A.A. Əyyubova "Uşaq xəstəlikləri "Bakı 2008,səh 208.

Şəxsi az ödənişsiz istifadə üçün

429) İnaq nədir?

A) Hərarətin artması
B) Təngnəfəslik
C) Boğulma
D) Hipotermiya
E) Öskürək

Ədəbiyyat:A.A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri ”Bakı 2008,səh 205.

430) Yalançı inaq tutmasında ilk yardım nədən ibarətdi?

A) Antihistamin preparatlar
B) Təmiz hava , ayağa isti vanna , xardal yaxması
C) Vitaminlər, xardal yaxması
D) Ürək dərmanları ,ayağa isti vanna
E) Antibiotiklər,vitaminlər

Ədəbiyyat:A.A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri “Bakı 2008,səh 208.

431) Kollaps nədir?

A) Qida çatışmazlığı
B) Kəskin damar çatışmazlığı
C) Mübadilə pozğunluğu
D) Qaraciyər çatışmazlığı
E) Böyrək çatışmazlığı

Ədəbiyyat:Л,.А.Исаeva,Л.К.Баженова.»Детские Болезни» Медицина 1986 стр218

432) Alimentar anemiyaya uşaq yaşının hansı dövründə rast gəlinir?

A) 3 yaşdan böyük uşaqlarda
B) Məktəb yaşında
C) 1-3 yaşlı uşaqlarda
D) Südəmər dövrdə
E) Yeni doğulma dövründə

Ədəbiyyat:: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова.»Детские Болезни» Медицина 1986 стр 176

433) Uşaqlarda enterebiozu nə törədir?

A) Trixosefolioz
B) Lyamblya
C) Öküz soliteri
D) Bizquyruqlar
E) Askarid

Ədəbiyyat:: A.A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri ” Bakı 2008 səh 139

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

434) Eksudativ – kataral diatez nədir?

A) Sağlam vəziyyətdir
B) Bədən quruluşunun anomaliyasıdır
C) Sindromdur
D) Sərbəst xəstəlikdir
E) Dəri allergiyasıdır

Ədəbiyyat:A.A. Əyyubova "Uşaq xəstəlikləri " Bakı 2008 səh 69

435) 5 yaşlı uşağın çəkisi nə qədər olmalıdır?

A) 15 kq
B) 23 kq
C) 18 kq
D) 25 kq
E) 20 kq

Ədəbiyyat:: Л.А.Исаeva,Л.К.Важenova .»Детские Болезни» Москва 1986 стр 38

436) 10 yaşlı uşaqda A / T(arterial təzyiq) nəçə millimetr civə sütunu olmalıdır?

A) 95 mm/cs
B) 90 mm/cs
C) 100 mm/cs
D) 80 mm/cs
E) 85 mm/cs

Ədəbiyyat:: N.Tağıyev "Neontologiya"Bakı 2007 səh 30

437) Ödün tərkibi nədən ibarətdir?

A) Öd turşusu
B) Lesitin, duz , su , piqment , sidik cövhəri
C) Zülal
D) Xolesterin
E) Öd turşuları , xolesterin , duz , su , piqment , sidik cövhəri

Ədəbiyyat:: A.A. Əyyubova "Uşaq xəstəlikləri " Bakı 2008 səh 139

438) Daun xəstəliyi olan uşaqların görkəmi necə olur?

A) Göz yarığı çəp , ovucda köndələn çatlar , ağız açıq olur , dil böyük olub ağızdan kənara çıxır
B) Sarılıq , splenomeqaliya olur
C) Əqli inkişafın pozğunluğu , ekzema əlamətləri olur
D) Boyunda qanadvari büküşlər , gödək boyunluluq olur
E) Qısa boyun , ayaqlarda , baldırda limfotik ödem olur

sırf az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:: Л.А.Исааева,Л.К.Баженова.»Детские Болезни» Mockva1986 стр 560

439) Uşaqlarda zəhərlənmədə ilk yardım nədən ibarətdir?

A) Antibiotiklər
B) Ürək qlikozidləri
C) Çay-su fasiləsi
D) Vitaminlər
E) Mədə-bağırsağın yuyulması

Ədəbiyyat:Л.А.Исааева,Л.К.Баженова.»Детские Болезни» Moskva 1986 səh238

440) Uşağın ağız boşluğunu hansı barmaqla yoxlamaq olar?

A) şəhadət barmaqla
B) çeçələ barmaqla
C) baş barmaqla
D) ikinci barmaqla
E) orta barmaqla

Ədəbiyyat:N.Tağıyev Neonatologiya.Bakı 2007səh53

441) Hipertermik sindrom zamanı uşağı soyuq suda isladılmış dəsmala bükmək üçün suyun temperaturu neçə dərəcə olmalıdır?

A) 22
B) 27
C) 25
D) 20
E) 18

Ədəbiyyat:: N.Tağıyev Neonatologiya.Bakı 2007səh 44

442) Uşaqlarda tənəffüs yollarının obstruksiyasını yaradan səbəb.

A) Qırtlağın şişi
B) Qusma
C) Yad cisim
D) Larinqospazm
E) Larinqotraxeit

Ədəbiyyat:: N. Tağıyev Neonatologiya .Bakı 2007səh46

443) Bayılma zamanı uşağa hansı vəziyyət verilməlidir?

A) Başını qaldıraraq uzandırmaq
B) Ayaqlarını sallayaraq oturtmaq
C) Arxası üstə uzandırmaq

Sırf az ödənişsiz istifadə üçün

D) Uşağı uzadaraq ayaqlarını qaldırmaq
E) Böyrü üstə uzandırmaq

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева.Л. К. Баженова. .»Детские Болезни» Москва 1986 səh210

444) Hipertermik sindrom zamanı uşağın bədən temperaturu neçə dəqiqədən bir ölçülməlidir?

A) 5-10
B) 10-15
C) 60-90
D) 90-120
E) 30-60

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева.Л. К. Баженова. .»Детские Болезни» Москва 1986стр212

445) Hemofiliya xəstəliyi zamanı uşağa əsas preparatlar necə yeridilir?

A) Dərialtı
B) Damardaxili
C) Dəriiçi
D) Peroral
E) Əzələdaxili

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева.Л. К. Баженова. .»Детские Болезни» Москва 1986. стр 260

446) Hemofiliya xəstəliyi olan uşaq soyuqlayarsa hansı dərmanı vermək olmaz?

A) Askorbin turşusu
B) Asetilsalisil turşusu
C) Antibiotiklər
D) Mukaltin
E) Dimedrol

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева.Л. К. Баженова. .»Детские Болезни» Москва 1986. Стр.261

447) Tetanus əleyhinə anatoksin nə üçün vurulur?

A) Sepsisin qarşısını almaq üçün
B) Passiv immunitet yaratmaq üçün
C) İltihabı prosesi aradan qaldırmaq üçün
D) Hepatit B-nin qarşısını almaq üçün
E) Aktiv immunitet yaratmaq üçün

Ədəbiyyat:“Təcrübə immunlaşdırma” (metodik göstərişlər) Modul 2.Bakı 2010səh 8

448) Yenidoğulmuşların palatasında havanın temperaturu neşə dərəcə olmalıdır?

A) 22-23°

ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) 25-26°
C) 24-25°
D) 20-21°
E) 18-20°

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева.Л. К. Баженова. .»Детские Болезни» Москва 1986. Стр.30

449) Uşaq praktikasında ən çox istifadə olunan hərarət salıcı dərman hansıdır?

A) Parasitamol
B) Dimedrol
C) Baralgin
D) Analgin
E) Pipolfen

Ədəbiyyat:Əyyubova A.A "Uşaq xəstəlikləri" Bakı 2008 səh 422

450) Uşaqlarda mədəni bir dəfəyə yumaq üçün nə qədər su tələb olunur?

A) 5 ml/kq
B) 10 ml/kq
C) 2 ml/kq
D) 4 ml/kq
E) 1 ml/kq

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева.Л. К. Баженова. .»Детские Болезни» Москва 1986. Стр 382

451) Yenidoğulmuşlar üçün hansı zonddan isitfadə olunur?

A) 14 f -15 f
B) 16 f -17 f
C) 12 f -13 f
D) 17 f -18 f
E) 5 f -8 f

Ədəbiyyat:: N.Tağıyev "Neonatologiya". Bakı 2007 Səh 30.

452) Anafilaktik şok zamanı təxirəsalınmaz yardım məqsədi ilə xəstəyə hansı vəziyyəti vermək lazımdır?

A) Oturaq vəziyyətdə hər tərəfinə isitqac qoymaq
B) Yarımoturaq vəziyyətdə hər tərəfinə isitqac qoymaq
C) Oturaq vəziyyətdə başına buz qovuğu qoymaq
D) Başını axıra qədər qabağa əyərək buz qovuğu qoymaq
E) Böyrü üstə uzadıb hər tərəfinə isitqac qoymaq

Ədəbiyyat:Л. А. Исаева.Л. К. Баженова. .»Детские Болезни» Москва 1986. Стр320

453) Fimoz nədir?

Yalnız az ödənişsiz istifadə üçün

A) Pülük dəliyinin əzilməsi
B) Pülük dəliyinin daralması
C) Sidik ifrazat kanalının sıxılması
D) Sidikliyin şişi
E) Pülük dəliyinin iltihabı

Ədəbiyyat:Ə.Əlizadə “Uşaq cərrahiyyəsi” 1996.səh 85

454) Feldşer növbəti patronaj zamanı 1 yaşlı uşağın dəri və selikli qişalarının avazımış olduğunu gördü.
Ana uşağın tez yorulmasından,əsəbi olmasından və iştahasının pis olmasından şikayətlənir.Məlum oldu ki,ana uşağa gündə 2 dəfə südlü sıyıq verir,uşağı təmiz havada gəzdirmir?Uşaqda hansı xəstəliyin olmasını güman etmək olar?
A) Kəskin respirator xəstəlik
B) Hipotrofiya
C) B12 vitamin defisitli anemiya
D) Dəmirdefisitli anemiya
E) Zülal defisitli anemiya

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya”. Bakı 2007 ,səh 146

455) Raxit xəstəliyi zamanı uşaqlarda hansı əlamət olur?

A) Kifoz
B) Sınıqlar
C) O şəkilli və X-ə bənzər ayaqlar
D) Hemartroz
E) Artrit

Ədəbiyyat:: A.A.Əyyubova -Uşaq xəstəlikləri.Bakı 2008.səh 14

456) Furozalidon və metronidozolla uşaqlarda hansı xəstəliyin spesifik müalicəsi aparılır?

A) Enterobiozun
B) Tenidozun
C) Lyambliozun
D) Askaridozun
E) Trixosefalyozun

Ədəbiyyat:: A.A.Əyyubova-Uşaq xəstəlikləri.Bakı 2008,səh 139

457) Yenidoğulmuşlarda sepsisin əmələ gəlmə səbəbi hansıdır?

A) Sklerema
B) Allergik dermatit
C) Hemangioma
D) Bişməcə
E) Yenidoğulmuşun qovuqcuqlu xəstəliyi

sok.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:: Л.А.Исаeva,Л.К.Бажeнова.»Детские Болезни» Москва 1986 стр 230

458) Uşaqlar ən çox hansı yaşda məxmərək xəstəliyinə tutulurlar?

A) 8 -10
B) 1 -7
C) 6-8
D) 7-8
E) 10-14

Ədəbiyyat:Л.А.Исаeva,Л.К.Бажeнова.»Детские Болезни» Москва 1986 стр 430

459) Polimorfizm (Ləkə-papula-vezikula-qabıq) hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Su çiçəyi
B) Skarlatina
C) Qızılca
D) Məxmərək
E) Difteriya

Ədəbiyyat:: Л.А.Исаева,Л.К.Бажeнова.»Детские Болезни» Москва 1986 стр 430

460) Epidemik parotit zamanı baş verən ikitərəfli orxit nəyə səbəb olur?

A) Pielonefritə
B) Sistitə
C) Qlomerulonefritə
D) Meningitə
E) Kişi sonsuzluğuna

Ədəbiyyat:Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр486

461) Hepatit keçirmiş uşaq stasionardan sonra neçə ay nəzarətdə olmalıdır?

A) 2 ay
B) 4 ay
C) 5 ay
D) 6 ay
E) 3 ay

Ədəbiyyat:: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 280

462) Uşaqda hiperqlikemik komada ilk yardım nədən ibarətdir?

A) Qlukoza
B) Antihistaminlər

Ünsk az ödənişsiz istifadə üçün

C) Spazmalitiklər
D) Vitaminlər
E) İnsulin

Ədəbiyyat:: A.A.Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri””Bakı” 2008 səh 333

463) Uşaqda hipoqlikemik komada ilk yardım nədən ibarətdir?

A) Spazmalitiklər
B) Antihistaminlər
C) İnsulin
D) Qlukoza
E) Vitaminlər

Ədəbiyyat:: A.A.Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008, Səh 334

464) Yenidoğulmuşun asfiksiyası zamanı ilk yardım nədən ibarətdir?

A) Yuxarı tənəffüs yollarının keçiriciliyini bərpa etmək
B) Oksigen verilməsi
C) Ürəyin masajı
D) Ağ ciyərin süni ventilyasiyası
E) Süni tənəffüsün verilməsi

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya” Bakı 2008,səh 33

465) Eksudativ-kataral diatezin yaranmasının əsas səbəbi hansıdır?

A) Zülal çatışmazlığı
B) İnfeksion xəstəliklər
C) Gigiyenik qaydaların pozulması
D) Fermentativ çatışmazlıq
E) Vitamin çatışmazlığı

Ədəbiyyat:: A.Əyyubova. Uşaq xəstəlikləri. Bakı, 2008,səh 69

466) Eksudativ-kataral diatezin müalicəsində hansı dərmanlardan istifadə edilir?

A) Hipotenziv preparatlar
B) Antihistamin
C) Ürək qlükozidləri
D) Antimikrob
E) Diuretiklər

Ədəbiyyat:A.Əyyubova. Uşaq xəstəlikləri. Bakı, 2008, səh.69

467) Kəskin qastrit zamanı uşaqlarda hansı əlamətlər olur?

A) A/T (arterial təzyiqin) enməsi

unik.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Epiqastral nahiyyədə ağrı,qusma
C) Baş ağrısı,mədə bulanması
D) A/T (arterial təzyiqin)artması
E) Hərarətin artması

Ədəbiyyat:: A.A.Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008,səh 85

468) Anadangəlmə ürək qüsuru ilə doğulmuş uşağın görünüşü necə olur?

A) Bayılma
B) Huşsuzluq, A/T-in düşməsi
C) Sianoz, təngənəfəslik, göyərmə
D) Qıcolma
E) Hərarət

Ədəbiyyat:: A.A.Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008,səh 218

469) Hansı xəstəlikdə arxa boyun limfatik vəziləri palpasiya edilir?

A) Göy öskürək
B) Su çiçəyi
C) Qızılca
D) Meningit
E) Məxmərək

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya” Bakı 2007 səh45

470) Yeni doğulmuşlarda böyük əmgək hansı sümüklərin arasında yerləşir?

A) Alın və ənsə sümükləri arasında
B) Ənsə və təpə sümükləri arasında
C) Təpə və alın sümükləri arasında
D) Yeni doğulmuşlarda normada böyük əmgək bağlanmış olur
E) Təpə sümükləri arasında, ölçüsü

Ədəbiyyat:Л.А.Исаева,,Л.К.Баженова »Детские Болезни» Москва 1986 ,стр35

471) Uşaqlarda raxit hansı vitamin çatışmazlığı nəticəsində yaranır?

A) B vitamini
B) C vitamini
C) D vitamini
D) E vitamini
E) A vitamini

Ədəbiyyat:: A.A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri Bakı, 2008, səh 14.

472) Uşaqlarda tərləmə, ənsə nahiyəsində tükün tökülməsi hansı xəstəlik zamanı baş verir?

Sınaq alı dərnişiz istifadə üçün

A) Bişməcə
B) Raxit
C) Dəri xəstəlikləri
D) Spazmofiliya
E) Diatezdə

Ədəbiyyat:A.A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri ” Bakı 2008 səh 15

473) Hipotireoz hansı üzvün funksional çatışmazlığıdır?

A) Böyrəküstü vəzin
B) Qalxanvari vəzinin
C) Mədəaltı vəzin
D) Timus vəzin
E) Hipofiz vəzinin

Ədəbiyyat:: A.A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri ” Bakı 2008 səh 370

474) Dəmir defisitli anemiyanın kliniki əlamətləri nədir?

A) Dəri və selikli qişalar solğun, qansızmalar və s
B) Ümumi zəiflik, stomatit, qlossit,dispepsiya əlamətləri olur
C) Qusma,ishal baş verir,qaraciyər böyüyür
D) Dəri sarı və boz rəngdə olur, dalaq böyüyür
E) Dəri quru olur qabıq verir, tük tez tökülür, belə uşaq təbaşir, torpaq yeyir

Ədəbiyyat:: A.A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri ” Bakı 2008,səh 301

475) Bətndaxili inkişaf dövrü neçə həftə davam edir.

A) 28 -30
B) 20-30
C) 38-40
D) 30 -35
E) 12 -16

Ədəbiyyat:: N.Tağıyev “Neonatologiya”.”Bakı” 2007 Səh 136

476) Təmizləyici imalə zamanı uşağın vəziyyəti necə olmalıdır?

A) Oturaq vəziyyətdə
B) Sağ böyrü və ya arxası üstə
C) Sağ böyrü üstə
D) Qarnı üstə
E) Sol böyrü və ya arxası üstə uzadılır

Ədəbiyyat:Л.А.Исаева,,Л.К.Баженова »Детские Болезни» Москва 1986, стр 237

smek.az ödənişsiz istifadə üçün

477) Helmintozların diaqnozu nəyə əsasən qoyulur?

A) Nəcisin bakterialoji müayinəsinə
B) Nəcisin ümumi müayinəsinə
C) Qanın müayinəsinə
D) Qanın biokimyəvi müayinəsinə
E) Sidiyin müayinəsinə

Ədəbiyyat:: A.A. Əyyubova. “Uşaq xəstəlikləri ”Bakı 2008 səh 138

478) Uşaq bayılarkən nə etməli?

A) Naşatır iylətmək , kofein ,mezaton , kardiamin
B) Qlükoza , sulfanilamid preparatlar
C) Antibiotiklər
D) Vitaminlər
E) Antihistaminlər

Ədəbiyyat:Tibb bacısının məlumat kitabı

479) Doğulduqdan sonra Hepatit B-yə qarşı ilk peyvənd nə vaxt vurulur?

A) İlk 12 saat ərzində
B) İki gün sonra
C) İlk 6 saat ərzində
D) Bir gün sonra
E) İlk 24 saat ərzində

Ədəbiyyat:: “Təcrübədə immunlaşdırma” .Modul 2. Bakı 2010 ,səh 10

480) Yenidoğulmuşa gigiyenik vanna nə vaxt təyin olunur?

A) Doğulan kimi
B) Göbək yarası sağalmamış
C) Doğulandan 8 saat sonra
D) Göbək yarası sağaldıqdan sonra
E) İlk patronajdan sonra

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya” Bakı 2007 ,səh 34

481) Ilk patronaj nə vaxt aparılır?

A) Doğum evindən evə yazılandan sonra 3 gün ərzində
B) Doğum evindən evə yazılandan bir həftə sonra
C) Doğum evindən evə yazılandan 10 gün sonra
D) Doğulan kimi
E) Doğum evindən evə yazılandan bir ay sonra

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya ”Bakı 2007 səh 35

Şəxsi əz ödənişsiz istifadə üçün

482) Xardal yaxması qoyarkən nəyə fikir verilməlidir?

A) Sinir sisteminin vəziyyətinə
B) Dərinin vəziyyətinə və həssaslığına
C) Vəziyyətin ağırlığına görə
D) Sümük sisteminin vəziyyətinə
E) Vəziyyıtinə və yaşına görə

Ədəbiyyat:Л.А.Исаева,Л.К.Баженова.»Детские Болезни» Москва 1986, 306

483) Eksikoz dedikdə nə başa düşülür?

A) Qusma
B) İshal
C) Susuzluq
D) A/T düşməsi
E) Qan çatmamazlığı

Ədəbiyyat:A.A. Əyyubova. "Uşaq xəstəlikləri "Bakı 2008 səh 56

484) Uşaqlarda yalançı inaq tutması zamanı hansı əlamətlər baş verir?

A) Qusma, ishal
B) Sianoz
C) Hürücü öskürək, boğulma, tənəffüsün çətinləşməsi
D) Baş ağrısı
E) Hərarət

Ədəbiyyat:: A.A.Əyyubova ."Uşaq xəstəlikləri." Bakı.2008,səh 205

485) Sidiklə xaric olan şəkərə görə insulin hansı miqdarda təyin olunur?

A) 5-10 qr
B) 6-8 qr
C) 10-15 qr
D) 4-5 qr
E) 2-4 qr

Ədəbiyyat:: A.A. Əyyubova "Uşaq xəstəlikləri "Bakı 2008 səh 335

486) Yenidoğulmuşlarda böyük əmgək hansı formada olur?

A) Bağlı olur
B) Romb şəklində
C) Dairə şəklində
D) Oval formada
E) Üçbucaq formasında

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 35

487) Peyvənd otağında vaksinlər saxlanan soyuducularda temperatur neçə dəfə yoxlanılır?

A) Həftədə 1 dəfə
B) Temperaturu yoxlamağa ehtiyac yoxdur
C) Gündə 1 dəfə
D) Gündə 2 dəfə, səhər işin əvvəlində və axşam iş qurtaranda
E) Günaşırı

Ədəbiyyat:: "Təcrübədə immumlaşdırma"Modul 2,.Metodik göstərişlər. Bakı, 2010,səh 15

488) Həll edilmiş AGDT (göy öskürək, difteriya, tetanus əleyhinə) vaksinin istifadə müddəti nə qədərdir?

A) 5 günədək
B) 2-3 saat
C) Vaxt məhdudiyyəti yoxdur.
D) 1 gün
E) 7 günədək

Ədəbiyyat:" Təcrübədə İmmunlaşdırma" Modul 2, Metodik göstərişlər. Bakı, 2010,səh 7

489) Yeni doğulmuşlarda təmizləyici imalə nə vaxt aparılır?

A) Öskürək olduqda
B) Dispeptik əlamətlər olduqda
C) Qarında ağrı olduqda
D) Hipotermiya olduqda
E) Qusma olduqda

Ədəbiyyat:: Л.А.Исаева.К.А.Баженова."Детские Болезни" Москва1986 səh 369

490) Yeni doğulmuşların göbək qalığı necə işlənməlidir?
1. 3 % perekis;
2. 70 % spirt
3. 5 % kalium permanqanat
4. 0,5 %-li natrium sulfasil
5. 5 % -li natrium xlorid
6. 2%-li natrium bikarbonat

A) 1,2,3
B) 2,5,6
C) 1,4,5
D) 4,5,6
E) 3,4,5

Ədəbiyyat:Л.А.Исаaeva,Л.К.Баженова.»Детские Болезни» Москва1986 ,стр 61

test.az ödənişsiz istifadə üçün

491) 1 yaşda uşağın neçə dişi olmalıdır?

A) 6
B) 8
C) 10
D) 4
E) 7

Ədəbiyyat:N. Tağıyev “Neonatologiya” “Bakı”2007 səh 65

492) Yeni doğulmuş uşaqlar döşə ilk dəfə nə vaxt qoyulur?

A) Doğulduqdan dərhal sonra
B) Doğulduqdan 1 saat sonra
C) Doğulduqdan 6 saat sonra
D) Doğulduqdan 12 saat sonra
E) Doğulduqdan 3 saat sonra

Ədəbiyyat:Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 ,стр 28

493) Raxit xəstəliyinin profilaktikasına nə vaxt başlamaq lazımdır?

A) 6 ayından
B) Uşaq doğulan kimi
C) Ana bətnindən
D) 1 yaşından
E) 5 ayından

Ədəbiyyat:Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр132

494) Tutmaşəkilli spazmatik öskürək hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Rinovirus infeksiyası
B) Su çiçəyi
C) Göy öskürək
D) Epidemik parotit
E) Qızılca

Ədəbiyyat:К.А.Исаева,Л.К.Бажепова.»Детские Болезни» Москва1986 , стр 440

495) Spazmofiliya xəstəliyinin xarakter simptomu hansıdır?

A) Qansızma
B) Qıcolma
C) Qəbzlik
D) Qanaxma
E) Şişkinlik

sinaq.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:Л.А.Исаева,Л.К.Баженова.»Детские Болезни» Москва1986, стр 406

496) Hansı xəstəlikdə uşaqlarda bədənin bütün əzələlərində tonik-klonik qıcolmalar olur?

A) Skarlatina
B) Dizenteriya
C) Difteriya
D) Spazmofiliya
E) Qızılca

Ədəbiyyat:ЛА.Исаева,Л.К.Баженова.»Детские Болезни» Москва1986, стр 412

497) Uşaqlarda böyük əmgək neçə ayında bağlanır?

A) 8- 11
B) 12-15
C) 9 -10
D) 15- 2 0
E) 4 -7

Ədəbiyyat:: N. Tağıyev “Neonatologiya” “Bakı”2007 səh 66

498) Neçə həftəliyində doğulmuş uşaq vaxtında doğulmuş hesab edilir?

A) 35-37
B) 32-34
C) 38-39
D) 28-30
E) 38-42

Ədəbiyyat:: Л.А.Исаева.Л.А.Баженова .Детские болезни. Москва 1986 стр 37.

499) Uşaq necə aylığında başını tutmağa başlayır?

A) 1-2
B) 7-8
C) 9-10
D) 3-4
E) 5-6

Ədəbiyyat:Л.А.Исаева.Л.А.Баженова .Детские болезни. Москва 1986 стр 26.

500) Uşaq necə ayında sərbəst oturur?

A) 8-9
B) 10-11
C) 4-5
D) 6-7

nsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) 2-4

Ədəbiyyat:Л.А.Исаева.Л.А.Баженова .Детские болезни. Москва 1986 стр 28.

501) Südəmər uşaqlarda bir dəqiqədə tənəffüsün sayı necədir?

A) 35-40
B) 30-35
C) 20-25
D) 40-45
E) 25-30

Ədəbiyyat:Л.А.Исаева.Л.А.Баженова .Детские болезни. Москва 1986 стр 59.

502) Yenidoğulmuşlarda nəbzin tezliyi bir dəqiqədə necə olur?

A) 70-80
B) 130-140
C) 110-120
D) 140-150
E) 90-100

Ədəbiyyat:Л.А.Исаева.Л.А.Баженова .Детские болезни. Москва 1986 стр67.

503) Uşaqlarda süd dişlərinin sayı hansı formula əsasən təyin olunur?

A) n-5
B) n-3
C) n-1
D) n-4
E) n-2

Ədəbiyyat:Л.А.Исаева.Л.А.Баженова .Детские болезни. Москва 1986 стр50.

504) Uşaqlar süd dişlərini hansı yaşda dəyişməyə başlayır?

A) 7-8
B) 2-5
C) 9-10
D) 10-11
E) 5-7

Ədəbiyyat:Л.А.Исаева.Л.А.Баженова .Детские болезни. Москва 1986 стр50.

505) Normal cəkili sağlam uşağa birinci əlavə yemək olaraq nə verilir?

A) mannı sıyığı
B) kefir
C) tərəvəz püresi

ünsk az ödənişsiz istifadə üçün

D) düyü həlimi
E) meuvə şirəsi

Ədəbiyyat:Л.А.Исаева.Л.А.Баженова .Детские болезни. Москва 1986 стр104

506) Yoluxucu xəstəlik keçirmiş uşaqda hansı formada immunitet yaranır?

A) Passiv, süni
B) Aktiv,təbii
C) Aktiv, süni
D) Passiv ,təbii
E) Yaranmır

Ədəbiyyat:: Təcrübədə immunlaşdırma.Modul 1.Bakı 2010.,səh 17

507) Uşaq yaşlarında anemiyanın hansı formalarına daha çox rast gəlinir?

A) zülaldefisitli
B) dəmirdefisitli
C) vitamindefisitli
D) hemolitik
E) posthemorragik

Ədəbiyyat:: Л.А.Исаева.Л.А.Баженова .Детские болезни. 1986 стр 177

508) Yarımçıq doğulmuş uşaqlarda hansı əmgək açıq olur?

A) böyük,kiçik və yan əmgəklər
B) böyük və kiçik
C) böyük,yan əmgəklər
D) yan əmgəklər
E) hamısı bağlı olur

Ədəbiyyat:: Л.А.Исаева.Л.А.Баженова .Детские болезни. 1986 стр 113.

509) Yenidoğulmuşlarda ağır asfiksiya Apqar şkalasına görə necə balla qiymətləndirilir?

A) 1-3
B) 4-5
C) 6-7
D) 9-10
E) 11-12

Ədəbiyyat:: Л.А.Исаева.Л.А.Баженова .Детские болезни.1986 стр 119.

510) Boyunun uzunluğu neçə santimetr olan uşaq yarımçıqdoğulmuş sayılır?

A) 50

emk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) 49
C) 53
D) 47
E) 45

Ədəbiyyat:: Л.А.Исаева.Л.А.Баженова .Детские болезни. 1986 стр 113.

511) Bişməcənin qarşısını almaq ücün yenidoğulmuşun dərisi nə ilə təmizlənir?

A) qaynanmış su ilə
B) poliqlükin məhlulu ilə
C) tetrasiklin məhlulu ilə
D) fizioloji məhlulla
E) steril bitki yağı ilə

Ədəbiyyat:: Л.А.Исаева.Л.А.Баженова .Детские болезни.1 986 стр 29

512) Vərəmin bütün formalarında uşaqda hansı əlamət müşahidə olunur?

A) döşdə ağrı
B) quru öskürək
C) bəlğəmli yaş öskürək
D) yüksək temperatur
E) intoksikasiya

Ədəbiyyat:Л.А.Исаева.Л.А.Баженова .Детские болезни.1 986 стр 248

513) Yenidoğulmuş sağlam uşağa BCJ vaksini neçənci gün vurulur?

A) 3-5
B) 9-10
C) 1-3
D) 11-12
E) 5-8

Ədəbiyyat:: Л.А.Исаева.Л.А.Баженова .Детские болезни.1 986 стр 257.

514) Su çiçəyi ilə xəstələnmiş uşaqla kontakda olan 3 yaşa qədər uşaq neçənci gündən izolə olunmalıdır?

A) 11-ci gündən 21-ci günə qədər
B) 1-ci gündən 10-cu günə qədər
C) izolə olunmur
D) 22-ci gündən 30-cu günəqədər
E) 30-cu gündən 40-cı günə qədər

Ədəbiyyat:: Л.А.Исаева.Л.А.Баженова .Детские болезни.1 986 стр 500.

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

515) Su çiçəyi səpkilərini işləmək üçün hansı məhluldan istifadə olunur?

A) Yod
B) Natrium xlorid
C) Brilyant yaşılı abısı
D) Furasilin
E) Dimedrol

Ədəbiyyat:: Л.А.Исаева.Л.А.Баженова .Детские болезни.1 986 стр 501

516) Uşaqlarda Evstax borusu hansı anatomik xüsusiyyətinə görə otitin əmələ gəlməsinə şərait yaradır?

A) Uzun və enli olmasına görə
B) Uzun və dar olmasına görə
C) Qısa və enli olmasına görə
D) Əyri olmasına görə
E) Qısa və dar olmasına görə

Ədəbiyyat:: Y.Bisyarina.Uşaqların anatomik-fizioloji xüsusiyyətləri səh 124

517) Şəkərli diabetlə xəstə uşaq insulin vurulduqdan neçə dəqiqə sonra yemək yeməlidir?

A) 50-60
B) 5-10
C) 15-20
D) 40-50
E) 30-40

Ədəbiyyat:: Л.А.Исаева.Л.А.Баженова .Детские болезни.1 986 стр 450

518) Uşaqlarda kəskin qastrit zamanı nə tövsiyyə edilir?

A) kəsmik,qaymaq
B) yağlı olmayan ət suyu, sıyıqlar
C) duza qoyulmuş tərəvəz
D) yumurta, yağlı ət
E) çörək,kolbasa

Ədəbiyyat:: Л.А.Исаева.Л.А.Баженова .Детские болезни.1 986 стр 369.

519) Hipertermik sindrom zamanı uşağa göstərilən təcili tibbi yardıma əks göstəriş nədir?

A) Uşağı soyuq suda islanmış döşəkağına bükmək
B) Bədənin isidilməsi
C) Litik qarışıq vurmaq
D) Böyük damarlar üzərinə buz qovağı qoymaq
E) Dərinin 40-50% etil spirti ilə silmək

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:: Н.В.Ежова, Е.М. Русакова “Педиатрия” 2002 стр. 45

520) Uşaq hansı yaşda yeriməyə başlayır?

A) 16-18 ayında
B) 7-8 ayında
C) 15-16 ayında
D) 11-12 ayında
E) 8-9 ayında

Ədəbiyyat:Н.В.Ежова, Е.М. Русакова “Педиатрия” 2002 стр. 72

521) Südəmər uşağa ilk əlavə yemək olaraq nə verilməlidir?

A) Mannı sıyığı
B) Meyvə şirəsi
C) Şorbalar
D) Kefir
E) Tərəvəz püresi

Ədəbiyyat:Н.В.Ежова, Е.М. Русакова “Педиатрия” 2002 стр. 32

522) Südəmər yaş dövründə ilk əlavə yemək hansı ayda verilir?

A) 7 ayında
B) 8 ayında
C) 3 ayında
D) 4 ayında
E) 6 ayında

Ədəbiyyat:Л.Ф.Исаева, Л.К.Баженова «Детские болезни » Москва 1986 стр 101

523) Ana südü ilə qidalanmada əmmə müddətini kim təyin edir?

A) Köməkçi təyin edir
B) Süd verən ana təyin edir
C) Tibb bacısı təyin edir
D) Həkim təyin edir
E) Uşaq təyin edir

Ədəbiyyat:: Л.Ф.Исаева, Л.К.Баженова «Детские болезни » Москва 1986 səh 104

524) Hansı çəkidə doğulmuş uşaq orta çəkili hesab edilir?

A) 3000-3500 qr
B) 3500-4000 qr
C) 2000-2500 qr
D) 2500-3000 qr
E) 4000-4500 qr

Sitat az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:N. Tağıyev “Neontologiya” 2007 səh 35

525) Yeni doğulmuşda fizioloji çəki itkisi neçənci gün müşahidə edilir?

A) 7-8-ci
B) 8-9-cu
C) 3-4-cü
D) 1-2-cü
E) 2-5-cü

Ədəbiyyat:: N. Tağıyev “Neonatologiya” Bakı 2007 səh 38

526) Erkən yaşlı uşaqlarda xarici qulaq keçəcəyinin təmizlənməsində nədən istifadə edilir?

A) Tənzif kürəciklər
B) Suda isladılmış kürəciklər
C) Quru pambıq çöplər
D) Pambıq kürəciklər
E) Steril bitki yağında isladılmış pambıq çöplər

Ədəbiyyat:N. Tağıyev “Neonatologiya” Bakı 2007 səh 33

527) Südəmər uşaqlarda kəskin rinit zamanı əmizdirmədən əvvəl buruna damargenəldici damcının tökülməsində məqsəd nədir?

A) Burun selikli qişasının ödemini artırmaq
B) Bədən hərarətini azaltmaq
C) Qarında köpü azaltmaq
D) Burunun selikli qişasında ödemi azaltmaq
E) Bağırsaq peristaltikasını artırmaq

Ədəbiyyat:: Л.Ф.Исаева, Л.К.Баженова «Детские болезни » Москва 1986 стр 100

528) Uşaqda həzm orqanı xəstəliklərində ilk xəbərdaredici əlamət hansıdır?

A) İştahanın pozulması
B) Qarında köp
C) Qarında ağrı
D) Dispeptik əlamətlər
E) Yuxunun pozulması

Ədəbiyyat:Л.Ф.Исаева, Л.К.Баженова «Детские болезни » Москва 1986 стр 369

529) Mədə xorası olan uşağın qida rasionundan nə çıxarılır?

A) Ət və balıq bulyonu
B) Südlü sıyıqlar
C) Zeytun yağı

Yalnız az ödənişsiz istifadə üçün

D) Süd,kəsmik
E) Kərə yağı

Ədəbiyyat:: Л.Ф.Исаева, Л.К.Баженова «Детские болезни » Москва 1986 стр 374

530) Uşaqda mədə bağırsaq qanaxması zamanı tibb işçisinin taktikası?

A) Uşağa coxlu maye vermək
B) Mədəni aminkapron turşusu ilə yumaq
C) Bağırsaqları təmizləmək
D) Uşağı tez stasionara çatdırmaq
E) Uşağa duru qida vermək

Ədəbiyyat:: Л.Ф.Исаева, Л.К.Баженова «Детские болезни » Москва 1986 ст. 381

531) Uşaqda defekasiya aktını ləngidən qidalar hansılardır?

A) Əzilmiş qidalar
B) Qazlı mineral sular
C) Müxtəlif sıyıqlar
D) Çox şirniyyat qəbulu
E) Müxtəlif şorbalar

Ədəbiyyat:: Л.Ф.Исаева, Л.К.Баженова «Детские болезни » Москва 1986 стр. 74

532) Uşaqda defekasiya aktını normallaşdıran qidalar hansılardır?

A) Sıyıqlar
B) Tünd çay
C) Qara çörək, tərəvəz
D) İsti su
E) Düyü həlimi

Ədəbiyyat:: Л.Ф.Исаева, Л.К.Баженова «Детские болезни » Москва 1986 стр 75

533) Vaxtından əvvəl doğulmuş uşaq üçün ən ideal dəyərli qida nədir?

A) Ana südü
B) Adaptə olunmuş qarışıqlar
C) Kefir
D) İnək südü
E) Keçi südü

Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neanatologiya ”Bakı 2007 səh 124

534) Hamiləliyin neçə həftəsindən əvvəl doğulan uşaq vaxtından əvvəl doğulmuş sayılır?

A) 41

test.az ödənişsiz istifadə üçün

B) 40
C) 39
D) 37
E) 42

Ədəbiyyat:: N.Tağıyev “Neonatologiya ”, “Bakı” 2007 səh 126

535) Yeni doğulma dövründə sepsisə səbəb olan giriş qapısı hansıdır?

A) Ağız boşluğu
B) Konyuktiva
C) Burun keçəcəyi
D) Dəri
E) Göbək yarası

Ədəbiyyat:: N.Tağıyev “Neonatologiya ” Bakı 2007 səh 126

536) Aşağıdakılardan hansı yeni doğulmuşun hemolitik xəstəliyində orqanizmə toksiki təsir edir?

A) Melanin
B) Xolestrin
C) Bilurubin
D) Qlukoza
E) İnsulin

Ədəbiyyat:: N.Tağıyev “Neonatologiya ” Bakı-2007 səh 305

537) Aşağıdakılardan hansı xromosom xəstəliyidir?

A) Şəkərsiz diabet
B) Piylənmə
C) Şəkərli diabet
D) Daun xəstəliyi
E) Fenilketonuriya

Ədəbiyyat:: Л.Ф.Исаева, Л.К.Баженова «Детские болезни » Москва 1986 səh 352

538) Hansı çəkidə doğulan uşaq vaxtından əvvəl doğulmuş sayılır?

A) 2800 qr
B) 2500 qr
C) 2700 qr
D) 4000 qr
E) 3000 qr

Ədəbiyyat:: N. Tağıyev” Neonatologiya” ”Bakı” 2007 səh 125

539) Uşaqda burun – udlaq keçəcəyinin iltihabı necə adlanır?

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Rinit
B) Nazofaringit
C) Traxeit
D) Laringit
E) Faringit

Ədəbiyyat:: A.A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri” “Bakı”2008 səh 202

540) Uşaqda bronxial astma nə ilə xarakterizə olunur?

A) Yüksək hərarətlə
B) Qıcolma ilə
C) Tənginəfəsliklə
D) Göyərmə ilə
E) Boğulma tutması ilə

Ədəbiyyat:: A.A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri” “Bakı”2008 səh 190

541) Uşaqda kəskin otitin əsas əlaməti nədir?

A) Sianoz
B) Döş qəfəsində ağrı
C) Öskürək
D) Tənginəfəslik
E) Qulaqda ağrı

Ədəbiyyat:A.A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri” “Bakı”2008 səh 191

542) Revmatik poliartitdə hansı oynaqlar daha çox zədələnir?

A) Böyük oynaqlar
B) Onurğa sütunu oynaqları
C) Kiçik oynaqlar
D) Əl darağı oynaqları
E) Döş qabırğa oynaqları

Ədəbiyyat:: A.A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri” “Bakı”2008 səh 228

543) Uşaqda ac qarına selikli və turş iyli qusma hansı xəstəlikdə çox olur?

A) Xroniki qastritdə
B) Kəskin qastritdə
C) Pankreatitdə
D) Mədə xorasında
E) Enterokolitdə

Ədəbiyyat:: A.A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri””Bakı” 2008 səh 82

smekaz ödənissiz istifadə üçün

544) Qızılca infeksiyasında səpgi neçəngi gün əmələ gəlir?

A) 7-8
B) 5-6
C) 4-5
D) 2-3
E) 1-2

Ədəbiyyat:: Л.Ф.Исаева, Л.К.Баженова «Детские болезни » Москва 1986 стр. 488

545) Epidemik parotitin törədicisi nədir?

A) Göbələk
B) Bağırsaq çöpləri
C) Bakteriya
D) Virus
E) Salmonellalar

Ədəbiyyat:: Л.Ф.Исаева, Л.К.Баженова «Детские болезни » Москва 1986 стр 503

546) Hepatit B-nin infeksiya mənbəyi hansıdır?

A) Xəstə
B) Virusdaşıyıcısı və xəstə
C) Xəstə heyvan
D) Sağlam daşıyıcılar
E) Virusdaşıyıcı

Ədəbiyyat:: Л.Ф.Исаева, Л.К.Баженова «Детские болезни » Москва 1986 стр 547

547) Vərəm çöpləri orqanizmə hansı yolla daxil olur?

A) İnyeksion yolla
B) Dəri ilə
C) Yuxarı tənəffüs yolları ilə
D) Hematogen yolla
E) Ağız boşluğu ilə

Ədəbiyyat:: Л.Ф.Исаева, Л.К.Баженова «Детские болезни » Москва 1986 стр 248

548) Yeni doğulmuşlarda boyun orta uzunluğu neçə sm təşkil edir?

A) 50-55
B) 48-52
C) 40-42
D) 4-45
E) 55-60

Ədəbiyyat:: N. Tağıyev" Neonatologiya "Bakı"2007 səh 39

sınaq üçün istifadə üçün

549) Südəmər uşağı meyvə şirəsi nə ilə təmin edir?

A) Yağla
B) Zülalla
C) Karbohidratla
D) Su ilə
E) Vitaminlərlə

Ədəbiyyat:: Л.Ф.Исаева, Л.К.Баженова «Детские болезни » Москва 1986 стр 101

550) Südəmər uşağı yumurta sarısı nə ilə təmin edir?

A) Duzlarla
B) Zülalla
C) Karbohidratla
D) D vitamini ilə
E) Yağla

Ədəbiyyat:: Л.Ф.Исаева, Л.К.Баженова «Детские болезни » Москва 1986 стр 101

551) Uşağın qanında şəkəri yoxlamaq üçün qan nə vaxt götürülür?

A) Qidalanmadan 1 saat sonra
B) Yeməkdən sonra
C) Acqarına
D) Qidalanmadan15 dəq sonra
E) Qida qəbulundan asılı olmayaraq

Ədəbiyyat:: A.A. Əyyubova "Uşaq xəstəlikləri" "Bakı"2008 səh 333

552) Zimnitski sınağında sutkalıq sidik neçə saatdan bir yığılır?

A) 6
B) 2
C) 4
D) 5
E) 3

Ədəbiyyat:: A.A. Əyyubova "Uşaq xəstəlikləri""Bakı" 2008 səh 267

553) Qastroenterit zamanı mədənin yuyulmasında məqsəd nədir?

A) Bağırsağın funksiyasını normallaşdırmaq
B) Ağrını azaltmaq
C) Mədənin funksiyasını normallaşdırmaq
D) Köpü azaltmaq
E) Toksinin bədəndən xaric edilməsi

Ədəbiyyat:: A.A. Əyyubova "Uşaq xəstəlikləri" Bakı"2008 səh 88

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

554) Uşaqlarda helmintozun törədicisi nədir?

A) Bakteriyalar
B) Streptakokklar
C) Stafilakokklar
D) Parazit qurdlar
E) Göbələklər

Ədəbiyyat:: Л.Ф.Исаева, Л.К.Баженова «Детские болезни » Москва 1986 стр 586

555) Südəmər uşağın qida rasionuna ət qiyməsi nə vaxt daxil edilir?

A) 4-cü aydan
B) 12-ci aydan
C) 5-ci aydan
D) 9-cu aydan
E) 6-cı aydan

Ədəbiyyat:: Л.Ф.Исаева, Л.К.Баженова «Детские болезни » Москва 1986 стр 102

556) Uşaqlarda sidiyin ümumi müayinəsi üçün hansı sidik götürülür?

A) Cecə sidiyi
B) Son sidik
C) Orta porsiya
D) Sutkalıq sidik
E) İlk sidik

Ədəbiyyat:A.A.Əyyubova "Uşaq xəstəlikləri" Bakı 2008"Bakı" səh 270

557) Yeni doğulmuşlarda dəri bişməcələrinin səbəbi nədir?

A) Dərinin quruması
B) Bədənin qızması
C) Pis qulluq
D) Bədənin soyuması
E) İnfeksiya

Ədəbiyyat:: N. Tağıyev "Neontologiya" 2007 səh 178

558) Uşaqda mədənin təcili yuyulmasına göstəriş nədir?

A) Mədə qanaxması
B) Xolesistit
C) Pankreatit
D) Yemək borusu qanaxması
E) Qida zəhərlənməsi

sitat az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:A.A.Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008 səh 90

559) Kəskin böyrək ağrısında yardım üçün hansı preparatdan istifadə edilir?

A) Dibazol, Adrenalin
B) Aspirin, Analgin
C) Noşpa, Baralgin
D) Dimedrol ,Prednizalon
E) Laziks

Ədəbiyyat:A.A.Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008 səh 270

560) Yenidoğulmuşa hansı hepatitə qarşı peyvənd vurulur?

A) Hepatit E
B) Hepatit C
C) Hepatit A
D) Hepatit D
E) Hepatit B

Ədəbiyyat:Təcrübədə immunlaşdırma Modul 2 Bakı 2008

561) Salmonelyozun yoluxma mənbəyi hansı ola bilər?

A) İnsan
B) Çirkli əşyalar
C) Çirkli əl
D) İnfeksiyalaşmış qida və su
E) Heyvan

Ədəbiyyat:Л.Ф.Исаева, Л.К.Баженова «Детские болезни » Москва 1986 стр 562

562) Uşaqlarda mədənin yuyulmasına əks göstəriş nədir?

A) Qida zəhərlənməsi
B) Spirtlə zəhərlənmə
C) Mədə qanaxması
D) Perekislə zəhərlənmə
E) Dərman zəhərlənməsi

Ədəbiyyat:A.A.Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008 səh 91

563) Yeni doğulmuşun dərisinin ilkin təmizlənməsi necə aparılır?

A) Steril bitki yağı ilə
B) 70%-li spirtlə
C) 2%-li yodla
D) Furasilinlə
E) 5%-li kalium permanqanatla

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:N. Tağıyev “Neonatologiya” “Bakı”2007 səh 60

564) Yeni doğulmuşlarda Apqar şkalası ilə nə qiymətləndirilir?

A) Əzələ tonusu, ürək fəaliyyəti
B) Dərinin rəngi , reflekslər
C) Ürək fəaliyyəti, tənəffüs fəaliyyəti, dərinin rəngi, reflekslər
D) Reflekslər, tənəffüs fəaliyyəti
E) Uşağın ümumi vəziyyəti

Ədəbiyyat:: N. Tağıyev “Neonatologiya” Bakı”2007 səh 48

565) Südəmər yaşda sünii qidalanmaya keçilməsinə göstəriş nədir?

A) Südün çətin ifraz olması
B) Ana südünün keyfiyyətsiz olması
C) Ana südünün az olması
D) Ana südünün olmaması
E) Südün çox yağı olması

Ədəbiyyat:Л.Ф.Исаева, Л.К.Баженова «Детские болезни » Москва 1986 стр 156

566) Selikli qanlı nəcis hansı xəstəlik üçün xarakterdir?

A) Enterovirus infeksiyası
B) Eşerixioz
C) Enterit
D) Salmanelloz
E) Dizenteriya

Ədəbiyyat:: Л.Ф.Исаева, Л.К.Баженова «Детские болезни » Москва 1986 стр 558

567) Eskikoz və toksikiz hansı infeksion xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Salmonelyoz
B) Skarlatina
C) Difteriya
D) Dizenteriya
E) Eşerixioz

Ədəbiyyat:: Л.Ф.Исаева, Л.К.Баженова «Детские болезни » Москва 1986 стр 565

568) Tibb müəssisələrində,hepatit B və C–nin yoluxma yolları hansılardır?

A) Enterial
B) Parenteral
C) Hava damcı
D) Kontakt-məişət

Sek.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Fekal - oral

Ədəbiyyat:: Л.Ф.Исаева, Л.К.Баженова «Детские болезни » Москва 1986 стр 548

569) Təmizləyici imalə edilərkən yeni doğulmuşun vəziyyəti necə olmalıdır?

A) Yanı üstə
B) Kürəyi üstə
C) Sol böyrü üstə
D) Qarnı üstə
E) Sağ böyrü üstə

Ədəbiyyat:N. Tağıyev "Neonatologiya"."Bakı" 2007 səh 75

570) Həkiməqədər yardıma bayılma zamanı daxil edilmir?

A) Uşağa kofein və ya kardiamin vurmaq
B) Uşağa yarımoturaq vəziyyət vermək.
C) Buruna naşatır spirtində islanmış tampon qoymaq
D) Uzandırmaq ayaqlarını yuxarı qoymaq
E) Təmiz hava ilə təmin etmək

Ədəbiyyat:: A.A.Əyyubova "Uşaq xəstəlikləri" Bakı 2008 səh 209

571) Yüksək hərarət zamanı uşağa göstərilən yardıma daxil deyildir?

A) Dərini spirtlə silmək
B) Hərarətsalıcılar vermək
C) Çoxlu maye vermək
D) Başa soyuq qoymaq
E) Kalorili qida

Ədəbiyyat:: A.A.Əyyubova "Uşaq xəstəlikləri" Bakı 2008 səh 160

572) Bronxial astmanın ən xarakterik simtomu hansıdır?

A) Öskürək
B) Qarında ağrı
C) Kataral əlamətlər
D) Nəfəsvermə zamanı təngnəfəslik
E) Yüksək hərarət

Ədəbiyyat:: A.A.Əyyubova "Uşaq xəstəlikləri" Bakı 2008 səh 190

573) Xəstəxana daxili pnevmoniyanın etiologiyasında aşağıdakı bakteriyalardan hansının rolu böyükdür?

A) Qızılı stafilokok
B) Pnevmokok

Yüksək az ödənişsiz istifadə üçün

C) Steptokok
D) Meninqokok
E) Göy irin çöpləri

Ədəbiyyat:: A.A.Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008 səh 162

574) Hipoqlikemik komanın əsas yaranma səbəbi?

A) Karbohidratın çox qəbulu
B) Passiv həyat tərzi
C) İnsulinin artıq dozada vurulması
D) İnsulinin dozadan az vurulması
E) Aktiv həyat tərzi

Ədəbiyyat:: A.A.Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008 səh 135

575) Uşaqda raxit xəstəliyinin profilaktikası üçün vitamin D-nin sutkalıq dozasını göstərin.

A) 300 mq
B) 400 mq
C) 700 mq
D) 600 mq
E) 800 mq

Ədəbiyyat:: A.A.Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008 səh 15

576) Qızılcanın aktiv immunizasiyası ilə edilir.Nöqtələrin yerinə uyğun gələn cavabı seçin.

A) Diri qızılca vaksini
B) BSJ ilə
C) Askorbin turşusu
D) İnsan immunoqlobulini
E) Tuberkulin

Ədəbiyyat:: Təcrübədə immunlaşdırma metodik göstərişlər. Modul 2 səh 18

577) Uşaqda qıcolma sindromu zamanı hansı preparat istifadə edilir?.

A) Kalsium xlorid v/d
B) Relanium ə/d, v/d
C) Elenium həb
D) Dimedrol ə/d
E) Fenorbarbital həb

Ədəbiyyat:: A.Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008 səh 38

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

578) Feldşer 12 yaşlı uşağı müayinəyə çağrılıb. Uşaq tez yorulma, iştahsızlıqdan şikayət edir. Dəri və selikli qişalar avazımış, çəki azalmış, boyun limfa vəziləri böyüyüb . Gecə tərləməsi olur. Təxmin edilən ilkin feldşer diaqnozu hansı ola bilər?

A) Difteriya
B) Qızılca
C) Qrip
D) Skarlatina
E) Vərəm limfadeniti

Ədəbiyyat:: Л.Исаева,Л.К.Баженова «Детские болезни» 1986 Москва стр 507

579) Yenidoğulmuşların asfiksiyası zamanı ilk tədbır olaraq nə etməli?

A) Yuxarı tənəffüs yollarının sanasiyası
B) Süni tənəffüssün verilməsi
C) Oksigen verilməsi
D) Ağciyərin süni ventilyasiyası
E) Ürəyin massajı

Ədəbiyyat:N.Tağıyev Neonatologiya. Bakı 2007.səh 145

580) Pandaktilit nəyin iltihabıdır?

A) Sümük iliyinin
B) Barmaq dərisinin
C) Dəri və selikli qişanın
D) Vətər yatağının
E) Barmağın bütün toxumalarının iltihabı

Ədəbiyyat:H.Sultanov.Cərrahiyyə-1997.(səh-260)

581) Əzələdaxili inyeksiyaları harada vurmaq olar?

A) Evdə
B) Prosedur kabinetində
C) Bütün sadalanan yerlərdə
D) Palatada
E) Təcili yardım maşınında

Ədəbiyyat:S.A.Aqkatsyeva.Tibb bacısının işində praktik vərdişlər (səh-159)

582) Uşaqda qlomerulonefritin yaranmasına daha çox səbəb olan xəstəlik hansıdır?

A) Enterobioz
B) Angina, skarlatina
C) Yuxarı tənəffüs yollarının katarı
D) Bronxit
E) Pnevmoniya

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:: A. A. Əyyubova “ Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008 səh 218

583) Pielonefrit zamanı uşağın qida rasionu nə ilə zəngin olmalıdır?

A) Qəbul edilən maye azaldılmalı
B) Qəbul edilən maye artırılmalı
C) Yağla zəngin
D) Duzlu
E) Zülalla zəngin

Ədəbiyyat:: A. A. Əyyubova “ Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008 səh 267

584) Hemofiliyanın ən xarakterik əlaməti nədir?

A) Qanda leykositlərin çoxalması
B) Hematoma
C) Qanaxma
D) Hemartroz
E) Qanda Hb - nin azalması

Ədəbiyyat:: A. A. Əyyubova “ Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008 səh 317

585) Qlomerulonefrit zamanı Zimnitski sınağının aparılmasında məqsəd:

A) Sidiyin ümumi müayinəsi üçün
B) Sidikdə zülalı tapmaq üçün
C) Sidikdə leykositi tapmaq üçün
D) Sidikdə şəkəri tapmaq üçün
E) Sidiyin xüsusi çəkisini, gecə və gündüz sidiyinin fərqini və sutkalıq sidiyi təyin etmək üçün

Ədəbiyyat:: A. A. Əyyubova “ Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008 səh 84

586) Uşaqda kəskin otit zamanı ilk tibbi yardım hansıdır?

A) Ayaq vannası
B) Qulaq nahiyəsinə soyuq kompres
C) Banka
D) Qulaq nahiyəsinə isidici kompres
E) Xardal

Ədəbiyyat:: A. Əyyubova “ Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008 səh 30

587) Vərəmin diaqnozu üçün hansı sınaqdan istifadə edilir?

A) BSJ
B) O. P. M.
C) Mantu sınağı
D) AGDT

Sınaq.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Sulkoviç sınağı

Ədəbiyyat:: Л. Исаева, Л. К. Баженова «Детские болезни» 1986 Москва стр 230

588) Anus ətrafında qaşınma hansı qurd xəstəliyi üçün xarakterikdir?

A) Tenidoz
B) Enterebioz
C) Trixosefalyoz
D) Askaridioz
E) Opistorxoz

Ədəbiyyat:: A. Əyyubova " Uşaq xəstəlikləri" Bakı 2008 səh 140

589) Difteriya xəstəliyi hansı yolla yayılır?

A) Kontakt - məişət
B) Hemotogen
C) Limfogen
D) Fekal - oral
E) Hava - damcı

Ədəbiyyat:Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр522

590) Difteriya xəstəliyi zamanı uşaqlarda hansı əlamət baş verir?

A) Yalançı inaq
B) Şok
C) Həqiqi inaq
D) Sarılıq
E) Bayılma

Ədəbiyyat:Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр526

591) Su çiçəyi xəstəliyində səpgilər hansı xarakterdə olur?

A) Lokalizasiya edici
B) Qabıqvermə
C) Polimorfizm(ləkə - papula - vezikula - qabıq)
D) Qaşınma
E) Etaplı səpmə

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр500

592) Bağırsaq infeksiyalarına yoluxmuş uşağın müalicəsi zamanı ilk tədbir nədir?

A) Çay - su fasiləsi, müalicəvi qida
B) Vitaminlərlə müalicə
C) Hormonlarlarla müalicə

Yalnız az ödənişsiz istifadə üçün

D) Antibiotiklərin təyini
E) Fermentlərlə müalicə

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр369

593) Eksudativ kataral diatezli uşaqlarda hansı əlamətlər olur?

A) Dəri və selikli qişaların zədələnməsi
B) Çəkinin azalması
C) Qan azlığı
D) Qusma, ishal
E) Hərarətin yüksəlməsı

Ədəbiyyat:Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр159

594) Raxit xəstəliyinin hansı dövründə vegetativ sinir sisteminin pozğunluğu baş verir?

A) Residiv verən dövürdə
B) Sağalma dövründə
C) Başlanğıc dövürdə
D) Kəskin dövürdə
E) Sarılıq əlamətləri dövründə

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр 190

595) " Raxit bilərzikləri", toyuq döş qəfəsi", "kraniotabes" raxit xəstəliyinin hansı dövründə əmələ gəlir?

A) Başlanğıc dövürdə
B) Qalıq əlamətləri dövründə
C) Kəskin dövürdə
D) Bütün dövrlərdə
E) Sağalma dövründə

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр 192

596) Raxit xəstəliyinin müalicəsi necə aparılır?

A) Sitrat qarışıqları və duz vannası təyin edilir
B) Kalsium qlükonat və pananginlə müalicə
C) Qeyri spesifik və spesifik müalicə
D) Qeyri spesifik müalicə və vitaminlər
E) İnfuzion müalicə

Ədəbiyyat:Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр 197

597) Uşaqlarda hansı helmint xolesistitin əmələ gəlməsinə səbəb olur?

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

A) Tükbaş qurdlar
B) Lentəbənzər qurdlar
C) Bizquyruq qurdlar
D) Askaridlər
E) Lyambliyalar

Ədəbiyyat:Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр 416

598) Spazmofiliyanin hansı formasında uşaqda qəflətən qırtlaqda spazm olur?

A) Larinqospazm
B) Eklampsiya
C) Karpopedal spazm
D) Gizli formasında
E) Hamısında

Ədəbiyyat:Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр 200

599) Spazmofiliyanin profilaktikası necə aparılır?

A) Polivitamin verilir
B) Ferment təyin edilir
C) Təbii qidalanma, raxitin müalicəsi
D) Duz vannaları təyin edilir
E) Massaj və idman təyin edilir

Ədəbiyyat:Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр 203

600) Uşaqlarda bronxial astma tutması zamanı hansı preparatdan istifadə etmək olar?

A) Qan əvəzedicilər
B) Eufillin, efedrin
C) Vitaminlər
D) Antibiotiklər
E) Ürək qlükozidləri

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр 242

601) Uşaqlarda plevrit hansı əlamətlərlə xarakterizə olunur?

A) A/T və hərarətin enməsi
B) Hərarətin qalxması, tənəffüs zamanı və öskürdükdə şiddətli ağrı
C) Ürəkbulanma və qusma
D) Qarında küt ağrılar
E) Fasiləsiz öskürək, bəlğəm ifrazı

Ədəbiyyat:: A. A. Əyyubova Uşaq xəstəlikləri. Bakı 2008. səh. 184

smk.az ödənişsiz istifadə üçün

602) Uşaqlarda anadangəlmə ürək qüsurunun yaranmasına səbəb nədir?

A) Yarımçıq doğulma
B) Doğuş vaxtı narkoz alma
C) Doğuş zədəsi
D) Vaxtı keçmiş hamiləlik
E) Bətndaxili infeksiya

Ədəbiyyat:: A. A. Əyyubova Uşaq xəstəlikləri. Bakı 2008. səh. 218

603) Uşaqlarda lyambliozun müalicəsində hansı preparat işlədilir?

A) Ampisillin
B) Tetrasiklin
C) Vitaminlər
D) Tavegil
E) Furazolidon

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр416

604) Uşaqda təngnəfəslik zamanı hansı preparat istifadə edilə bilər?

A) Kofein
B) Qlükoza
C) Vitamin
D) Dimedrol
E) Lobelin

Ədəbiyyat:: A. A. Əyyubova Uşaq xəstəlikləri. Bakı 2008. səh. 148

605) Uşaqlarda larinqotraxeitin əlamətləri necə başlayır?

A) Tədricən başlayır, səs aydın olur
B) Tədricən başlayır, səsi batmır
C) Tədricən başlayır, səsi xırıltılı olur, bəzən batır.
D) Kəskin başlayır, öskürək olur
E) Kəskin başlayır, küylü tənəffüs olur

Ədəbiyyat:A. A. Əyyubova Uşaq xəstəlikləri. Bakı 2008. səh. 205

606) Uşaqlarda kəskin bronxitin müalicəsində hansı preparatlar işlədilir?
1. Antibiotiklər
2. Hemodez
3. Bəlğəmgətiricilər
4. Kalsium xlorid
5. Hərarətsalıcılar
6 Qan preparatları

A) 6, 5, 4
B) 3, 5, 6

Şəxsi və ödənişsiz istifadə üçün

C) 2, 3, 4
D) 1, 3, 5
E) 4, 6, 2

Ədəbiyyat:: A. A. Əyyubova Uşaq xəstəlikləri. Bakı 2008. səh. 148

607) Uşaqlarda sadə diarreyanın(dispepsiya) əmələ gəlmə səbəbi nədir?

A) Uşaqları çox yedizdirmək, suyu az vermək
B) Süni qidalanma
C) Ananin südünün az olması
D) Yarımçıq doğulma
E) Vitaminsiz qidaların qəbulu

Ədəbiyyat:: A. A. Əyyubova Uşaq xəstəlikləri. Bakı 2008. səh. 52

608) Uşaqlarda toksik diarreya (dispepsiya) zamanı çay-su fasiləsi neçə saat təyin olunur?

A) 10
B) 24
C) 18
D) 16
E) 12

Ədəbiyyat:A. A. Əyyubova Uşaq xəstəlikləri. Bakı 2008. səh. 54

609) Ensefalopatiyalı uşaqda qıcolmanın qarşısını almaq üçün hansı preparat istifadə edilə bilər?

A) Fenobarbital
B) Heparin
C) Difenin
D) Sulfanilamidlər
E) Diakarb

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр120

610) Duodenal zondlama zamanı A, B, C porsiyası nəyi bildirir?

A) Qaraciyər möhtəviyyatı
B) Mədəaltı vəz və bağırsağın şirəsi
C) Duodenal, öd kisəsi, qaraciyər ödü
D) Mədəaltı vəz və qaraciyər şirəsi
E) 12 barmaq bağırsaq və mədə şirəsi

Ədəbiyyat:C. N, Hacıyev. R. Y. Əliyev Xəstələrə qulluq. Bakı 1998 səh. 198

611) Yenidoğulmuş uşaq sutka ərzində neçə dəfə yedizdirilməlidir?

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) 10 - 11
B) 8 - 9
C) 9 - 10
D) 4 - 5
E) 6 - 7

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр102

612) Uşaqlarda Hemofiliya xəstəliyi hansı yaşlarda biruzə verir?

A) 1 - 2
B) 9 - 10
C) 5 - 6
D) 3 - 4
E) 7 - 8

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр358

613) Uşaqlarda Hemofiliya xəstəliyini başqa xəstəliklərdən necə fərqləndirmək olar?

A) Kiçik zədələnmələr zamanı uzun müddətli qanaxmalar
B) Zədə alarkən göyərmələr, qan analizi götürüldükdən sonra qanaxmanın olması
C) Hemartrozlar
D) Spontan qanaxmalar
E) Yayılmış hematomalar

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр359

614) Hemofiliyalı uşaq kim tərəfindən daima nəzarətdə olmalıdır?

A) Baş tibb bacısı
B) Uşaq cərrahı
C) Baş həkim
D) Hematoloq
E) Uşaq travmatoloq

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр361

615) Uşaqlara hansı xəstəlik zamanı əlillik verilir?

A) Qlomerulonefrit
B) Hemolitik anemiya
C) Dəmirdefisitli anemiya
D) Spazmofiliya
E) Hemofiliya

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр360

smk.az ödənissiz istifadə üçün

616) Yenidoğulmuşda sepsisin olduğuna şübhə olarsa tibb bacısının taktikası necə olmalıdır?

A) Həkim çağırmaq, xəstəni stasionara hazırlamaq
B) Hormonlar vermək
C) Hərarətsalıcılar vermək
D) Antibiotiklər vurmaq
E) Vitaminlər vurmaq

Ədəbiyyat:Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр140

617) Uşaqda kəskin qarın sindromu olarsa tibb işçisi nə etməlidir?

A) Soyuq qoymalı, təcili hospitalizə etməlidir
B) Mədəni yumalıdır
C) Ağrıkəsici vurmalıdır
D) Təmizləyici imalə etməlidir
E) İsti qoymalıdır

Ədəbiyyat:C. N, Hacıyev. R. Y. Əliyev Xəstələrə qulluq. Bakı 1998 səh. 187

618) Uşaqlarda revmatizm xəstəliyinin residivinin qarşışını almaq üçün tibb bacısı ilk növbədə nəyi məsləhət görməlidir?

A) Zülallarla zəngin qidalar
B) Gündəlik rejimə əməl etmək
C) Göstərilənlərin hamısı
D) İnfeksiya mənbəyinin sanasiyası
E) Vitaminlərlə zəngin qidalar

Ədəbiyyat:Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр260

619) Bronxial astma ilə xəstə olan uşaqlar dispanser qeydiyyatdan nə vaxt çıxarılır?

A) 4 - 5 ildən sonra
B) 7 - 8 ildən sonra
C) 6 - 7 ildən sonra
D) Uşaq yeniyetmələr şöbəsinə verilənə qədər qeydiyyatdan çıxarılmır
E) 2 - 3 ildən sonra

Ədəbiyyat:Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр246

620) Dizenteriya xəstəliyi olan uşaq nədən şikayət edir?

A) Qarnın aşağı hissəsində sancı şəkilli ağrılardan
B) Arasıkəsilməyən qusmadan
C) İştahasızlıqdan
D) Qıcolmadan
E) Yuxusuzluqdan

sitə az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр561

621) Yenidoğulmuşlar şöbəsində xəstəxanadaxili salmanelloz xəstəliyinin infeksiya mənbəyi hansıdır?

A) Su
B) Yataq ağları
C) Qida
D) İnyeksiya
E) Tibbi personalın əlləri

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр562

622) Həll edilmiş BCJ, qızılca, məxmərək, parotit vaksinlərinin istifadə müddəti nə qədərdir?

A) Vaxt müddəti yoxdur
B) 10 - 12 saat
C) 8 - 10 saat
D) 6 saata qədər
E) 7- 8 saat

Ədəbiyyat:: Təcrübədə İmmunlaşdırma. Modul - 2 Bakı 2010 səh. 23

623) İmmun çatışmazlığı virusuna yoluxmuş uşaqlarda hansı yaşda qızılca əleyhinə peyvəndin aparılması düzgündür?

A) Bütün yaşlarda
B) 6 - 11 aylıqda
C) 2 yaşdan tez olmayaraq
D) Vaksinasiya etmək olmaz
E) 12 aylıqda

Ədəbiyyat:: Təcrübədə İmmunlaşdırma. Modul - 2 Bakı 2010 səh. 25

624) Cansız vaksinlərin yeridilməsindən sonra hansı reaksiya müşahidə olunur?

A) 3 gündən çox yüksək hərarət
B) İnyeksiya yerində ağrı və şişkinlik
C) İnyeksiya yerində abses
D) 2 gün ərzində subfebril temperatura
E) Qusma, ishal

Ədəbiyyat:: Təcrübədə İmmunlaşdırma. Modul - 2 Bakı 2010 səh. 25

625) Cansız vaksinlərin daşınması və saxlanması zamanı nə qadağandır?

A) +2 +8 temperaturda daşımaq olar
B) Qızdırmaq olmaz

Sesk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Dondurmaq olmaz
D) Rütubətli yerdə saxlamaq olmaz
E) Bir müəssisədən digərinə daşımaq olmaz

Ədəbiyyat:: Təcrübədə İmmunlaşdırma. Modul - 2 Bakı 2010 səh. 7

626) Uşağın 2 yaşı var, qriplə xəstələnib. Uşaq öskürür, öskürəklə yanaşı xırıltı və fit verici nəfəsvermə müşahidə edilir. Xəstəyə hansı diaqnozu qoymaq olar?

A) Obstruktiv bronxit
B) Kəskin bronxit
C) Bronxial astma
D) Larinqotraxeit
E) Pnevmoniya

Ədəbiyyat:: А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр. 186

627) Aşağıda göstərilən əlamətlərdən hansı 4 aylıq uşaq üçün fizioloji hal hesab edilir?

A) Ağızdan seliyin axması
B) Qusma
C) Meterorizm
D) 2 saat fasiləsiz ağlamaq
E) İshal

Ədəbiyyat:: А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр. 186

628) 10 günlük yenidoğulmuşun göbək yarasından irinli ifrazat gəlir. Uşaq döşü zəif götürür. Hərarəti 38 - 390 - dir. Göbək ətrafında qızartı və şişkinlik var. Aşağıdakılardan hansından şübhələnmək olar?

A) Vezikulopusfulyoz
B) Fleqmona
C) Omfalit
D) Sepsis
E) Abses

Ədəbiyyat:А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр. 186

629) Uşaq 7 aylıqdır, inək südü, mannı sıyığı ilə qidalanır. 3200qr. çəki ilə doğulub hazırda 6000 qramdır, oturmur, dişləri yoxdur. Boynunu 3 aylıqdan duz tutur, döş qəfəsi bir qədər batıqdır. Hansı xəstəlikdən şübhələnmək olar?

A) Hipervitaminoz D
B) Skalioz
C) Raxit

smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Osteoparoz
E) Spazmofiliya

Ədəbiyyat:: А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр. 187

630) Uşağın 1 yaşı var. Hərarəti 38°C - dir. Tez - tez selikli – qanli nəcis ifraz edir. Uşaqda tenezmlər var. Dəri avazımış, əzələ tonusu azalmış, ümumi arıqlama görünür. Hansı xəstəlikdən şüphələnmək olar?

A) Toksiki dispepsiya
B) Sadə dispepsiya
C) Salmonelloz
D) Dizenteriya
E) Kolienterit

Ədəbiyyat:: А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр. 187

631) 5 aylıq uşaqdır. Hərarəti 39°C - dir. Öskürəyi var, tənəffüsü çətinləşib, ağız, burun ətrafında göyərmə var, dəri solgundur, ağciyərlər üzərində quru və yaş xırıltılar eşidilir. Hansı xəstəlikdən şüphələnmək olar?

A) Xroniki tonzillit
B) Plevrit
C) Kəskin bronxit
D) Pnevmoniya
E) Bronxial astma

Ədəbiyyat:: А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр. 188

632) Uşaq 3 günlükdür. 2000 qr çəki ilə doğulub. Anadangəlmə refleksləri zəifdir, döşü tuta bilmir. Dərisi sianozlu və tüklüdür, Dərialtı piy qatı sifət və ətraflarda azdır. Uşaq necə doğulub ?

A) Ürək qüsuri ilə doğulub
B) Vaxtında doğulub
C) Vaxtından əvvəl doğulub
D) Asfiksiya ilə doğulub
E) Daun xəstəliyi var

Ədəbiyyat:: А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр. 189

633) 5 aylıq uşağın boyu və çəkisi nə qədər olmalıdır?

A) Çəki 5000 qr boyu 50 sm
B) Çəki 8000 qr, boyu 80 sm
C) Çəki 7000 qr, biyu 45 sm

sdk.az ödənişsiz İnfadə üçün

D) Çəki 6500 qr, boyu 60 - 65 sm
E) Çəki 9000 qr boyu 85 sm

Ədəbiyyat:: А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр. 186

634) Qəbula 9 yaşlı uşaq gətirilib. Uşaq ürək bulanma, iştahsızlıq və qarında ağrıdan şikayət edir. Yuxusu pozulub, əsəbidir, gecələr ağzından su gəlir. Hansı xəstə - likdən şübhələnmək olar?

A) Qastrit
B) Xolesistit
C) Qurd xəstəliyi
D) Qastroenterit
E) Esterit

Ədəbiyyat:: А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр. 188

635) Qəbula 7 yaşlı uşaq gətirilib, sifətin dərisi solğundur, göz qapaqları şişkindir. Sidik ifrazı azalıb Ananın dediyinə görə sidiyi bulanıqdır, uşağın iştahası pisdir, ürək bulanma və baş ağrısı var. A/T yüksəlib. Hansı xəstəlikdən şübhələnmək olar?

A) Qlomerulonefrit
B) Xolesistit
C) Pielonefrir
D) Böyrək daşı xəstəliyi
E) Sistit

Ədəbiyyat:: А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр. 187

636) Uşağın 8 yaşı var. Ananın dediyinə görə uşağın iştahası pisdir, tez yorulur, nəcisi rəngsizləşib, sidiyi tündləşib. Müayinədə dəridə sarılıq görünür, qara ciyər 3 sm böyüyüb. Hansı xəstəlikdən şübhələnmək olar?

A) Qeyri infeksion hepatit
B) Virus hepatiti
C) Öd daşı xəstəliyi
D) Pnevmoniya
E) Xolesistit

Ədəbiyyat:: А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр 188

637) Uşaq 3 aylıqdır. Hər gün uşaqda qaytarma və qusma olur. Uşaq ana südü ilə qidalanır. Çəkisi 3650 qr (doğulanda çəkisi 3600 qr) belə bir vəziyyətin yaranmasının səbəbi nədir?

A) Meteorizm

Sınaq.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Pilorospazm
C) Aerofagiya (hava udma)
D) Pilorostenoz
E) Çox yedizdirmə

Ədəbiyyat:: А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр 189

638) Uşağın 7 yaşı var. Yağlı yeməkdən sonra ürəkbulanmadan, sağ qabırğaaltı nahiyədə ağrıdan çikayət edir. Hansı xəstəlikdən şübhələnmək olar?

A) Enterit
B) Kolit
C) Qastrit
D) Xolesistit
E) Mədə xorası

Ədəbiyyat:: А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр 187

639) Qəbula 10 aylıq uşaq gətirilib. Ananın dediyinə görə iştahası, yuxusu pisdir, uşaqda dəri və selikli qişalar solğundur, əzələ tonusu zəifdir. Auskultasiyada ürəkdə sistolik küy eşidilir. Dəri və selikli qişalar qurudur, ağız bucaqlarında çatlar var.

A) Hipotrofiya
B) Dəmir defisiteti anemiya
C) Zülal defisiteti anemiya
D) Vitamin defisiteti anemiya
E) Pnevmaniya

Ədəbiyyat:: А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр 186

640) Uşağın 6 yaşı var, dünən xəstələnib. Hərarəti 38 dərəcədir. Boğazında ağrı var. Dili moruğu rəngdədir. Dəridə nöqtəvari səpgilər var . Hansı xəstəlikdən şübhələnmək olar?

A) Su çiçəyi
B) Eksudativ kataral diatez
C) Skarlatina
D) Qızılca
E) Hemorragik diatez

Ədəbiyyat:: А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр 188

641) Xəstəxanaya 5 aylıq uşaq gətirilib. Sini qidalanır. 3 gündür xəstədir. Sutkada 5 - 6 dəfə qusma, 8 - 10 dəfə sulu duru nəcis ifrazı olur. Hərarət 380. Uşağın vəziyyəti ağırdır, çəki 800 qr itirilib, əzələ tonusu və dərinin turqovluğu azalıb. Hansı xəstəlikdən şübhələnmək olar?

Pulsuz ödənişsiz istifadə üçün

A) Kolit
B) Sadə dispepsiya
C) Dizenteriya
D) Enterit
E) Toksiki dispepsiya.

Ədəbiyyat:: А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр 189

642) Xəstəxanaya 10 yaşlı uşaq gətirilib. Huşu itib, nəbzin dəqiqəlik sayı 140, tənəf - füsün dəqiqəlik sayı 35. - dir. 3 gündür xəstədir. Xəstəlik qusma ilə başlayıb. Sidi - yin müayinəsində şəkər və aseton tapilib. Kliniki diaqnoz nə ola bilər?

A) Pnevmoniya
B) Hiperqlikemik koma
C) Hipoqlikemik koma
D) Şəkərsiz diabet
E) Şəkərli diabet

Ədəbiyyat:: А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр 188

643) Ana 5 yaşlı uşağı ilə feldşerə müraciət edir. Uşaqda zəiflik və qarında ağrı var. Gecələr temperaturu 37, 9 °C dərəcə olur, iştahası azalıb, tez - tez sidiyə gedir, sidiyin rəngi tünddür. Uşağın dili qurudur, ağ ərplə örtülüb, qaraciyər, dalaq böyüməyib. Uşaqda hansı xəstəlik ola bilər?

A) Qlomerulonefrit
B) Xroniki pielonefrit
C) Kəskin pielonefrit
D) Xolesistit
E) Nefropatiya

Ədəbiyyat:Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 422

644) Ana 1 yaşında uşağı ilə feldşerə müraciət edir. Uşaq 3 gündür xəstədir. Ana öskürəkdən, güclü zökəmdən, zəiflikdən, iştahasızıqdan və yuxunun pis olmasından şikayət edir. Uşaqda hansı xəstəlik ola bilər?

A) Kəskin laringit
B) Pnevmoniya
C) Kəskin rinit
D) Adenovirus infeksiyası
E) Kəskin bronxit

Ədəbiyyat:N. N. Əliyev. M. M. Muxtarov Yoluxucu xəstəliklər. Bakı 1993 səh. 178

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

645) Uşaq 3 yaşındadır. Bağçaya gedir. Xəstəliyi kəskin başlayıb, hərarəti 38, 50C, qarnında ağrı var, 1 dəfə qusub. Uşaqda tez - tez selik və qanla qarışıq nəcis ifrazı var, uşaq narahatdır, gücənir, defekasiya ağrılıdır. Uşaq hansı xəstəlikdən əziyyət çəkir?

A) Dizenteriya
B) Salmonelloz
C) Sadə dispepsiya
D) Toksiki dispepsiya
E) Qida tosiko - infeksiyası

Ədəbiyyat:N. N. Əliyev. M. M. Muxtarov Yoluxucu xəstəliklər. Bakı 1993 səh. 49

646) Ana 5 yaşlı qızı ilə feldşerə müraciət edir, uşağın narahat, əsəbi olduğunu, qarnında periodik ağrılardan şikayət etdiyini söyləyir. Uşaqda ürək bulanma, anus nahiyəsində qaşınma, gecə sidiyi saxlaya bilməmək, iştahanın və yuxunun pozulması var. Hansı xəstəlikdən şübhələnmək olar?

A) Askaridoz
B) Koli infeksiya
C) Lyamblioz
D) Gecə enurezi
E) Enterobioz

Ədəbiyyat:Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 586

647) Ana 5 yaşlı uşağının bədənində səpgilər olduğundan feldşerə şikayət edir. Uşağın temperaturu normaldır, üzündə, bədənində və ətraflarında xırda papulyoz çəhrayı səpgilər var, dərinin rəngi dəyişib. Boyun ardı limfa düyünləri əllənir, ağrısızdır. Əsnək qızarmışdır. Hansı xəstəlikdən şübhələnmək olar?

A) Diferiya
B) Su çiçəyi
C) Qızılca
D) Skarlatina
E) Məxmərək

Ədəbiyyat:Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 497

648) Feldşerin qəbuluna 6 yaşlı uşaq gətirmişlər. Uşaq 2 həftədir davamlı olaraq öskürür, öskürək tutmaşəkilli olub, ən çox gecə artır və bəzən qusma ilə müşayət olunur. Uşağa vaksinasiya edilməyib. Tutmalar arası uşağın vəziyyəti kafi, temperaturu 36, 6 0C olur. Hansı xəstəlikdən şübhələnmək olar?

A) Kəskin bronxit
B) Astmatik bronxit
C) Qrip
D) Göy öskürək
E) Kəskin respirator xəstəlik

Ədəbiyyat:Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 507

ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

649) Ana 6 yaşlı uşaqla feldşerə müraciət edib. Uşaq gecə xəstələnib, temperaturu 39, 0 oC - yə qalxıb. Uşaqda baş ağrısı, udqunma zamanı boğazda ağrı var. Səhər tezdən bədənində qırmızı nöqtəvari səpgilər əmələ gəlib, ağız - burun üçbucağı avazımışdır. Hansı xəstəlikdən şübhələnmək olar?

A) Skarlatina
B) Məxmərək
C) Epidemik parolit
D) Qızılca
E) Difteriya

Ədəbiyyat:Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 514

650) Feldşer 5 yaşlı uşağı yoxlayarkən aydın olur ki, uşaq 2 gündür xəstədir. Uşaq ağzını açarkən, çeynərkən, başını çevirərkən ağrı olmasından şikayt edir. Temperaturu 38°C, hər iki tərəfdən qulaq ətrafı şişmiş ağrılıdır. Uşaqda hansı xəstəlik ola bilər?

A) Skarlatina
B) Məxmərək
C) Difteriya
D) Lİmfadenit
E) Epidemik parotit

Ədəbiyyat:Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 503

651) Pasternatski simptomu hansı metodla yoxlanılır?

A) Palpasiya
B) Qanın müayinəsi
C) Auskultasiya
D) Döyəcləmə
E) Sidiyin mayinəsi

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 422

652) Qlomerulonefrit xəstəliyi keçirmiş uşaqlar neçə il dispanser nəzarətdə saxlanılır?

A) Dispanser qeydiyyata götürülmür
B) 1 il
C) 5 il
D) 3 il
E) 2 il

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 433

unik.az ödənişsiz istifadə üçün

653) Qlomerulonefrit xəstəliyi iə stasionardan evə yazılan uşaq neçə müddət ambulator müalicə almalıdır?

A) 6 aydan 8 aya kimi
B) 6 aydan 10 aya kimi
C) 10 aydan 6 ilə kimi
D) 6 - 10 aydan 2 - 3 yaşa kimi
E) 1 aydan 6 aya kimi

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 433

654) Yenidoğulmuş uşağın çəkisi nə qədər olduqda bağlı küvezə qoyulur?

A) 1700
B) 2100
C) 1900
D) 1500 - dən az
E) 2000

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 116

655) Uşaqlarda disbakteriozun müalicəsində təyin edilir.

A) Dimedrol
B) Antibiotik
C) Bifidobakterin
D) Biseptol
E) Panzinorm

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 568

656) Fellinq sınağı hansı xəstəliyin diaqnostikası məqsədilə aparılır?

A) Hemofiliya
B) Daun xəstəliyi
C) Anemiya
D) Fenilketonuriya
E) Şəkərli diabet

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва1986. стр. 203

657) Uşaqlarda revmatik xoreya özünü hansı şəkildə biruzə verir?

A) Larinqospazmla
B) Pilorostenozla
C) Hiperkinezlərlə
D) Pilorospazmla
E) Boğulma ilə

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 264

smk.az ödənişsiz istifadə üçün

658) Revmatizmin ikincili profilaktikası hansı preparatla aparılır?

A) Biseptol
B) Antibiotik
C) Dimedrol
D) Bisilin - 5
E) Korqlikon

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 267

659) İntoksikasiya, qarında və beldə ağrı, Pasternatski simptom (+) olması böyük yaşlı uşaqlarda hansı xəstəliyin mövcud olduğunu göstərir.

A) Nefropatiya
B) Sistit
C) Vulvovaginit
D) Pielonefrit
E) Qastrit

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 423

660) Oral dehidratasiya məqsədilə uşağa nə təyin olunur.

A) “ Oralit”, “ Reqidron
B) Hemodez, fizioloji məhlul
C) Vitaminlər
D) Poliqlükin, hemodez
E) Poliqlükin, reopoliqlükin

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 564

661) Aşağıdakılardan hansı yenidoğulmuş üçün xarakterikdir?

A) Açıcı əzələnin hipotoniyası
B) Bükücü əzələnin hipotoniyası
C) Açıcı əzələnin hipertoniyası
D) Əzələ tonusu normal olur
E) Bükücü əzələnin hipertoniyası

Ədəbiyyat:: Y. P. Bisyarina. Uşaqların anatom - fizioloji xüsisiyyətləri. səh. 119

662) Uşaqlarda süd dişlərinin daimi dişlərlə əvəz olunması nə vaxt başa çatır?

A) 11 - 12 yaşda
B) 7 - 8 yaşda
C) 13 - 14 yaşda
D) 5 - 6 yaşda
E) 3 - 4 yaşda

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 50

sınaq üz ödənişsiz istifadə üçün

663) Uşaqlarda pankreatit necə xəstəlikdir?

A) İmmuno - allergik
B) İrsi
C) İltihabi - distrofik
D) Endokrin
E) İltihabi

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 408

664) Sol döş qəfəsinə irradiasiya edən kəmərvari ağrı hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Xroniki hepatit
B) Kəskin hepatit
C) Kəskin pankreatit
D) Kəskin xolesistit
E) Öd daşı xəstəliyi

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 407

665) Pielonefrit zamanı xəstəliyin hansı dövründə ciddi yataq rejimi təyin edilir.

A) Təyin olunmur
B) Birinci 3 gün ərzində
C) Tam sağalana qədər
D) Kəskin dövründə
E) Bakteriuriya dövründə

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 424

666) Follekulyar anginanın diaqnostikası məqsədilə nə etmək lazımdır?

A) Bəlğəmin müayinəsi
B) Badamcıqlardan Löffler çöpünü aşkar etmək üçün yaxma götürmək
C) Elektokardioqramma
D) Qanın ümumi analizi
E) Qanın biokimyəvi analizi

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 529

667) Bağırsaq infeksiyası aşkar olunmuş ocaqda neçə gün karantin saxlanılır?

A) saxlanılmır
B) 7 gün
C) 23 gün
D) 14 gün
E) 21 gün

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 568

Sınaq iz ödənişsiz istifadə üçün

668) Uşaqlarda öd kisəsi və öd yollarının birgə iltihabı necə adlanır?

A) Xolesist
B) Öd yollarının diskineziyası
C) Enterokolit
D) Pankreatit
E) Xolesistoxolangit

Ədəbiyyat:A. A. Əyyubova. Uşaq xəstəlikləri. Bakı 2008. səh. 108

669) Uşaqlarda qanın bəd xassəli xəstəliyinə hansı aiddir?

A) Hemofiliya
B) Trombositopeniya
C) Anemiya
D) Leykoz
E) Hemorragik vaskulit

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 361

670) Yeni doğulmuşların nüvə sarılığı (bilirubin encefolopatiyası) zamanı hansı üzv zədələnir?

A) Mərkəzi sinir sistemi
B) Ağciyər
C) Ürək
D) Böyrək
E) Qaraciyər

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 187

671) Qızdırma, təngnəfəslik, öskürək hansı xəstəlik üçün xarakterdir?

A) Kəskin pnevmoniya
B) Kəskin bronxit
C) Bronxial astma
D) Kəskin faringit
E) Xroniki bronxit

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 162

672) Doğuş travması nəticəsində mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsinin əsas səbəbi nədir?

A) Hiperqlikemiya
B) Hiperkapniya
C) Hipoqlikemiya
D) Hipoproteinemiya
E) Hipoksiya

sınaq ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:: Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 120

673) Döşdə qalan südün sağılmasında məqsəd:

A) Hipoqalaktiyanın profilaktikası
B) Xəstəliyin profilaktikası
C) İmmunitetın artırılması ücün
D) Hipotrofiyanın profilaktikası
E) Südün azalması ücün

Ədəbiyyat:Y. P. Bisyarina. Uşaqların anatom - fizioloji xüsisiyyətləri. səh. 180

674) Yenidoğulan qızlarda sidik kanalının uzunluğu necə sm - dir?

A) 8 - 9
B) 3 - 4
C) 5 - 6
D) 1 - 2
E) 6 - 7

Ədəbiyyat:Y. P. Bisyarina. Uşaqların anatom - fizioloji xüsisiyyətləri. səh. 177

675) Yenidoğulmuş oğlan uşağında sidik kanalının uzunluğu neçə sm - dir?
A) 7 - 8
B) 1 - 2
C) 5 - 6
D) 9 - 10
E) 3 - 4

Ədəbiyyat:Y. P. Bisyarina. Uşaqların anatom - fizioloji xüsisiyyətləri. səh. 177

676) Yenidoğulmuşun ağız boşluğu nə ilə silinir?

A) Silinmir
B) Pambıq kürəciklə
C) Bintlə
D) Yaş pambıqla
E) Salfetlə

Ədəbiyyat:: Y. P. Bisyarina. Uşaqların anatom - fizioloji xüsisiyyətləri. səh. 160

677) Anadangəlmə ürək qüsurlarının əsas müalicəsi necə aparılır?

A) Hormonlarla
B) Cərrahi yolla
C) Vitaminlərlə
D) Diuretiklərlə
E) Ürək qlikozidləri ilə

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:: A. A. Əyyubova. Uşaq xəstəlikləri. Bakı 2008. səh. 218

678) Revmatik endokarditdə ürəkdə hansı qapaqlar zədələnir?

A) Mitral
B) Botal axacağı
C) Oval dəlik
D) Aortal
E) Pulmonal

Ədəbiyyat:: A. A. Əyyubova. Uşaq xəstəlikləri. Bakı 2008. səh. 228

679) Uşaqda arterial təzyqin aşağı olması nə ilə əlaqədardır?

A) Arteiyanın dar olması
B) Sol mədəciyin geniş, arteiyanın dar olması
C) Venaların dar olması
D) Sol mədəciyin kiçik, arteiyanın dar olması
E) Sol mədəciyin həmçinin kiçik, arteriyanın geniş olması

Ədəbiyyat:: Y. P. Bisyarina. Uşaqların anatom - fizioloji xüsisiyyətləri. səh. 132

680) Uşaqlarda döş kifozu necə aylıqda əmələ gəlir?

A) 8 - 9
B) 3 - 4
C) 10 - 11
D) 12 - 13
E) 6 - 7

Ədəbiyyat:Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 50

681) Südəmər uşaqlarda rinit zamanı tənəffüsün pozulması nə ilə müşahidə olunur?

A) Diarreya
B) Boğulma
C) Çəkinin azalması
D) Döş əmmənin çətinləşməsi
E) Qusma

Ədəbiyyat:: Y. P. Bisyarina. Uşaqların anatom - fizioloji xüsisiyyətləri. səh. 23

682) Larinqotraxeitin ağırlaşması nədir?

A) Qırtlağın genəlməsi
B) Plevrit
C) Otit
D) Qırtlağın stenozu
E) Bronxit
Ədəbiyyat:: Y. P. Bisyarina. Uşaqların anatom - fizioloji xüsisiyyətləri. səh. 21

sek.az ödənişsiz istifadə üçün

683) Uşaqlarda burun - udlaq keçəcəyinin iltihabı necə adlanır?

A) Laringit
B) Nazofaringit
C) Bronxit
D) Rinit
E) Traxeit

Ədəbiyyat:: Y. P. Bisyarina. Uşaqların anatom - fizioloji xüsisiyyətləri. səh. 21

684) Mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi zamanı ürək fəaliyyətini tənzimləmək üçün hansı istifadə olunur?

A) Korqlükon
B) Heparin
C) Kalsium
D) Kalium
E) Qlukoza

Ədəbiyyat:: Ə. Tağıyev. Neonatalogiya. səh. 467

685) Xəstə uşaqların dispanzerizasiyası nədir?

A) Sağlam uşaqların qeydiyyatı
B) Xəstə və risk qrupundan olan uşaqların qeydiyyata alınması
C) Xəstə uşaqların qeydiyyata alınması
D) Xəstəliklərin profilaktikası
E) Sağlam və risk qrupundan olan uşaqların qeydiyyatı

Ədəbiyyat:Səhiyyə Nazirliyi Əhalinin dispanzerizasiyası baradə. əmr 777 Bakı 1987 səh. 18

686) Uşaqlarda müxtəlif xəstəliklər zamanı toksikozun tez - tez baş verməsi nə ilə əlaqədardır?

A) Mədəaltı vəzin funksiyasının zəifliyi
B) Qaraciyərin dezintoksikasion funksiyasının zəifliyi
C) Qaraciyərin səthinin kiçik olmasıı
D) Mədənin sekretor funksiyasının zəifliyi
E) Qaraciyərin funksiyasının güclü olması

Ədəbiyyat:Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 77

687) Əməliyyatdan sonra alətləri yuyucu məhlulda neçə dəqiqə saxlamaq lazımdır?

A) 45
B) 30
C) 60
D) 5
E) 15

Ədəbiyyat:Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 284) N.P.Paleyev Bakı-1991

Sitat az ödənişsiz istifadə üçün

688) Hemotoraks zamanı qan hara yığılır?

A) Oynaq kapsuluna
B) Plevra boşluğuna
C) Qarın boşluğuna
D) Sidik kisəsinə
E) Toxumaların arasına

Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı. (səh 298) N.P.Paleyev Bakı-1991

689) Qanköçürmədən sonra tibb işçisi hansı göstəricilərə fikir verməlidir?

A) Diurez və temperatura
B) Nəbz və temperatura
C) A/T və temperatura
D) Nəbzə, A/T, diurezə və temperatura
E) Nəbz və arterial

Ədəbiyyat:: Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 352) N.P.Paleyev Bakı-1991

690) Hansı mərhələ infeksiyalaşmış yaranın 1-ci fazanı əks etdirir?

A) Epitelizasiya
B) Çapıqlaşma
C) Dehidratasiya
D) Regenerasiya
E) Hidrotasiya

Ədəbiyyat: Ümumi cərrahlıq. B.X.Abbasov Bakı-1987. (səh 317)

691) Elektrotravmalarda ilk görüləcək vacib tədbir hansıdır?

A) Spazmolitiklər vurmaq
B) Ağrıkəsici vurmaq
C) Cərəyanın təsirini kəsmək
D) Eufillin vurmaq
E) Aseptik sarğı qoymaq

Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı. (səh 573) N.P.Paleyev Bakı-1991

Sınaq odənişsiz istifadə üçün

692) Zədələnmələrdə hansı müddət ərzində soyuq qoymaq lazımdır?

A) 3 gün
B) 5 gün
C) 7 gün
D) 6 saat
E) 1 gün

Ədəbiyyat:: Tibb bacısının məlumat kitabı. (səh 351) N.P.Paleyev Bakı-1991

693) Tetanus əleyhinə zərdabın durulaşdırılmış dəri içi sınağı üçün işlədilən nisbəti:

A) 1:10
B) 1:50
C) 1:100
D) 1:500
E) 1:1000

Ədəbiyyat: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. (səh 150).

694) Yarada olan spesifik qoxunu azaltmaq üçün hansı antiseptik məhlul işlədilir?

A) Kalium permanqanat
B) Spirt
C) Yod
D) Gümüş nitrat
E) Furasillin

Ədəbiyyat:: Ümumi cərrahlıq.(səh 60) B.X.Abbasov Bakı-1987

695) Anaerob infeksiyaların törədiciləri hansılardır?

A) Stafilokoklar
B) Batsillər
C) Rikketsiyalar
D) Klostridilər
E) Streptokoklar

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. (səh 147).

696) Hipertonik imalə üçün natrium-xlorun neçə faizli məhlulu işlədilir:

A) 0, 5 %
B) 15 %
C) 10 %
D) 20 %
E) 2 %

Ədəbiyyat:Tibb bacısının məlumat kitabı. (səh 47) N.P.Paleyev Bakı-1991

snsr.az ödənişsiz istifadə üçün

697) Mədəyə zond salınarkən nə üçün püskürmə (aerozol) şəklində anesteziya etmək olmaz?

A) Zondu udarkən burula bilər
B) Udma və qusma refleksini zəiflədir
C) Burunla tənəffüsü çətinləşdirir
D) Qida borusunun əzələsini yumşaldır
E) Yuxarı tənəffüs yollarını çətinləşdirir

Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 65) N.P.Paleyev Bakı-1991

698) Mədənin zondlanmasında hansı anesteziya növündən istifadə olunur?

A) Ümumiyyətlə anesteziya olunmur
B) 3 %-li trimekainlə
C) 5 %-li sovkainlə
D) 10 %-li lidokainlə
E) 0, 5 %-li novokainlə

Ədəbiyyat:: Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 65) N.P.Paleyev Bakı-1991

699) İmalə üçün istifadə olunmuş ucluqlar istifadədən sonra nə edilir?

A) Yandırılır
B) Dezinfeksiya edilir
C) Salfetlə silinir
D) Sterilizasiyaya göndərilir
E) Axar su altlnda yuyulur

Ədəbiyyat:Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 46) N.P.Paleyev Bakı-1991

700) İmalə üçün istifadə olunan ucluqlar neçə faizli xloramin məhlulunda dezinfeksiya olunur?

A) 6 %-li
B) 1 %-li
C) 3 %-li
D) 5 %-li
E) 10 %-li

Ədəbiyyat:Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 47) N.P.Paleyev Bakı-1991

701) Qanköçürmədən sonra flakonda müayinə üçün saxlanılan qanın saxlanma müddəti nə qədərdir?

A) 12 saat
B) 2 saat
C) 6 saat
D) 24 saat
E) 48 saat

sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Ümumi cərrahlıq. (səh 175) B.X.Abbasov Bakı-1987

702) Anamnezində bu xəstəlikləri keçirmiş insanlar donor ola bilməz?

A) Orxit
B) Su çiçəyi
C) Hepatit
D) Qızılca
E) Qrip

Ədəbiyyat:Ümumi cərrahlıq.(səh 167) B.X.Abbasov Bakı-1987

703) Hansı dərəcəli yanıqlar dərin yanıqlara aid edilir?

A) III B - III A
B) III B - IV
C) I - III B
D) III A - II
E) IV - III A

Ədəbiyyat:: Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 281) N.P.Paleyev Bakı-1991

704) Yanıq xəstəliyinin 2-ci fazası necə adlanır?

A) Yanıq şoku
B) Toksemiya
C) Rekonvalensensiya
D) Regenerasiya
E) Septikotoksemiya

Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 284) N.P.Paleyev Bakı-1991

705) Ətraf amputasiya olunduqdan sonra qalan güdülə hansı sarğı qoyulur?

A) Qayıdan sarğı
B) Sapand şəkilli sarğı
C) Dezo sarğısı
D) Sünbülvari sarğı
E) Spiral sarğı

Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 310) N.P.Paleyev Bakı-1991

706) Mastit nəyin iltihabıdır?

A) Limfa düyünlərinin
B) Tər vəzilərinin
C) Piy vəzilərinin
D) Limfa damarlarının
E) Süd vəzisinin

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:Cərrahiyyə (səh 206) H.A.Sultanov.Bakı-1997

707) Əməliyyat tibb bacısı planlı əməliyyatlara hazırlıq məqsədilə neçə saat əvvəl əməliyyat otağında olmalıdır?

A) 30 dəq
B) 2 saat
C) 40 dəq
D) 3 saat
E) 1, 5 saat

Ədəbiyyat:Əməliyyat və sarğı tibb bacısının məlumat kitabı(səh 75) M.M.Abakumov.Moskva-1985

708) Biksi doldurmazdan əvvəl nə ilə silmək lazımdır?

A) Furasillinlə
B) Hidrogen peroksid məhlulu ilə
C) 0, 5 %-li naşatır spirti ilə
D) Kalium permanqanat məhlulu ilə
E) Brillyant yaşılı ilə

Ədəbiyyat:Əməliyyat və sarğı tibb bacısının məlumat kitabı(səh 45) M.M.Abakumov.Moskva-1985

709) Hansı əməliyyatlarda xəstəyə Trendelenburq vəziyyəti verilir?

A) Süd vəzinin əməliyyatlarında
B) Neyrocərrahi əməliyyatlarda
C) Döş qəfəsi orqanlarında
D) Qarın boşluğu orqanlarında
E) Düz bağırsaq və cinsiyyət orqanlarında aparılan əməliyyatlarda

Ədəbiyyat:: Əməliyyat və sarğı tibb bacısının məlumat kitabı(səh 19) M.M.Abakumov.Moskva-1985

710) Təzə yaranın xarakterizə edən kliniki simptomlar hansılardır?

A) Ödem,qızartı,temperatur
B) Ağrı, yara ağzının açıq olması və qanaxma
C) Ağrı, temperatur, qanaxma
D) Ağrı, qızartı, flüktuasiya
E) Qızartı, qızartı, iltibah

Ədəbiyyat:: Tibb bacısının məlumat kitabı(səh 342) N.P.Paleyev Bakı-1991

711) Sınıqları təsbit (fiksə) etmək üçün hansı sarğıdan istifadə olunur?

A) Tısbağavari

gnsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Spiral
C) Gips
D) Qayıdan sarğıdan
E) Sünbül şəkilli

Ədəbiyyat:: Tibb bacısının məlumat kitabı(səh 291) N.P.Paleyev Bakı-1991

712) Planlı əməliyyata xəstə bilavasitə nə vaxt hazırlanır?

A) Əməliyyatdan 3 gün əvvəl
B) Əməliyyatdan 4 gün əvvəl
C) Əməliyyatdan bir gün əvvəl və əməliyyat günü
D) Əməliyyatdan 5 gün əvvəl
E) Əməliyyatdan 7 gün əvvəl

Ədəbiyyat:: Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 317) N.P.Paleyev Bakı-1991

713) Qalxanabənzər vəzidə aparılan əməliyyat necə adlanır?

A) Splenoektomiya
B) Rezeksiya
C) Torakotomiya
D) Strumektomiya
E) Laparotomiya

Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 316) N.P.Paleyev Bakı-1991

714) Zimnitski sınağı üçün xəstəyə neçə qab verilir?

A) 5
B) 6
C) 4
D) 7
E) 8

Ədəbiyyat:Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 316) N.P.Paleyev Bakı-1991

715) Sağlam insan hansı yaş həddində qan donoru ola bilər?

A) 16-25
B) 17-50
C) 16-35
D) 18-65
E) 18-40

Ədəbiyyat:Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 2006-cı il 112 saylı qərarı

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

716) Tetanus əleyhinə anatoksin hansı məqsədlə işlədilir?

A) Passiv immunitet yaratmaq
B) Sepsisə qarşı
C) Ağrıları azaltmaq
D) İltihaba qarşı
E) Aktiv immunitet yaratmaq

Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 219) N.P.Paleyev Bakı-1991

717) Eventerasiya nədir?

A) Qarın boşluğu orqanlarının iltihabı
B) Bağırsaq möhtəviyyatının yaradan xaric olması
C) Bağırsaqlarda qazın yığılması
D) Bağırsağın burulması
E) Bağırsaq ilgəyinin və piyliyin əməliyyatdan sonra qarının ön divarından kənara çıxması

Ədəbiyyat:Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 324) N.P.Paleyev Bakı-1991

718) Əməliyyatda işlədilən sarğı materialı irinlə çirklənibsə nə etmək lazımdır?

A) 1 %-li soda məhlulunda 1 gün saxlayıb,təkrar istifadə etmək
B) Zibil qabına atmaq
C) 5 %-li lizol məhlulunda 6 saat saxlamaq
D) 3%-li xloramin məhlulunda saxlamaq
E) Yandırmaq

Ədəbiyyat:Əməliyyat və sarğı tibb bacısının məlumat kitabı(səh 99)
M.M.Abakumov.Moskva-1985

719) Qastroskopiya zamanı hansı anestetik məhluldan istifadə edilir?

A) 0, 5 %-li novakainlə anesteziya edilir
B) Anesteziya edilmir
C) Udlağa 1 %-li dikain məhlulu sürtülür
D) 0, 25 % novakain vurulur
E) 3 %-li trimekain vurulur

Ədəbiyyat: Əməliyyat və sarğı tibb bacısının məlumat kitabı(səh 152)
M.M.Abakumov.Moskva-1985

720) Sorulan sintetik saplara hansı saplar aid edilir?

A) Lavson
B) Kapron
C) Neylon
D) Dakron
E) Vikril

Yalnız ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:: Əməliyyat və sarğı tibb bacısının məlumat kitabı(səh 69)
M.M.Abakumov.Moskva-1985

721) Əməliyyat blokunda neçə qoruyucu zona vardır

A) 4
B) 2
C) 1
D) 3
E) 5

Ədəbiyyat:Əməliyyat və sarğı tibb bacısının məlumat kitabı(səh 4)
M.M.Abakumov.Moskva-1985

722) Toxumalar arasına qanın toplanması necə adlanır?

A) Teratoma
B) Osteoma
C) Qlioma
D) Mioma
E) Hemotoma

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev "Tibb bacısının məlumat kitabı". Bakı 1991. Səh 306.

723) Barmaqlarda əməliyyat zamanı tətbiq olunan yerli anesteziya hansıdır?

A) Vişnevski üsulu
B) Futlyar anesteziya
C) Onurğa beyni anesteziyası
D) Oberst-Lukaşeviç üsulu
E) İnfiltrasiya üsulu

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.279

724) Körpücük sümüyünün sınıqlarında hansı sarğı qoyulur?

A) Ləçək sarğısı
B) Tısbağavari sarğı
C) Spiral şəkilli sarğı
D) Dezo sarğısı
E) Sünbülvari sarğı

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 295

725) Döş qəfəsinin yaralanmalarında hermetiklik yaradan sarğı hansıdır?

A) Ləçək sarğısı
B) Dezo sarğısı
C) Gips sarğısı

Yalnız az ödənişsiz istifadə üçün

D) Okkluzyon sarğı
E) Bint sarğısı

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh 299.

726) Bərk sarğılara hansı sarğı aiddir?

A) Leykoplastırlı sarğı
B) Yapışqanlı sarğı
C) Kolloid sarğı
D) Gips sarğısı
E) Bint sarğıları

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 312

727) Flakonda qanın infeksiyalaşmasını göstərən əlamət hansıdır?

A) Plazma şəffafdır
B) Qan üç qatlı, plazma isə şəffafdır
C) Plazma sarı rəngdə, şəffaf
D) Plazma bulanlıq, fibrin lopalarla
E) Plazma çəhrayı rəngdə

Ədəbiyyat:: B.X.Abbasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 164

728) Resus amili qanın hansı elementində yerləşir?

A) Limfositlərlə
B) Eritrositlərdə
C) Trombositlərdə
D) Plazmada
E) Leykositlərdə

Ədəbiyyat:B.X.Abbasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 165

729) Narkozdan əvvəl xəstəyə premedikasiyanı kim təyin edir?

A) Feldşer
B) Həkim anesteziologq
C) Qəbul şöbəsinin həkimi
D) Anestezist tibb bacısı
E) Müalicə həkimi

Ədəbiyyat:: B.X.Abbasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 189

730) Yataq yaralarının profilaktikası üçün görülməyən tədbir hansıdır?

A) Yataq ağlarının ütülənməsi
B) Tənəffüs gimnastikası

ask.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Rezin halqanın qoyulması
D) Xəstənin çevrilməsi
E) Dərinin kamforalı spirtlə silinməsi

Ədəbiyyat:B.X.Abbasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 197

731) Kəsilmiş təzə yaranın ən təhlükəli simptomu hansıdır?

A) İltihab
B) Yara ətrafında suluqlar
C) İkincili nekroz
D) Qanaxma
E) Demarkasiya xətti

Ədəbiyyat:: B.X.Abbasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 312

732) Cərrahi əməliyyatlar zamanı drenajlar nə üçün qoyulur?

A) Qanaxmanı dayandırmaq üçün
B) Yaranı təftiş etmək üçün
C) Epitelizasiyanı sürətləndirmək üçün
D) Yara ifrazatını çıxarmaq üçün
E) Çapıq əmələ gəlməsi üçün

Ədəbiyyat:B.X.Abbasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 322

733) I-II dərəcəli termiki yanıq zamanı həkiməqədərki yardım hansıdır?

A) Süni ağ ciyər aparatına qoşma və ürəyin masajı
B) Antibiotiklər vurmaq
C) Tənəffüsü yaxşılaşdırmaq üçün analeptiklər vurmaq
D) Aseptik sarğı qoyub,təcili yardım çağırmaq
E) Yanıq sahəsindən yuxarıda turna qoymaq

Ədəbiyyat:: B.X.Abbasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 292

734) Limfadenit nəyin iltihabıdır?

A) Tər vəzilərinin iltibahı
B) Limfa düyünlərinin iltihabı
C) Tük follikulunun iltihabı
D) Oynaqların iltihabı
E) Piy vəzinin iltihabı

Ədəbiyyat:B.X.Abbasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 348

735) Yaş qanqrena zamanı ilk tibb yardım hansıdır?

A) Antibiotiklərdən istifadə etmək

sinif.az qənissiz istifadə üçün

B) Spirtli kompreslər qoymaq
C) Qanəvəzedici köçürmək
D) Kalium permanqanat məhlulu ilə vanna etmək
E) Təcili hospitalizə etmək

Ədəbiyyat:: B.X.Abbasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 459

736) Məhdud irinlik necə adlanır?

A) İnfiltrat
B) Fleqmona
C) Fistula
D) Yara
E) Abses

Ədəbiyyat:: B.X.Abbasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 339

737) Əməliyyatdan sonrakı dövr, neçə fazaya bölünür?

A) 2
B) 1
C) 5
D) 3
E) 4

Ədəbiyyat:B.X.Abbasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 194

738) Əməliyyatdan sonra xəstəyə qulluğun məqsədi nədir?

A) İkincili qanaxmanın qarşısını almaq
B) Rentgen və laborator müayinələrin aparılması
C) Əməliyyatdan sonrakı dövrün uzadılması
D) Yaranın infeksiyalaşmasının qarşısını almaq
E) Regenerasiya prosesini sürətləndirmək

Ədəbiyyat:B.X.Abbasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 196

739) Sınığı təsdiq edən əsas müayinə üsulu hansıdır?

A) Sistoqrafiya
B) Angioqrafiya
C) Füloroqrafiya
D) Rentgenoqrafiya
E) USM

Ədəbiyyat:: B.X.Abbasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 266

740) Qanın laxtalanma müddəti normada neçə dəqiqədir?

Sınaq azərbaycanlıqsız istifadə üçün

A) 1
B) 10
C) 8
D) 5
E) 15

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov,Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh.75

741) II dərəcəli donma üçün xarakterik əlamət hansıdır?

A) Dərinin hipiremiyası
B) Bütün dərinin nekrozu
C) Bütün toxuma qatlarının və sümüyün nekrozu
D) Epidermisin nekrozu və suluqların əmələ gəlməsi
E) Dəri səthinin avazıması

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 287.

742) Kəllə-beyin travmaları zamanı əsas simptom hansıdır?

A) Qıcolmalar
B) Temperaturun yüksəlməsi
C) Baş ağrıları
D) Huşun itməsi
E) Retroqrad amneziya

Ədəbiyyat:B.X.Abbasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh.228

743) Pnevmotoraks nədir?

A) Döş qəfəsinə irinin toplanması
B) Hamısı
C) Döş qəfəsinə qanın toplanması
D) Döş qəfəsinə havanın daxil olması
E) Döş qəfəsinə mayenin toplanması

Ədəbiyyat:: B.X.Abbasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 233

744) Yanığın ən geniş yayılmış növü hansıdır

A) Kimyəvi
B) Yuxarıda sadalananların hamısı
C) Termiki
D) Elektrik yanıqları
E) Şüa

Ədəbiyyat:B.X.Abbasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 293

745) Dəridə suluqların əmələ gəlməsi neçənci dərəcəli yanığa aiddir?

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) IV
B) I
C) III B
D) II
E) III A

Ədəbiyyat:B.X.Abbasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 292

746) Sınıqların repozisiyası harada və nə vaxt aparılmalıdır?

A) Istənilən yerdə və istənilən vaxt
B) Zərərçəkənin daşınma zamanı
C) Əməliyyat otağında və tez bir zamanda
D) Yaxındakı tibb məntəqəsində
E) Travma baş verdiyi yerdə

Ədəbiyyat:: B.X.Abbasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 268

747) Bazu oynağının çıxığında ilk tibbi yardım məqsədilə hansı şina qoyulur?

A) İlizarov şinası
B) Yelanski şinası
C) Diterixs şinası
D) Kramer şinası
E) Böeler şinası

Ədəbiyyat:B.X.Abbasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 266

748) Kəllə beyin travmaları zamanı ilk tibbi yardım göstərilərkən xəstə hansı vəziyyətdə olmalıdır?

A) Yarımoturaq vəziyyət verməli
B) Qulaq keçəcəyi yuyulmalıdır
C) Uzadılmış, başı yana əyilmiş vəziyyətdə
D) Burun boşluğu yuyulmalıdır
E) Xəstəyə oturaq vəziyyət verilməlidir

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 358

749) Donmalar zamanı ilk tibbi yardım nədən ibarətdir?

A) Qarla ovuşdurmaq
B) Spirtlə ovuşdurmaq
C) Termoizoləedici sarğı qoymaq
D) Yun parça ilə ovuşdurmaq
E) Vişnevski məlhəmi ilə sarğı qoymaq

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 287

Şəxsi ödənişsiz istifadə üçün

750) I, II dərəcəli termiki yanıqlar zamanı ilk tibbi yardım nədən ibarətdir?

A) Aseptik sarğı qoymaq
B) Suluqları kəsmək
C) Turna qoymaq
D) Vişnevski məlhəmi ilə sarğı qoymaq
E) Streptosid tozu səpmək

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 282

751) Uzunmüddətli sıxılma sindromu zamanı ilk tibbi yardım nədən ibarətdir?

A) Turna qoymaq və ətrafları isitmək
B) Sıxıcı sarğı qoymaq
C) Turna qoymaq və ətrafları soyutmaq
D) Antiseptiklərlə silib sarğı qoymaq
E) Okkulizion sarğı qoymaq

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 346

752) Açıq pnevmatoraks zamanı ilk tibbi yardım nədən ibarətdir?

A) Zərərçəkmişi süni tənəffüs aparatına qoşmaq
B) Dezo tipli sarğı qoymaq
C) Dəri altına 1%-li Morfin məhlulu yeritmək
D) Okkulizion sarğı qoymaq
E) Zərərçəkmişi arxası üstə uzatmaq

Ədəbiyyat:B.X.Abbasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 235

753) Qabırğaların sınığı zamanı xəstəni hansı vəziyyətdə daşımaq olar?

A) Arxası üstə uzadılmış
B) Oturaq
C) Sağlam tərəfə uzadılmış
D) Qarnı üstə uzadılmış
E) Yarımoturaq

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 305

754) Qanın maksimal saxlanma müddəti neçə gündür?

A) 28 gün
B) 7 gün
C) 14 gün
D) 16 gün
E) 21 gün

Ədəbiyyat:: B.X.Abbasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 163

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

755) Donor qanı soyuducuda hansı temperaturda saxlanmalıdır?

A) 4-6oC
B) +17, -20oC
C) 0, -15oC
D) -2, -0oC
E) 0, -2oC

Ədəbiyyat:: B.X.Abbasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 163

756) Aralıq nahiyyəsində hansı sarğı növündən istifadə olunur?

A) Sapandvari
B) Sünbülvari
C) Dairəvari
D) T-şəkilli
E) Spiralvari

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.307

757) Bərk sarğılara hansı sarğı növü aiddir?

A) Yapışqan plastik
B) Kleol
C) Gips
D) Kolloid
E) Torlu elastiki bint

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.312

758) Donor kimə deyilir?

A) Qan azlığı olan şəxsə
B) Qanaxmaya meyilli şəxsə
C) Qanını və ya orqanını digər insana verən şəxsə
D) Qan köçürülən şəxsə
E) İnfuzion maye köçürülən şəxsə

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 347

759) Resipient kimə deyilir?

A) Sağalan şəxsə
B) Qan köçürülən şəxsə
C) Qan itirməsi olan şəxsə
D) Qanaxmaya meyilli şəxsə
E) Orqan və ya qanını digər insana verən şəxsə

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.346

760) Aşağıdakı preparatlardan hansı narkozdan əvvəl premidikasiya məqsədilə mütləq işlədilməlidir?

A) Lidokain 1%
B) Analgin 50%
C) Novakain 0,5%
D) Atropin 0.1%
E) Fentanil 0,005%

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.314

761) Yumuşaq sarğılara hansı aiddir?

A) Kleol
B) Gips sarğısı
C) Borulu elastiki bint
D) Kramer şinası
E) İmprovizə olunmuş şinalar

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.308

762) Aşıq daban oynağının zədələnmələrində hansı sarğı qoyulur?

A) Spiralvari
B) Qayıdan
C) Tısbağavari
D) Sünbül
E) Səkkizvari

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.309

763) Travmalarda ilk yardım məqsədilə yuxarı ətraflara rahatlıq vermək üçün hansı sarğı növündən istifadə olunur?

A) Səkkizvari
B) Ləçəkvari
C) Sünbül
D) Dezo
E) Spiral

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.306

764) Orqanizmin soyuğa qarşı ilk reaksiyası özünü necə biruzə verir?

A) Temperaturun yüksəlməsi
B) Damarların spazmı
C) Ağrı

Şəxsəz ödənişsiz istifadə üçün

D) Spidermisin nekrozu
E) Suluqların olması

Ədəbiyyat:N.P.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.286

765) Filtirli bikslərdə olan sarğı materiallarını sterilizasiyadan sonra maksimum nə qədər saxlamaq olar?

A) 10 gün
B) 6 saat
C) 40 gün
D) 20 gün
E) 5 gün

Ədəbiyyat:S.A.Aqkatseva.Orta tibb təhsilində praktik vərdişlərin öyrədilməsi-1997 (səh.89)

766) Kraft-paketlərdən neçə dəfə istifadə etmək olar?

A) 7
B) 5
C) 10
D) 20
E) 2

Ədəbiyyat:S.A.Aqkatseva.Orta tibb təhsilində praktik vərdişlərin öyrədilməsi-1997 (səh.89)

767) Alətlərdə sterilizasiyadan əvvəl gizlin qanın olmasını hansı sınaqla yoxlayırlar?

A) Oberst
B) Mikulic
C) Zimnitski
D) Benzidin
E) Volkoviç

Ədəbiyyat:M.M.Abakumov.Moskva-1985(səh.60)

768) Jane şprisi hansı məqsədlər üçün işlədilir?

A) Əzələ daxili inyeksiyalar üçün
B) Dəri içi sınaq üçün
C) Vena daxili inyeksiyalar üçün
D) Boşluqları yumaq üçün
E) Dərialtı inyeksiyalar üçün

Ədəbiyyat:M.M.Abakumov.Moskva-1985(səh.31)

769) Dişlənmiş yaralarda ilkin olaraq tibb işçisi nə etməlidir?

A) Kip sarğı qoymaq

snsk.az ödənissiz istifadə üçün

B) 1%-li 1.0 ml promedol vurmaq
C) Yara kənarlarını yodla işləyib,aseptik sarğı qoymaq
D) Yaranı 1-li cərrahi işləmək
E) Antibiotik vurmaq

Ədəbiyyat:H.A.Sultanov.Bakı-1997 (səh.125)

770) Yağ tərkibli dərmanlar neçə dərəcəyə qədər qızdırılır?

A) 10º
B) 15º
C) 55º
D) 45º
E) 37º-38º

Ədəbiyyat:S.A.Aqkatseva.Orta tibb təhsilində praktik vərdişlərin öyrədilməsi-1997 (səh.156)

771) Troakar nə üçün işlədilir?

A) Paranefral blokada üçün
B) İntuabasiya
C) Sistoskopiya üçün
D) Duogenal zondlama üçün
E) Punksiya üçün

Ədəbiyyat:H.A.Sultanov.Bakı-1997 (səh.43)

772) Əməliyyatönü dövr hansı vaxtdan başlayır?

A) Xəstəxanaya daxil olan vaxtdan
B) Əməliyyat başlanan vaxtdan
C) Xəstəlik başlanan vaxtdan
D) Cərrahi şöbəyə daxil olan vaxtdan
E) Diaqnoz qoyulan vaxtdan

Ədəbiyyat:Ю.А.Нестеренко «Хирургические болезни». Москва «Медицина» 1983. Səh. 96

773) Panlı əməliyyatdan əvvəl təmizləyici imalə nə vaxt aparılır?

A) Əməliyyatdan əvvəlki gün axşam və əməliyyat günü səhər
B) İmalə olunmur
C) Əməliyyatdan 2 saat əvvəl
D) Əməliyyatdan 1 sutka əvvəl
E) əməliyat olunan gün səhər

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh.279

snsk.az-dən şsiz istifadə üçün

774) Təxirəsalınmaz əməliyyatdan əvvəl təmizləyici imalə nə vaxt aparılır?

A) Əməliyyatdan 2 saat əvvəl
B) Səhər, əməliyyat olunan gün
C) İmalə aparılmır.
D) Əməliyyatdan olunan gün
E) Əməliyyatdan 6 saat əvvəl

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh.279

775) Planlı əməliyyatdan əvvəl sanitar işlənmənin hansı növündən istifadə olunur?

A) Tam sanitar işlənmə
B) Sanitar təmizlənmə aparılmır
C) Hissəvi sanitar təmizlənmə
D) İmalə və əməliyyat sahəsinin işlənməsi
E) Dərinin silinməsi və ağların dəyişdirilməsi

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh.279

776) Fövqəladə əməliyyatdan əvvəl sanitar işlənmənin hansı növündən istifadə olunur?

A) Tam sanitar işlənmə
B) Sanitar işlənmə aparılmır
C) Dərinin silinməsi və ağların dəyişdirilməsi
D) Hissəvi sanitar işlənmə
E) Bağırsaqların və sidik kisəsinin boşaldılması

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh.279

777) Planlı əməliyyatdan əvvəl dərinin tüklərdən təmizlənməsi nə vaxt aparılır?

A) Əməliyyat otağında
B) Əməliyyat stolunda
C) Əməliyyatdan 1 sutka əvvəl
D) Səhər, əməliyyat olunan gün
E) Axşam vaxtı

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh.279

778) Növbəti gün saat 9.00- a planlaşdırılmış əməliyyat olunacaq xəstənin axırıncı qida qəbulu nə vaxt olmalıdır?

A) Əməliyyatdan əvvəlki gün saat 20.00 qədər
B) Əməliyyat günü, səhər yeməyi
C) Əməliyyatdan əvvəlki gün, nahar yeməyi
D) Əməliyyatdan əvvəlki gün saat 22.00
E) Əvvəlki gün ümumiyyətlə qida qəbul etmir

Sınaq üçün ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh.279

779) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə xəstə ilkin olaraq harada yerləşdirilir?

A) Xəstəxanadan çıxarılır
B) Təcrid palatasında
C) Reanimasiya şöbəsində və əməliyyatdan sonrakı palatada
D) Ümumi palatada
E) Operasion blokda

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 64

780) Toxumaların tikilməsi əməliyyatın hansı dövrü sayılır?

A) Müdaxilə
B) Operativ gediş
C) Əməliyyatın sonu
D) Əməliyyatdan sonrakı dövr
E) Əməliyyatın gedişi

Ədəbiyyat:Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982. Səh 101

781) Qarın boşluğu orqanlarında aparılan əməliyyat zamanı xəstəyə hansı vəziyyət verilir?

A) Böyrü üstə vəziyyət
B) Başın arxaya atılmış vəziyyəti
C) Qarnı üstə vəziyyət
D) Arxası üstə horizontal vəziyyət
E) Trendlenburq vəziyyəti

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh.279

782) Toxumaları aralayan alət hansıdır?

A) Farabef qarmağı
B) İtiuclu qayçı
C) Skalpel
D) Koxer sıxıcısı
E) Kəsici iynə

Ədəbiyyat:H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 244

783) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə sidik ləngiməsinə qarşı aparılan tədbir hansıdır?

A) Sidik kisəsinə kateter qoymaq
B) Vena daxilinə 5%-li qlükoza yeritmək
C) Sidikqovucular vermək
D) Qarnın aşağı hissəsinə soyuq qoymaq

sek.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Dərialtına 0,1%-li - 1,0 atropin yeritmək

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 280

784) Boğulmuş yırtıqlarda ilkin olaraq xəstəyə nə edilməlidir?

A) Xəstə təmizləyici imalə olumalıdır
B) Spazmolitik dərman preparatı vurulmalıdrır
C) Xəstənin mədəsi yuyulmalıdır
D) Xəstə təcili hospitalizə olunmalıdır
E) Yırtıq qapısından içəri salınmalıdır

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 244

785) Mədə-bağırsaq qanaxması zamanı həkimə qədər hansı yardım göstərilir?

A) Sakitlik, soyuq qoymaq, vikasol vurmaq, hospitalizə etmək
B) Analgetiklər, damargenəldicilər
C) Kalsi-xlor, ağrıkəsici preparatlar
D) Soyuq, smazmolitiklər
E) Ürək preparatları

Ədəbiyyat:: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». - М.: Медицина, 1982. Səh. 337

786) Hemorroidal qanaxma zamanı ilk yardım hansıdır?

A) Vanna etmək
B) Mədəni yumaq
C) Təcili hospitalizasiya etmək
D) Vikasol həbi qəbul etmək
E) Pəhriz

Ədəbiyyat:: H.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. Səh 226

787) Əllərin pervomurla işlənməsi zamanı 5 lt hazır işçi məhlulundan neçə nəfər istifadə edə bilər?

A) 20
B) 5
C) 15
D) 2
E) 40

Ədəbiyyat:В.И.Маслов «Малая хирургия» Москва «Медицина» 1988.səh.27.

788) Ürəyin qapalı massajı zamanı xəstənin uzadıldığı yer necə olmalıdır?

A) Yumşaq

snk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Yaylı çarpıda
C) Sərt
D) Nahamar
E) Maili

Ədəbiyyat:Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». - М.: Медицина, 1982. Səh. 121

789) Reanimasion tədbirlərin effektivlik əlaməti hansıdır?

A) Rəngin avazıması
B) Bəbəklərin genəlməsi
C) Periferik nəbzin olmaması
D) Yuxu arteriyasında nəbz vurğusunun olması, bəbəklərin daralması və sərbəst tənəffüsün bərpası
E) Döş qəfəsində ekskursiyanın olmaması

Ədəbiyyat:: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». - М.: Медицина, 1982. Səh 121

790) Kliniki ölüm vəziyyətindən çıxarmaq üçün əsas tədbirlər hansıdır?

A) Naşatır spirti iylədilir
B) Qanəvəzedici köçürülür
C) Tənəffüs yollarının keçiriciliyi bərpa olunur, təcili olaraq eyni vaxtda ürəyin qapalı massajı aparılır və süni tənəffüs verilir
D) Ağ ciyərin süni tənəffüs aparatına qoşulur
E) Ürəyin qapalı massajı aparılır

Ədəbiyyat:: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». - М.: Медицина, 1982. Səh 125

791) Yetkin şəxslərdə ürəyin vasitəli massajı zamanı döş qəfəsinə təzyiq necə aparılır?

A) Sol əlin ovucun proksimal hissəsinə sağ əlin ovcunu qoymaqla
B) Əlin 3 barmağı ilə
C) 2 əlin barmaqları ilə
D) Təkcə sağ əllə
E) Sol əlin bütün ovuc səthi ilə

Ədəbiyyat:: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». - М.: Медицина, 1982. Səh 124

792) Vena daxili infuziya zamanı hava emboliyasının qarşısını almaq üçün hansı profilaktik tədbir görülür?

A) Kiçik diametrli iynələrdən istifadə olunur
B) İti uclu iynələrdən istifadə olunur
C) Maye köçürüləcək damarlar dəyişdirilir

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

D) Sistemdən əvvəlcə hava qabarcıqları çıxarılır
E) Sistem və iynə steril olur

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh. 62

793) Təmizləyici imalə zamanı xəstə hansı vəziyyətdə olamalıdır?

A) Diz-dirsək vəziyyətində
B) Sol böyrü üstə və ayaqlar qarına yığılmış vəziyyətdə
C) Qarın üstə
D) Sağ böyrü üstə
E) Arxası üstə

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh.41

794) Köçürülən qan hansı dərəcəyə qədər isidilməlidir?

A) 40-41o
B) 42-44o
C) 37-38o
D) 33-35o
E) 38-40o

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh. 315

795) Buz qovuğu əməliyyat sahəsində nə qədər saxlanmalıdır?

A) 25 dəqiqə
B) Buz əriyənə qədər
C) 30 dəqiqə
D) 1 saat
E) 45 dəqiqə

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh. 287

796) Venadan qan götürərkən turna nə vaxt açılır?

A) Venapunksiyadan sonra
B) 3 dəqiqə sonra
C) İynəni çıxardıqdan bir neçə dəqiqə sonra
D) İynəni çıxarmamışdan qabaq
E) İynəni çıxarandan sonra

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh. 28

797) Hidronit əmələ gəlməsində risk faktoru hansıdır?

A) Şəxsi gigiyenaya riayət etməmək
B) Çoxlu maye qəbulu

sesk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Çox miqdarada qida qəbulu
D) Dəridə quruluq
E) Hipervitaminoz

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 135

798) Bu patologiyaların hansında tetanus əleyhinə zərdab və anatoksin vurulur?

A) Sarğı nahiyəsinin absesində
B) Bazunun çıxığında
C) Başın yumşaq toxumalarının yaralanmalarında
D) Kəskin irinli plevritdə
E) Bazu boynunun qapalı sınığında

Ədəbiyyat:H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 150

799) Kəsilmiş yara üçün hansı xarakterikdir?

A) Daxili qanaxma
B) Yara kanalının uzun və dar olması
C) Yara ağzının kənarlarında hematomaların olması
D) Yara ağzının girintili-çıxıntılı olması
E) Yara ağzının kənarlarının hamar olması

Ədəbiyyat:H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 124

800) Endoskopik müayinədən əvvəl hansı anesteziya növündən istifadə olunur?

A) Xloretil ilə anesteziya
B) İnfiltrasion anesteziya
C) Peridural anesteziya
D) Regionar anesteziya
E) Sürtməklə yerli anesteziya

Ədəbiyyat:: B.Q. Steçyuk.Sestrinskoe delo v xirurqii Moskva izdatelskiy dom QEOTAP-MED 2001. Səh. 179

801) Əməliyyatdan sonrakı gün cərrahi yaranın ilkin sarğısı necə aparılır?

A) Tikişlərin bir qisminin sökülməsi
B) Yara hidrogen peroksid H2O2 məhlulu ilə işlənir
C) Drenajla yaranın yuyulması
D) Yara yodonatla işləndikdən sonra quru aseptik sarğı qoyulur
E) Yara üzərinə məlhəm qoyulur

Ədəbiyyat:: B.X.Abbasov. “Ümumi cərrahlıq”. Bakı 1985. Səh. 196

Sınaq üçün istifadə ödənişsiz

802) Yaralanma zamanı həkimə qədər göstərilən ilkin tibbi yardım hansıdır?

A) Qanaxmanın dayandırılması və məlhəmli sarğının qoyulması
B) Antibiotiklərin yeridilməsi
C) Qanaxmanın dayandırılması və gips sarğısının qoyulması
D) Ağrıkəsicinin vurulması, qanaxmanın dayandırılması və aseptik sarğı qoyulması.
E) Hipertonik məhlulun qoyulması

Ədəbiyyat:H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 128

803) Ağciyər qanaxmasında xəstəni hansı vəziyyətdə daşımaq olar?

A) Yarım oturaq
B) Böyrü üstə uzanmış
C) Qarnı üstə uzanmış
D) Arxası üstə uzanmış
E) Ayaqlar yuxarı qaldırılmış vəziyyətdə

Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh. 512

804) Yuxu arteriyası zədələnərsə qanaxmanı necə saxlamaq olar?

A) Yaraya qan saxlayıcı alət qoymaqla
B) Yaranın üzərinə sıxıcı sarğı qoymaqla
C) Yaranı tamponada etməklə
D) Boyna jqut qoymaqla
E) Yuxu arteriyasını baş barmaqla VI boyun fəqərəsinin köndələn çıxıntısına sıxmaqla

Ədəbiyyat: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 77

805) Qida borusunun kimyəvi preparatla yanığında ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?

A) Kimyəvi preparatı zərərsizləşdirən maddə içirdilir
B) Zərərçəkən qusdurulur
C) Süd içirdilir
D) Mədə ilıq su ilə yuyulur və ağrı kəsici preparat vurulur
E) Heçnə edilmir

Ədəbiyyat: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 121

806) Nəqliyyat şinalarından hansı məqsədlə istifadə edilir?

A) Qanaxmanı saxlamaq məqsədi ilə
B) Çıxıqları yerinə salmaq məqsədi ilə
C) Zərərçəkmişi daşımaq məqsədi ilə
D) Zədələnmiş nahiyyəni immobilizə etməq məqsədi ilə
E) Sınıqları müalicə etmək məqsədi ilə

Ədəbiyyat: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 110

smsc.az ödənişsiz istifadə üçün

807) Çıxıqlar zamanı göstərilən ilk tibbi yardım hansıdır?

A) oynağa isti kompres qoyulur
B) Oynağa aseptik sarğı qoyulur
C) Oynağa gips sarğısı qoyulur
D) Çıxmış oynaq yerinə salınır
E) Ətraf fiksasiya olunur, ağrıkəsici preparat verilir, oynağa soyuq kompres qoyulur

Ədəbiyyat:H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 104

808) Aşağı çənənin çıxığında oynağı fiksasiya etmək üçün hansı sarğı növündən istifadə olunur?

A) Qayıdan sarğıdan
B) Sapandvari sargi
C) Səkkizvari sarğıdan
D) Yüyəntipli sarğıdan
E) Spiralvari sarğıdan

Ədəbiyyat: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 103

809) Tısbağavari sarğı hansı nahiyələrə qoyulur?

A) Aşıq-daban oynağına
B) Bazu oynağına
C) Diz və dirsək oynaqlarına
D) Boyuna
E) Ayağa

Ədəbiyyat: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 109

810) Sapandvari sarğını hansı nahiyələrə qoyurlar?

A) Dizə, dirsəyə
B) Buruna, çənəyə, başa
C) Gövdəyə
D) Boyuna,ələ
E) Gözə,qulağa

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı.Çıraq nəşriyyatı 2008. səh.276.

811) İsti hava axını ilə işləyən quruducu şkafda optimal t°-nə qədər olmalıdır?

A) 100-120°
B) 160-180°
C) 150-160°
D) 120-140°
E) 180-220°

unik.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:V.P.Abakumov. “Əməliyyat və sarğı tibb bacısının məlumat kitabı”. Moskva 1985. Səh 42

812) Sterilləşdirilmiş tikiş sapları işlədilənə qədər necə saxlanılır?

A) Süleymani məhlulunda
B) Briliant yaşılında
C) Pervomurda
D) 70°-li etil spirtində
E) Yodonatda

Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 32

813) Dezinfeksiya nədir?

A) Bütün mikrobların hətta sporəmələgətirənlərin məhv edilməsi
B) Bütün mikrobların,virusların məhv edilməsi
C) Mikrobların yaraya düşməsinin qarşısının alınması
D) Patogen mikrobların zərərsizləşdirilərək məhv edilməsi
E) Yarada olan mikrobların məhv edilməsi

Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 182

814) Sterilizasiya nədir?

A) Mikrobların yaraya düşməsinin qarşısının alınmasıdır
B) Mikrobların yarada məhvidir
C) mikrobların yaraya düşmə yollarında məhvidır
D) Paatogen mikroqanizmlərin məhvidir
E) Bütün mikrobların sporları ilə məhvidir

Ədəbiyyat:H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 29

815) Antiseptika nədir?

A) Mikrobların yaraya düşmə yollarında məhvidir
B) Alətlərin sterilizasiyasıdır
C) Alətlərin dezinfeksiyasıdır
D) Yaradakı mikrobların məhvidir
E) Patogen mikrobların məhvidır

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 241

816) Aseptika nədir?

A) Alətlərin sterilizasiyası
B) Yaradakı mikrobların məhv olunması tədbirləri kompleksi
C) Patogen mikrobların məhvi deməkdir
D) Alətlərin dezoinfeksiyası

ask.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Mikrobların yaraya düşməsinin qarşısını alan profilaktik tədbirlərdir

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 241

817) Yetkin insanlarda sınıq nahiyəsində yaranmış hematoma sahəsini blokada etmək üçün neçə faizli və nə qədər novakain işlədilir?

A) 1%-li 150 ml
B) 0.25%-li 50 ml
C) 2%-li 100 ml
D) 1%-li 30-50 ml
E) 0.5%-li 20 ml

Ədəbiyyat:V.İ.Maslov.Kiçik cərrahlıq.Moskva-1988.Səh(35)

818) Tez bərkiməsi üçün gipsli langeti hansı temperaturlu suda islatmaq lazımdır?

A) İlıq suda
B) Qliserin qatılmış suda
C) Fərqi yoxdur
D) Bitki yağı tökülmüş suda
E) Soyuq suda

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 259

819) Bud sınıqlarında neçə qatlı langet hazırlamaq lazımdır?

A) 3-4 qatlı
B) 10-12 qatlı
C) 9-10 qatlı
D) 1-2 qatlı
E) 2-3 qatlı

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 259

820) Biksin universal yığımı necə olmalıdır?

A) Bir əməliyyat üçün lazımolan satğı materiallrı,əməliyyat ağları və əməliyyatın iştirakçılarının paltarları bir biksə yığılır
B) Bir neçə əməliyyat a lazım olan sarğı materialları, əməliyyat ağları və iştirakçıların paltarları bir biksə yığılır
C) Bir əməliyyatda lazım olan ancaq sarğı materialları bir biksə yığılır
D) Sarğı otağına lazım olan bütün materiallar bir biksə yığılır
E) Əməliyyat ağları və iştirakçıların paltarları bir biksə yığılır

Ədəbiyyat:M.C.Брукман «Руководство к практическим занятиям по хирургии». M:Медицина 1983. Səh. 32

psk.az ödənişsiz istifadə üçün

821) Qanın uyğunlaşma sınağı planlı hemotransfuziya zamanı necə aparılır?

A) Donorun qanı üzərinə resipientin qanı tökülür
B) Resipientin qan zərdabı ilə donorun qanı qarışdırılır
C) Donorun qan damarına resipientin qanı vurulur
D) Donorun və resipientin qan zərdabları qarışdırılır
E) Donorun qanı üzərinə resipientin zərdabı tökülür

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh. 314

822) Şüa yanıqları zamanı ilk tibbi yardım necə başlanılır?

A) Zərərçəkənə ürək dərmanları verilir
B) Zərərçəkənə ağrıkəsici öreparat verilir
C) Şüalanmış sahə çoxlu miqdarda soyuq su ilə yuyulur
D) Şüalanmış sahənin üzərinə məlhəm qoyulur
E) Şüalanmış sahə aseptik sarğı ilə örtülür

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 120

823) Yalnız bir sarğı otağı varsa yaraların sarınma ardıcıllığı necə olmalıdır?

A) Əvvəlcə təmiz sonra isə irinli yaralara sarğı əməliyyatı aparılır
B) Təmiz və irinl yaralar eyni vaxtda sarınır
C) Irinli yaralar palatada sarğı əməliyyatından keçirilir
D) Əvvəl irinli sonra təmiz yaralar sarınır
E) Ardıcıllığa riayət olunmur

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 45

824) Arterial turna düzgün qoyulduqda nə baş verir?

A) Turnadan aşağı nahiyədə nəbz vurur
B) Qanaxma dayanır və periferik nəbz itir
C) Turnadan aşağı nahiyədə temperatur yüksəlir
D) Ətraf sianozlaşır
E) Turnadan aşağı nahiyədə bütün hissiyat itir

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 77

825) Qarnın ön divarı yaralanmış zərərçəkəni necə daşımaq məqsədə uyğundur?

A) Zərərçəkən arxası üstə uzanmış, ayaqlar qarına yığılmış vəziyyətdə daşınır
B) Zərərçəkən başıaşağı, ayaqları yuxarı qaldırılmış vəziyyətdə daşınır
C) Arxası üstə uzanmış və ayaqlarını uzatmış vəziyyətdə daşınır
D) Zərərçəkən qarnıüstə uzanmış vəziyyətdə daşınır
E) Zərərçəkən böyrü üstə uzanmış vəziyyətdə daşınır

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 128

Şəxsi və ödənişsiz istifadə üçün

826) Döş qəfəsi yaralanmaları zamanı hansı hermetik sarğıdan istifadə edilir?

A) Yapışqan plastrli
B) Okklüziya edici
C) Gips
D) Bint
E) Ləçəkvari

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 197

827) Qış fəslində Esmarx turnasının saxlanma müddəti nə qədərdir?

A) 45 dəqiqə
B) 1-1,5 saat
C) 3 saat
D) 0,5 saat
E) 2 saat

Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 77

828) Yerli anesteziyanın üstün cəhətləri hansılardır?

A) Hemodinamikaya nəzarəti asanlaşdırır.
B) Ürəyin fəaliyyətini artırır
C) Uzunmüddətli əməliyyat önü hazırlıq lazım deyil
D) Tənəffüs pozğunluqları zamanı istifadə oluna bilər.
E) Tənəffüs orqanlarının fəaliyyətini artırır.

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 58

829) İnfiltrasion anesteziyada hansı preparatdan istifadə edilir?

A) Novakain 0,5-0,25%
B) Dikain 0,25%
C) Sofkain 1%
D) Lidokain 10%
E) Novakain 2%

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 60

830) Onurğa beyin anesteziyasından sonra xəstənin daşınması hansı vəziyyətdə olmalıdır?

A) Yeritməklə
B) Arxası üstə uzanmış və başı yana əyilmiş vəziyyətdə
C) Qarnı üstə uzanmışvəziyyətdə
D) Yarımoturaq vəziyyətdə
E) Böyrüüstə uzanmış vəziyyətdə

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 62

sesli.az ödənişsiz istifadə üçün

831) Əməlyyat ağlarının steriliyinə ən dəqiq nəzarət üsulu hansıdır?

A) kimyəvi üsulla nəzarət
B) Texniki nəzarət
C) Fiziki üsulla nəzarət
D) Bakterioloji nəzarət
E) Bioloji müayinə üsulu

Ədəbiyyat:H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 29

832) Sterilizasiyanın fiziki üsuluna hansı aiddir?

A) Antibiotiklərdən istifadə etmək
B) 70o-li etil spirtində saxlamaq
C) 6%-li hidrogen-peroksid məhlulunda saxlamaq
D) Formalik buxarı ilə təsir etmək
E) Avtoklavlaşdırma

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 30

833) Əməliyyat sahəsinin işlənməsində hansı antiseptik məhluldan istifadə olunur?

A) Kalium-permanqanat məhlulu
B) 10%-li natrium-xlorid
C) Hidrogen-peroksid
D) Pervomor
E) Yodonat

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 21

834) Əllərin işlənməsində hansı antiseptik məhluldan istifadə edilir?

A) Formalin
B) Benzoy turşusu
C) Pervomur (C-4)
D) Brilliyant yaşılı
E) Lyuqol məhlulu

Ədəbiyyat:: В.Г.Стецюк «Сестринское дело в хирургии». Səh. 46

835) Tikiş materialını yağsızlaşdırmaq üçün hansı məhlulda saxlayırlar?

A) Efir
B) Karbol turşusu
C) 3%-li hidrogen peroksid
D) 5%-li yodun spirtli məhlulu
E) Pervomur

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 32

sınaq üçün istifadə üçün

836) Quruducu şkafda sterilizasiyaya nəzarət üçün nədən istifadə olunur?

A) Benzoy turşusu
B) Aspirin
C) Nişasta
D) Kükürd
E) Tiomoçevina

Ədəbiyyat:Y.A.Nesterenko “Cərrahi xəstəliklər”. Moskva 1983. Səh. 42

837) Halloidlər qrupuna hansı aiddir?

A) Hidrogen-peroksid
B) Furasilin
C) Yodonat
D) Metilen abısı
E) Brilliyant yaşılı

Ədəbiyyat:H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 21

838) Arterial qanaxma üçün xarakterik əlamət hansıdır?

A) Qanın daxilə axması
B) Nəbzvari al rəngdə qanın axması
C) Qanın yara səthinin örtməsi
D) Qanın yavaş axması
E) Qanın damcı ilə axması

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 73

839) Daxili qanaxmanın xarakter əlaməti hansıdır?

A) Dəri örtüyünün avazıması
B) Temperaturun yüksəlməsi
C) Arterial təzyiqin artması
D) Dərinin hiperemiyası
E) Diurezin çoxalması

Ədəbiyyat:H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 73

840) Arterial qanaxmanın müvəqqəti dayandırılmasında hansı üsuldan istifadə olunur?

A) Buz qovuqcuğunun qoyulması
B) Damar protezinin qoyulması
C) Damara tikilməsi
D) Ətrafa yuxarı vəziyyətin verilməsi
E) Damarların sklet sümüklərinə sıxılması

Ədəbiyyat:H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 76

Şəxsi və ödənişsiz istifadə üçün

841) Onkologiyada ən etibarlı diaqnostik üsul hansıdır?

A) Histoloji
B) Perkusiya
C) USM-Ultra səs müayinəsi
D) Endoskopik
E) Rentgenoloji

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 165

842) Metastaz nədir?

A) Şişin yayılması
B) Şişin böyüməsi
C) Şişin parçalanması
D) Şişin böyüməməsi
E) Şişin geriyə inkişafı

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 163

843) Bədxassəli şişlərin radikal müalicəsi hansı mərhələdə mümkündür?

A) I-II
B) II-III
C) III-IV
D) III
E) IV

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 163

844) Kalkulyoz xolesistitdə ağrı necə başlayır?

A) Sağ qabırqaaltında qəfləti ağrılarla
B) Sağ qabırğaaltında daimi ağrılarla
C) Göbək nahiyəsində küt ağrılarla
D) Sol qalça nahiyəsində küt ağrılarla
E) Sağ qalça çuxurunda qəfləti ağrılarla

Ədəbiyyat:H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 234

845) Plantoqrafiya üsulu ilə nəyi öyrənirlər?

A) Yastı pəncərələri
B) Ağ ciyərlərin həyat tutumunu
C) Ətrafların ölçülərini
D) Su-duz balansını
E) Köklük dərəcəsini

Ədəbiyyat::A.A.Mixaylov.Feldşerin məlumat kitabı 2-ci cild.Moskva-1990.Səh(67)

Şəxsi əl ödənişsiz istifadə üçün

846) Mexaniki antiseptikaya aiddir:

A) Yaraların I-li cərrahi işlənməsi
B) Yaraya sarğı qoyulması
C) Yaraya bakteriofaq vurmaq
D) Yaraların spirtlə dezinfeksiyası
E) Eyni qrupdan qan köçürmək

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 343

847) Uzunmüddətli sıxılma sindromu zamanı ilk yardıma aid olmayan əlamət hansıdır?

A) Sedadiv maddələrin təyini
B) Ətrafların qızdırılması
C) Zədələnmiş ətrafın immobilizasiyası
D) Ağrısızlaşdırıcı maddələrin təyini
E) Turnanın qoyulması

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 344

848) Yumşaq toxumaların zədələnməsində ilk yardım hansıdır?

A) Soyuq və aseptik sarğı qoymaq
B) İsti qoymaq
C) Masaj etmək
D) Kəsik aparmaq
E) Kompress etmək

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.366

849) Körpücük sümüyü zədələnmələrində hansı sarğıdan istifadə olunur?

A) Sürünən sarğı
B) Tısbağavari sarğı
C) Səkkizvari sarğı
D) Dezo sarğısı
E) T-şəkilli sarğı

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 298

850) Çanaq zədələnmələri zamanı xəstə hansı vəziyyətdə daşınmalıdır?

A) Qarın üstə
B) Arxası üstə
C) Qurbağa vəziyyəti
D) Yarım oturmuş
E) Üzü üstə

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 300.

Sınaq üçün istifadə ödənişsiz

851) Tısbağavari sarğı yuxarı ətrafın hansı zədələnmələrində qoyulur?

A) Ələ
B) Bazu nahiyyəsinə
C) Mil bilək oynağı nahiyyəsinə
D) Dirsək nahiyyəsinə
E) Barmaqlara

Ədəbiyyat:N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 310

852) "Diterixs" şinası ilk yardım kimi hansı sınıqlarda qoyulur?

A) Qabırğa sınıqlarında
B) Aşağı ətraf sınıqlarında
C) Onurğa sınıqlarında
D) Çanaq sınıqlarında
E) Yuxarı ətraf sınıqlarında

Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 312

853) Sınıqlar zamanı şokun profilaktikası üçün həkimə qədər ilk yardım zamanı nə etmək olmaz?

A) Qanaxmanı dayandırmaq
B) Xəstənin immoblizasiyası
C) Xəstəni hərəkət etdirmək
D) Ağrıkəsicilərin tətbiqi
E) Soyuq qoymaq

Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 289

854) Diz oynağının əzilməsində ilk yardım hansıdır?

A) Maye içizdirmək
B) Hərəkət etdirmək
C) Massaj etmək
D) Soyuq və sıxıcı sarğı qoymaq
E) Isti qoymaq

Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 301

855) Aşağı ətrafların borulu sümüklərinin sınığı zamanı hadisə yeridə ilk yardım nədən ibarətdir?

A) Xəstəyə qurbağa vəziyyəti vermək
B) Narkotik vurmaq
C) Ətrafı nəqliyyat şinası ilə immobilizasiya
D) Sınıq nahiyyəsinin ağrısızlaşdırmaq
E) Sınıq fraqmentlərinin repozisiyası

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 301

856) Hansı sarğı növü paltar və ayaqqabı üzərindən qoyulur?

A) Nəqliyyat şinası ilə sarğılar
B) Yapışqanlı sarğılar
C) Plastırlı sarğılar
D) Gips sarğıları
E) Bint sarğıları

Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 312

857) Qanəvəzediciləri köçürülərkən hansı fəsadlar törənir?

A) Yerli reaksiya
B) Sadalananların hamısı
C) Toksiki reaksiya
D) Allergik reaksiya
E) Pirogen reaksiya

Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 354

858) Bioloji antiseptikaya hansı aiddir?

A) Yaraların I-li cərrahi işlənməsi
B) Zərdabların vurulması
C) Drenajların qoyulması
D) Sulfanilamidlərdən istifadə
E) Hidrogen-peroksiddən istifadə

Ədəbiyyat: H.Sultanov. “Cərrahiyyə”. Səh. 19

859) Fiziki antiseptikaya hansı aiddir?

A) Yaraların drenajlanması
B) Zərdablardan vurulması
C) Antibiotiklərin vurulması
D) Yaraların spirtlə işlənməsi
E) Furasillindən istifadə

Ədəbiyyat: H.Sultanov. “Cərrahiyyə”. Səh. 19

860) Əl barmaqlarının zədələnmələri zamanı hansı sarğı növündən istifadə olunur?

A) İlanvari
B) Tısbağavari
C) Sünbülvari
D) Xaçvari
E) Cəngavər əlcəyi

Sərbəst az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:: H.Sultanov. “Cərrahiyyə”. Səh. 97

861) Diz oynağının zədələnməsi zamanı hansı sarğı qoyulur?

A) Sürünən sarğı
B) Səkkizvari sarğı
C) Tısbağavari sarğı
D) Spiralvari sarğı
E) T-şəkilli sarğı

Ədəbiyyat:: H.Sultanov. “Cərrahiyyə”. Səh. 97

862) Təxirəsalınmaz əməliyyatdan əvvəl sanitar işlənmə harada aparılır?

A) Əməliyyatdan əvvəl sanitar otağında aparılır
B) Bir gün əvvəl aparılır
C) Əməliyyat stolunda aparılır
D) Əməliyyat ərəfəsində aparılır
E) Aparılmır

Ədəbiyyat:: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.

863) Bint sarğısı qoymazdan əvvəl tibb işçisi nəyə nəzər yetirməlidir?

A) Nəbzin sayına
B) Bədənin hərarətinə
C) Patoloji prosesin xarakterinə
D) Arterial təzyiqə
E) Tənəffüs aktlarının sayına

Ədəbiyyat:: H.Sultanov. “Cərrahiyyə”.1997 Səh. 97

864) Inhalyasion anesteziyada dərman maddələri hara yeridilir?

A) Dəri altına
B) Selikli qişalara
C) Dil altına
D) Əzələ daxilinə
E) Tənəffüs yollarına

Ədəbiyyat:: Н.В.Барыкина «Травматология для медицинских колледжей», Феникс, 2007 стр-207

865) Punksiya nədir?

A) Boşluqların, orqan və toxumaların yoğun iynə və ya troakarla deşilməsi
B) Boşluqlara,orqan və toxumalara rezin borunun yeridilməsi
C) Boşluqlu orqanlara süni fistulanın qoyulması
D) Dərman maddələrinin periferik venalara yeridilməsi

sor.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Dərin yaraların və boşluqların antiseptik maddələrlə yuyulması

Ədəbiyyat:Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.101

866) Qastrostoma ətrafındakı dərini qorumaq məqsədi ilə nədən istifadə olunur?

A) Lassar pastası
B) Brilliyant yaşılı
C) Kamfora spirti
D) Vazelin yağı
E) Yod

Ədəbiyyat:: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.403

867) Kolostomalı xəstələrdə meteorizmin qarşısını almaq məqsədilə tibb işçisi xəstəyə nəyi məsləhət görür?

A) Süd məhsullarının qəbulu
B) Ədviyyatlı qidaların qəbulu
C) Hisə verilmiş qidaların qəbulu
D) Aktivləşmiş kömürün qəbulu
E) Mineral suların qəbulu

Ədəbiyyat:: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.373

868) Əməliyyat sahəsi nə ilə işlənilir?

A) 5%-li kalium permanqanat
B) 96%-li spirt
C) 0.5%-li xlorheksidin biqlyukonat
D) 33%-li hidrogen peroksid
E) 1:5000 furasilin

Ədəbiyyat:Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.97

869) Immobilizasiya nədir?

A) Bədənin zədələnmiş hissəsini hərəkətsizləşdirmək
B) Zədənənmiş nahiyəyə buz qoymaq
C) Zədənənmiş nahiyədə əməliyyat aparmaq
D) Zədələnmiş nahiyəyə dərman maddəsini yeritmək
E) Zədənənmiş nahiyədə sklet dartması həyata keçirmək

Ədəbiyyat:Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикum» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.179

snk.az ödənişsiz istifadə üçün

870) Nəqliyyat immobolizasiyasında nədən istifadə olunmur?

A) Pnevmatik şina
B) Kramer şinası
C) Ləçəkvari sarğı
D) Diterixs şinası
E) Beler şinası

Ədəbiyyat:: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.174

871) Sorulmayan sintetik tikiş materialı hansıdır?

A) Ketqut
B) Poliqlekapron
C) Tantal
D) Lavsan
E) İpək

Ədəbiyyat:: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.118

872) Sorulan təbii tikiş materialı hansıdır?

A) Ketqut
B) İpək
C) Lavsan
D) Neylon
E) Poliester

Ədəbiyyat:: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.118

873) Hansı sorulan sintetik saplar oftalmologiyada istifadə olunur?

A) Poliqlekapron
B) Dakron
C) Ketqut
D) İpək
E) Neylon

Ədəbiyyat:: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.118

874) Toxumanı kəsən alətlərə nə aiddir?
1. Skalpel
2. Pinset
3. Qayçı
4. Kornsanq
5. Mişar

sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

6. Payer jomu

A) 3,4,5
B) 2,3,6
C) 2,4,6
D) 1,2,4
E) 1,3,5

Ədəbiyyat:Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.119

875) Təsadüfi yaraların cərrahi işlənməsində hidrogen peroksidin neçə faizli məhlulundan istifadə olunur?

A) 33%
B) 6%
C) 30%
D) 10%
E) 3%

Ədəbiyyat:Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.23

876) Bioloji antiseptikaya nə aiidir?
1. Antibiotiklər
2. Səthi-aktiv maddələr
3. Vaksinlər
4. Immunoqlobulinlər
5. Oksidləşdiricilər
6. Turşular

A) 1,3,4
B) 1,3,6
C) 3,2,5
D) 1,2,6
E) 2,4,5

Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.24

877) Kimyəvi antiseptikada nədən istifadə olunur?
1. Spirtlər
2. Vaksinlər
3. Səthi aktiv maddələr
4. Antibiotiklər
5. Oksidləşdiricilər
6. Proteolitik fermentlər

A) 1,3,5
B) 3,5,6
C) 2,4,6

snk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) 1,2,6
E) 1,4,6

Ədəbiyyat:: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.22

878) Cərrahi metal alətlərin sterilizasiyasının daha mükəmməl üsulu hansıdır?

A) Yandırmaq
B) Avtoklav
C) Formalin buxarı sterilizasiya etmək
D) Qaynatmaq
E) Quruducu şkafda sterilizasiya etmək

Ədəbiyyat:Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.15

879) Əllərin C-4(pervomur) məhlulunda işlənməsinə nə qədər vaxt lazımdır?

A) 4-5 dəq.
B) 3-4 dəq.
C) 5 dəq
D) 1 dəq.
E) 2-3 dəq.

Ədəbiyyat:: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.16

880) Əllərin xlorheksidin biqlyukonatın spirtli məhlulu ilə işlənməsinə nə qədər vaxt lazımdır?

A) 1 dəq
B) 5 dəq.
C) 1-2 dəq.
D) 3 dəq.
E) 3-4 dəq.

Ədəbiyyat:: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.16

881) Cərrahiyədə ekzogen infeksiya hansı yollarla yayılır?
1. Hava-damcı
2. Limfogen
3. Kontakt
4. İmplantasion
5. Hematogen

A) 1,3,5
B) 1,4,5
C) 2,4,5

smk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) 3,4,5
E) 1,3,4

Ədəbiyyat:: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.19

882) Yaranın yuyulmasında kalium permanqanatın neçə faizli məhlulundan istifadə olunur?

A) 2%
B) 1%
C) 5%
D) 0.02%.
E) 0.1%

Ədəbiyyat:Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.23

883) Palliativ əməliyyatın aparılmasında məqsəd nədir?

A) Bir neçə orqanda əməliyyat aparmaq
B) Çoxmomentli əməliyatı başa çatdırmaq
C) Xəstənin vəziyyətini yüngülləşdirmək
D) Diaqnozu dəqiqləşdirmək
E) Xəstəni sağaltmaq

Ədəbiyyat:: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.115

884) Xəstəni periferik venanın kateterizasiyasına hazırladıqda ona hansı vəziyyət verilməlidir?

A) Ayaq üstə
B) Oturaq
C) Böyrü üstə
D) Arxası üstə, uzanmış
E) Qarnı üstə, uzanmış

Ədəbiyyat:Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.203

885) Periferik vena üçün kateterin seçimində tibb işçisi nəyi nəzərə almır?

A) Xəstənin milli mənsubiyyəti
B) Kateterin venada qalma müddətini
C) Yeridilən mayenin sürətini
D) Yeridilən mayenin tərkibini
E) Venanın diametrini

Pasa az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.203

886) Periferik venada angiokateter neçə sutkaya qədər qala bilər?

A) 5
B) 10
C) 8
D) 3
E) 7

Ədəbiyyat:: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.205

887) Periferik venaya kateter qoyulduqdan sonra damarda hansı ağırlaşma baş verə bilər?

A) Anaflaktik şok
B) Allergik reaksiyalar
C) Limfangit
D) Flebit
E) Limfadenit

Ədəbiyyat:Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.207

888) Periferik venaya kateter qoyulduqdan sonra tromboflebitin profilaktikası üçün nədən istifadə olunur?
1. Traksevazin
2. Levamikol
3. Tripsin
4. Traumel
5. Sintomisin
6. Heparin

A) 1,4,6
B) 2,4,6
C) 4,5,6
D) 3,4,6
E) 1,3,5

Ədəbiyyat:: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.207

889) Periferik venadaki kateterdən dərman maddəsi yeridildikdə orqanizmdə baş verən ümumi ağırlaşma hansıdır?

A) Flebit
B) Tromboflebit
C) Allergik reaksiya

sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Abses
E) Toxuma nekrozu

Ədəbiyyat:Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.89

890) Mərkəzi venalara kateterin yeridilməsi nə vaxt həyata keçirilir?

A) İnfeksiyadan sonra baş verən hematomalarda
B) Xəstə koma vəziyyətində olduqda
C) Yuxarı ətrafın zədələnmələrində
D) Aşağı ətrafların qızıl yelində
E) Flebit və tromboflebitlərdə

Ədəbiyyat:Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.212

891) Periferik venanın punksiyasında kateterin iynəsi neçə dərəcəli bucaq altında yeridilməlidir?

A) 20-40
B) 5-10
C) 10-40
D) 15-30
E) 10-20

Ədəbiyyat:Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.205

892) Periferik venanın punksiyasında iynənin kəsiyi dəri səthinə münasibətdə hansı istiqamətə yönəldilməlidir?

A) Aşağı
B) Sağa
C) Köndələn
D) Sola
E) Yuxarı

Ədəbiyyat:Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.205

893) Periferik venaya kateter yeridilən zaman iynə-stilet daxili konyula ilə minimum hansı məsafəyə yeridilir?

A) 5 ml.
B) 4 ml.
C) 6 ml.
D) 3 ml.
E) 2 ml.

sask.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.205

894) Sidik kisəsinin kateterizasiyası dedikdə nə başa düşülür?

A) Sidik kanalı ilə sidik kisəsinə borunun yeridilməsi
B) Sistostomaya borunun yeridilməsi
C) Boşluğa borunun yeridilməsi
D) Sidik kisəsinə borunun yeridilməsi
E) Sidik kanalına borunun yeridilməsi

Ədəbiyyat:: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.436

895) Sistostomalı xəstələrdə sidik kisəsi neçə ml. furasilin məhlulu ilə yuyulur?

A) 200-300
B) 20-50
C) 100-200
D) 500-1000
E) 100-150

Ədəbiyyat:Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.435

896) Kişilərdə kateter sidik kanalına hansı məsafəyə qədər yeridilir?

A) 10 sm.
B) 14 sm.
C) 19-20 sm.(sidik xaric olana qədər)
D) 15 sm.
E) 12 sm.

Ədəbiyyat:Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.437

897) Qadınlarda kateter sidik kanalına hansı məsafəyə qədər yeridilir?

A) 8 sm.
B) 2 sm.
C) 5-6sm.(sidik xaric olana qədər)
D) 4 sm.
E) 3 sm.

Ədəbiyyat:Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.436

smk.az ödənişsiz istifadə üçün

898) Qastrostomalı xəstənin qidalandırılması gündə neçə dəfə həyata keçirilir?

A) 4-6
B) 1-2
C) 1-3
D) 3
E) 2-3

Ədəbiyyat:Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.402

899) Autoimmoblizasiya nədir?

A) Zədələnmiş nahiyənin taxta parçasına təsbit edilməsi
B) Zədələnmiş nahiyənin şinaya təsbit edilməsi
C) Zədələnmiş nahiyəyə gips sarğısının qoyulması
D) Zədələnmiş nahiyənin karton parçasına təsbit edilməsi
E) Zədələnmiş nahiyənin sağlam tərəfə təsbit edilməsi

Ədəbiyyat:: İ.V.Yaromiç"Sestrinskoye delo"dlya uçaşixsya meditinskix uçiliş i kolledjey,sredneqo meditinskoqo personala."Vışşeşaya şkola",2003 səh.292

900) Borulu drenajlar istifadədən əvvəl nə ilə yuyulmalıdır?

A) 3%-li hidrogen peroksidlə
B) 1%-li yodonatla
C) 1.5%-li xlorheksidin biqlyukonat
D) 0.9%-li natrium xloridlə
E) 70%-li spirtlə

Ədəbiyyat:Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.114

901) Yaradan,boşluqlardan möhtəviyyatın xaric edilməsi və dərman maddələri ilə yuyulması necə adlanır?

A) Anesteziya
B) Hemostaz
C) Biopsiya
D) Drenajlanma
E) İnfuziya

Ədəbiyyat:: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.114

902) Yanıqlar zamanı ilkin tibbi yardıma nə aid deyil?

A) Termiki amilin dəriyə təsirini dayandırmaq
B) Aseptik sarğı qoymaq
C) Ağrısızlaşdırmaq

Sek.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Yanmış sahəni soyutmaq
E) Xəstəni qusdurmaq

Ədəbiyyat:: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.226

903) Yanığı olan xəstələr sarğıya necə hazırlanır?

A) Xəstənin paltarı dəyişdirildikdən sonra
B) Arteriyal təzyiq və bədən hərarəti ölçüldükdən sonra
C) Yara təmizləndikdən sonra
D) Antiseptiklərlə ümumi və yerli vannaların qəbulundan sonra
E) Anesteziyadan sonra

Ədəbiyyat:: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.257

904) Drenaja nə aiddir?

A) Bint yumağı
B) Tənzif-balışcıq
C) Trunda
D) Salfet
E) Kürəcik

Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.108

905) Aşağı ətrafın tromboflebiti zamanı tibb işçisi iltihab nahiyəsindəki ağrını azaltmaq üçün nə etməlidir?

A) Iltihab olan nahiyədə hərəkətsizliyi təmin etməli
B) Xəstənin vəziyyətini müşahidə etməli
C) Arterial təzyiqi ölçməli,nəbz sayılmalı
D) Bədən hərarətini ölçməli
E) Xəstəyə çarpayıda rahat vəziyyət verməli

Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.162

906) "Kəskin qarın" sindromunda ilkin tibbi yardım zamanı nədən istifadə etmək olmaz?

A) Qarın nahiyəsinə buz qovuğunun qoyulması
B) Xəstəyə horizontal vəziyyətin verilməsi
C) Xəstənin xəstəxanaya çatdırılması
D) Təxirə salınmaz yardımın çağırılması
E) Ağrıkəsicilərin yeridilməsi

sınaq üçün ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.343

907) Əməliyyatdan sonraki ağırlaşmaya nə aid deyil?

A) Ağrı şoku
B) Yaradan qanaxma
C) Yaranın çapıqlaşması
D) Yara ətrafında qızartı
E) Tikişlərin aralanması

Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.129

908) Yerli anesteziaydan sonra əməliyyat sahəsində qanaxmanı saxlamaq məqsədilə tibb işçisi nə etməlidir?

A) Xəstəni xəstəxana mühitinə uyğunlaşdırmaq
B) Palatanın havasını dəyişdirmək
C) Xəstənin çarpayıda vəziyyətini dəyişdirmək
D) Əməliyyat sahəsinə buz qovuğunu qoymaq
E) Xəstəyə yuxugətirici preparat təyin etmək

Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.77

909) Travma zamanı yalnız sınığa xas olan əlamət hansıdır?

A) Patoloji hərəkətlilik
B) Ətrafın funksiyasının pozulması
C) Şişkinlik
D) Sümük qırıntılarının krepitasiyası
E) Qansızma

Ədəbiyyat:“Tibb bacısının məlumat kitabı”. “Çıraq” nəşriyyatı 2008. Səh. 256

910) Bədxassəli şişə məxsus əlamət hansıdır?

A) Kapsula ilə əhatə olunur
B) Kaxeksiya yaratmır
C) Kənarları məhduddur
D) Ətraf toxumalara sirayət edir
E) Ətraf toxumalara yayılmır

Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 165

911) Trizm hansı xəstəliyə məxsusdur?

A) Furunkulyoza

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Qazlı qanqrenaya
C) Qızılyel iltihabına
D) Sepsisə
E) Tetanusa

Ədəbiyyat:H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 149

912) İrinli yaraya drenaj boru nə üçün qoyulur?

A) Sarğı qoymaq üçün
B) Qanaxamanı dayandırmaq üçün
C) Yara möhtəviyyatının axması üçün
D) Ağrını azaltmaq üçün
E) Epitelizasiyanı sürətləndirmək üçün

Ədəbiyyat:H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 130

913) “Eynək” simptomu nə zaman baş verir?

A) Beyin sərpməsi zamanı
B) Beyin sıxılması zamanı
C) Kəllə əsası sümüklərininin sınığı zamanı
D) Kəllə tağının sınığı zamanı
E) Beyin silkələnməsi zamanı

Ədəbiyyat:H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 170

914) III dərəcəli donma üçün xarakterik xüsusiyyətlər hansıdır?

A) Sümüklərdə nekrozu
B) Dəridə suluqların yaranması
C) Dərialtı təbəqənin nekrozu
D) Dərinin bütün qatlarının nekrozu
E) Dərinin üst qatlarının nekrozu

Ədəbiyyat:H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 122

915) Paronixiya nəyin iltihabıdır?

A) Dırnaq yatağının
B) Falanqaarası oynaqların
C) Barmaq toxumalarının
D) Mil - bilək oynağının
E) Vətərlərin

Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 145

sınaq az. edənişsiz istifadə üçün

916) Kəskin ostemiolit nədir?

A) Venaların iltihabı
B) Diz oynağının iltihabı
C) Sümüyün və sümük iliyinin iltihabı
D) Barmağın iltihabı
E) Dırnaq yatağının iltihabı

Ədəbiyyat: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. Səh. 143

917) Reinfuziya nədir?

A) Util qanın köçürülməsi
B) Autoqanın köçürülməsi
C) Konservləşmiş qanın köçürülməsi
D) Plasentar qanın köçürülməsi
E) Qanın birbaşa köçürülməsi

Ədəbiyyat: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. Səh. 88

918) II dərəcəli yanıqların fərqləndirici xüsusiyyəti hansıdır?

A) Toxumaların ödemi
B) Ağrı
C) Suluqların əmələ gəlməsi
D) Hiperemiya
E) Nekrozun əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. Səh. 114

919) Kəllə əsası sümüklərinin sınıqları nə ilə müşayət olunur?

A) Gözlərdə ikigörmə
B) Dərialtı emfizema
C) Mimiki əzələlərin qıcolması
D) Qulaqdan və burundan qan və likvorun axması
E) Göz qapaqlarının ödemi

Ədəbiyyat:H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. Səh. 170

920) Hidrodenit hansı vəzilərin irinli iltihabıdır?

A) Tər vəzilərinin
B) Sekresiya vəzilərinin
C) Böyrəküstü vəzilərinin
D) Tüpürcək vəzilərinin
E) Piy vəzilərinin

Ədəbiyyat: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. Səh. 135

Şəxsi az ödənişsiz istifadə üçün

921) Abses nədir?

A) Dırnaq ətrafı toxumanın iltihabı
B) Toxumaların məhdud irinli iltihabı
C) Dırnaq yatağının iltihabı
D) Sümük iliyinin iltihabı
E) Dərialtı toxumanın iltihabı

Ədəbiyyat: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. Səh. 135

922) Tetanus üçün xarakterik olmayan əlamət hansıdır?

A) "Kip sarğı" hissiyatı
B) Sümüklərin və onurğanın sınığı
C) Trizm
D) "Sardonik gülüş"
E) Tənəffüs əzələlərinin qıcolması

Ədəbiyyat: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. Səh. 149

923) Hansı hallarda qanqrena əleyhinə zərdabdan istifadə olunur ?

A) Sarğının absesində
B) Baldır sümüklərinin qapalı sınıqlarında
C) Aşağı ətrafın çirklənmiş yaralanmalarında
D) Çanaq sümüklərinin qapalı sınıqlarında
E) Ovucun fleqmonasında

Ədəbiyyat: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı 1997. Səh.

924) Paranefral blokada üçün novakainin neçə faizli məhlulu istifadə olunur?

A) 0,25%
B) 5%
C) 10%
D) 1%
E) 0,5%

Ədəbiyyat: S.İmamverdiyev.Urologiyada tibb bacısının işi.(səh-45),

925) Furunkul nədir?

A) Tük follikulunun iltihabı
B) Limfatik düyünlərin iltihabı
C) Piy vəzilərinin iltihabı
D) Tər vəzilərinin iltihabı
E) Dərialtı toxumanın iltihabı

Ədəbiyyat:H.Sultanov.Cərrahiyyə-1997.(səh-271)

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

926) Fleqmonanın yumşalma mərhələsində hansı müalicə növündən istifadə olunur?

A) Autohemoterapiya
B) Antibiotiklərlə novakain blokadası
C) Nəm qızdırıcı kompreslər
D) Geniş kəsiyin aparılması və irinciyin drenajlanması
E) İrinciyin punksiyası və antibiotiklərin yeridilməsi

Ədəbiyyat:H.Sultanov.Cərrahiyyə-1997.(səh-273)

927) Hidrodenit ən çox harada lokalizə olunur?

A) Qoltuqaltı nahiyədə
B) Qasıq nahiyəsində
C) Qarın nahiyəsində
D) Boyun nahiyəsində
E) Kürək nahiyəsində

Ədəbiyyat:H.Sultanov.Cərrahiyyə-1997.(səh-271)

928) Karbunkul zamanı kəsik apardıqda anesteziyanın hansı növündən istifadə olunur?

A) Futlyar anesteziya
B) Nəqledici anesteziya
C) Venadaxili narkoz
D) Terminal anesteziya
E) İnfiltrasion anesteziya

Ədəbiyyat:H.Sultanov.Cərrahiyyə-1997.(səh-271)

929) Flykutasiya nədir?

A) İnfiltrasiyanın mərkəzində yumşalmanın əmələ gəlməsi
B) Çeynəmə əzələlərinin qıcolması
C) Suluqların əmələ gəlməsi
D) Dərinin qızarması
E) Çapıq toxumanın əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat:H.Sultanov.Cərrahiyyə-1997.(səh-271)

930) Aşağıdakı əlamətlərdən yemək borusu xərçənginə aid xarakterik əlamət hansıdır?

A) Ümumi halsızlıq
B) İştahanın pozulması
C) Dərinin quruluğu
D) Çəkinin azalması
E) Disfaqiya

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:H.Sultanov.Cərrahiyyə-1997.(səh-275)

931) Paraproktit zamanı hansı yerli əlamət olur?

A) Xora
B) Qanaxma
C) İshal
D) Qəbizlik
E) Anus ətrafında defekasiya zamanı güclənən ağrı

Ədəbiyyat:H.Sultanov.Cərrahiyyə-1997.(səh-285)

932) Donmaların hansı dərəcələri ambulator şəraitdə müalicə oluna bilər?

A) Yalnız III dərəcəli
B) II və III dərəcəli
C) I və II dərəcəli
D) III və IV dərəcəli
E) Yalnız I dərəcəli

Ədəbiyyat:H.Sultanov.Cərrahiyyə-1997.(səh-270)

933) Hemostaz üçün az miqdarda qan nə məqsədlə köçürülür?

A) Taxikardiyanı aradan qaldırmaq
B) A/T yüksəltmək
C) Ürəyin fəaliyyətini sürətləndirmək
D) Laxtlanmanı sürətləndirmək
E) Dövr edən qanın həcmini artırmaq

Ədəbiyyat:H.Sultanov.Cərrahiyyə-1997.(səh-288)

934) Qanköçürməyə əks göstəriş hansıdır?

A) Ağır əməliyyat
B) Şok
C) Nəbzin seyrəlməsi
D) A/T enməsi
E) Qaraciyərin ağır funksiya pozğunluğu

Ədəbiyyat:H.Sultanov.Cərrahiyyə-1997.(səh-279)

935) Donor qanına laxtalanmaması məqsədi ilə nə əlavə olunur?

A) natrium bikarbonat
B) 10%-li kalsium xlorid
C) 2,3% natrium sitrat
D) 70%-li spirt
E) 5%-li qlükoza

Şifahi az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:H.Sultanov.Cərrahiyyə-1997.(səh-279)

936) Exinokokkoz zamanı müalicə məqsədi ilə aşağıda göstərilənlərin hansından istifadə olunmur?

A) Sistin formalinlə işlənməsi
B) Sistin boşaldılması
C) Orqanın rezeksiyası
D) Mebendazol ilə müalicə
E) Boşluqların açılması və drenajlanması

Ədəbiyyat:H.Sultanov.Cərrahiyyə-1997.(səh-280)

937) Süd vəzisinin xərçənginə şübhə olduqda hansı müayinə üsulu aparılır?

A) Punksion biopsiya
B) Mamoqrafiya
C) Süd vəzinin USM
D) Palpasiya
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: H.Sultanov.Cərrahiyyə-1997.(səh-277)

938) "Qatranvari" nəcisi olan xəstəyə nə etmək lazımdır?

A) Vanna etmək
B) Qarın üzərinə isitqac qoymaq
C) Təmizləyici imalə etmək
D) Pəhriz təyin etmək
E) Təcili hospitalizə etmək

Ədəbiyyat:H.Sultanov.Cərrahiyyə-1997.(səh-290)

939) 2%-li "Lizetol"-AF məhlulunda metal alətlər neçə dəqiqə saxlanılmalıdır?

A) 60 dəq
B) 30 dəq
C) 15 dəq
D) 20 dəq
E) 120 dəq

Ədəbiyyat:S.A.Aqkatsyeva.Tibb bacısının işində praktik vərdişlər (səh-88)

940) Lizetol məhlulundan neçə gün istifadə etmək olar?

A) 10 gün
B) 15 gün
C) 20 gün
D) 7 gün
E) 3 gün

usk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:S.A.Aqkatsyeva.Tibb bacısının işində praktik vərdişlər.(səh-88)

941) Metal alətləri sterilizasiyaya hazırlayarkən korroziya əleyhinə nədən istifadə edilir?

A) 1%-li natrium benzoat məhlulu
B) 5%-lin xloramin məhlulu
C) 0.1%-li xlorlu əhəng məhlulu
D) 1%-li xloramin məhlulu
E) 2%-li hidrogen peroksid məhlulu

Ədəbiyyat:S.A.Aqkatsyeva.Tibb bacısının işində praktik vərdişlər.(səh-87)

942) 70 %-li spirt neçə gündən bir dəyişdirilməlidir?

A) 20 gündən
B) 3 gündən
C) 5 gündən
D) 15 gündən
E) 30 gündən

Ədəbiyyat:S.A.Aqkatsyeva.Tibb bacısının işində praktik vərdişlər.(səh-110)

943) Ağzı bağlı qabda steril spirtli pambıq kürəciklərdən neçə gün istifadə etmək olar?

A) 3 gün
B) 1 gün
C) 2 gün
D) 20 gün
E) 10 gün

Ədəbiyyat: S.A.Aqkatsyeva.Tibb bacısının işində praktik vərdişlər.(səh-110)

944) Xəstəxananın aptekində hazırlanmış steril məhlullar hansı rənglə nişanlanır?

A) Sarı
B) Qırmızı
C) Mavi
D) Bənövşəyi
E) Yaşıl

Ədəbiyyat:S.A.Aqkatsyeva.Tibb bacısının işində praktik vərdişlər.(səh-111)

945) Ağciyərin süni ventilyasiya aparatına qoşulmuş xəstədə tənəffüsün sayı bir dəqiqədə neçə olmalıdır?

A) 30
B) 50

Ünsk az ödənişsiz istifadə üçün

C) 12
D) 25
E) 20

Ədəbiyyat:S.A.Aqkatsyeva.Tibb bacısının işində praktik vərdişlər.(səh -270)

946) Reanimasiya tədbirləri müsbət nəticə vermədikdə neçə dəqiqədən sonra bioloji ölüm təsdiqlənər?

A) 5-10
B) 30-40
C) 15-20
D) 2-3
E) 10-15

Ədəbiyyat:S.A.Aqkatsyeva.Tibb bacısının işində praktik vərdişlər.(səh -271)

947) Hansı halda qanburaxmaya göstəriş yarana bilər?

A) Hərəki oyanıqlıq zamanı
B) Anemiyada
C) Hipertonik kriz zamanı yaranmış ağciyər ödemində
D) Qıcolmalarda
E) Hipotoniyada

Ədəbiyyat:S.A.Aqkatsyeva.Tibb bacısının işində praktik vərdişlər.(səh-179)

948) Ətraflara yumşaq bint sarğıları qoyularkən ilk dövrə hansı sarğı ilə başlanır?

A) Sünbül şəkilli
B) Sürünən
C) Spiral şəkilli
D) Dairəvi - sirkulyar
E) Səkkizvari

Ədəbiyyat: H.Sultanov.Cərrahiyyə-1997.(səh-96)

949) Diz və dirsək oynağına qoyulan tısbağavari sarğının neçə forması var?

A) 2
B) 1
C) 6
D) 4
E) 3

Ədəbiyyat: N.P.Paleyev.Tibb bacısının məlumat kitabı. (səh-310)

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

950) Koxer üsulu ilə çıxıq yerinə salınarkən neçə ardıcıl mərhələ var?

A) 1
B) 5
C) 2
D) 4
E) 6

Ədəbiyyat:H.Sultanov.Cərrahiyyə-1997.(səh-271)

951) Kəsici cərrahi alətləri əməliyyatdan əvvəl neçə saat spirtdə saxlamaq lazımdır?

A) 10 dəq 70%-li etil spirtində
B) 30 dəq 96%-li etil spirtində
C) 5 dəq 70%-li etil spirtində
D) 15 dəq 96%-li etil spirtində
E) 3 dəq 70%-li etil spirtində

Ədəbiyyat:Qostişev.(səh-12)

952) Biksin əməliyyat üçün yığımının neçə üsulu var?

A) 1
B) 6
C) 5
D) 3
E) 2

Ədəbiyyat:Qostişev.(səh-13)

953) Termiki üsulla sterilizasiya olunmayan endoskopik alətlər necə sterilizasiya olunur?

A) 33%-li perhidrolda
B) 3%-li hidrogen peroksidində
C) 0.5%-li xloramində
D) 0.1%-li kalium permanqanatda
E) Qaz sterilizatorlarında 18˚C-də 16 saat

Ədəbiyyat:Qostişev.(səh-11)

954) Adi ketqut sapları neçə vaxtdan sonra sorulur?

A) 30 - 40 gün
B) 15 - 20 gün
C) 5 - 10 gün
D) 1 gün
E) 2 - 3 gün

Ədəbiyyat:Ədəbiyyat:M.M.Abakumov-1985.(səh-42)

smart az ödənişsiz istifadə üçün

955) Yanıq xəstəliyinin ilk günlərində xəstəyə köçürələcək infuzion mayelərin miqdarı necə hesablanır?

A) Xəstənin bədən çəkisinin 2% qədər
B) Xəstənin bədən çəkisinin 1% qədər
C) Xəstənin bədən çəkisinin 20% qədər
D) Xəstənin bədən çəkisinin 3% qədər
E) Xəstənin bədən çəkisinin 10% qədər

Ədəbiyyat:Ədəbiyyat:A.N.İnkova.(səh-126)

956) Narkozda işlədilən azot 1- oksidi (N20) oksigenlə qarışdırıldıqda faiz nisbəti necə olmalıdır?

A) 50% oksigen 50% azot 1 oksidi
B) 5% oksigen 95% azot 1 oksidi
C) 10% oksigen 90% azot 1 oksidi
D) 70% oksigen 30% azot 1 oksidi
E) 20% oksigen 80% azot 1 oksidi

Ədəbiyyat:Ədəbiyyat:B.X.Abbasov.Ümumi Cərrahlıq-1987.(səh-103)

957) Aşağı ətraflara sirkulyar gips sarğısı qoymaq üçün bintin eni neçə sm olmalıdır?

A) 15 sm
B) 30 sm
C) Fərqi yoxdur
D) 5 sm
E) 10 sm

Ədəbiyyat:M.M.Abakumov.(səh-384)

958) Çıxığın yerinə salınmasında anesteziya məqsədilə novakainin neçə faizli məhlulu işlədilir?

A) 5%-li
B) 10%-li
C) 0.5%-li
D) 2%-li
E) 1%-li

Ədəbiyyat:M.M.Abakumov.(səh-385)

959) Optik alətlərin paroformalin şkaflarda sterilizasiya müddəti neçə saatdan az olmamalıdır?

A) 48
B) 24
C) 10

tusk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) 12
E) 6

Ədəbiyyat:S.İmamverdiyev. Urologiyada tibb bacısının işi.(səh-45)

960) Xromosistoskopiyada vena daxilinə aşağıdakılardan hansı işlədilir?

A) 0.1%-li brilyant yaşılı
B) 0.2%-li fenolftalin məhlulu
C) 0.4%-li maqnezium sulfat
D) 0.5%-li novakain məhlulu
E) 0.4%-li indiqokarmin məhlulu

Ədəbiyyat:S.İmamverdiyev.Uralogiyada tibb bacısının işi.(səh-45)

961) Dolu sidik kisəsindən sidik ləngimələrində sidik kateterlə neçə dəqiqə müddətinə boşaldılmalıdır?

A) 30-40 dəq
B) 5 dəq
C) 3 dəq
D) 15-20 dəq
E) 60 dəq

Ədəbiyyat:S.İmamverdiyev.(səh-25)

962) Yemək borusunun yanıqlarında rentgenoloji müayinə nə vaxt aparılır?

A) 15-20 gündən sonra
B) Dərhal
C) 3 gündən sonra
D) 5 gündən sonra
E) 30 gündən sonra

Ədəbiyyat:Ədəbiyyat:H.Sultanov.Cərrahiyyə-1997 (səh-121)

963) Kəskin appendisit zamanı həkiməqədərki tibbi yardıma aiddir?

A) Spazmolitiklər vermək
B) Sağ qalça nahiyəsinə isitqac qoymaq
C) Təmizləyici imalə etmək
D) Ağrıkəsicilər vermək
E) Sağ qalça çuxuru nahiyəsinə buz qovuğu qoyub cərrahi şöbəyə çatdırmaq

Ədəbiyyat:H.Sultanov.Cərrahiyyə-1997.(səh-218)

964) Boyun venalarından qanaxma zamanı təhlükəli, zərərçəkmişin ölümünə səbəb nədir?

ünik.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Anemiya
B) Hava emboliyası
C) Hipoksiya
D) Hb - nin azalması
E) Asfiksiya

Ədəbiyyat: H.Sultanov.Cərrahiyyə-1997.(səh-74)

965) Termiki yanıqlarda ağrılar şiddətlənən zaman təcili yardım maşınlarında ağrıkəsici narkoz halında azot 1- oksidi (N20) ilə oksigenin nisbəti necə olmalıdır?

A) 5:1
B) 4:1
C) 2:1
D) 1:4
E) 1:2

Ədəbiyyat:B.D.Komarov.(səh-264)

966) İlan sancması zamanı aşağıdakı hansı tədbiri həyata keçirmək olmaz?

A) 1 ml heparin əzələ daxilinə
B) İlan zəhərinə qarşı zərdab
C) Tetanus əleyhinə zərdab
D) Ətrafın immobilizasiyası
E) Zədələnmiş ətrafa kalium permanqanatla sarğı

Ədəbiyyat::B.D.Komarov.(səh-283)

967) Yanıq şoku zamanı ağrıkəsici narkotiklərin hara yeridilməsi məqsədəuyğundur?

A) Əzələ daxilinə
B) Dəri altına
C) Əzələ daxili, dəri-altı
D) Vena daxilinə
E) Dəri içinə

Ədəbiyyat:B,D,Kamarov.(səh-74)

968) Yanıq şoku zamanı yaşlı insanlara və uşaqlara narkotiklər vena daxilinə necə işlədilir?

A) 1 ml narkotik 5 ml izotonik fizioloji məhlulla
B) 1 ml narkotik 5 ml kofeinlə
C) 1 ml narkotik 40%-li qlükoza ilə
D) 1 ml narkotik 3 ml atropinlə
E) 1 ml narkotik 10%-li kalsium xloridlə

Ədəbiyyat:B.D.Kamarov.(səh-74)

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

969) Qələvilərlə yanıq sahəsini neytrallaşdırmaq məqsədilə sirkə turşusunun neçə faizli məhlulundan istifadə edilir?

A) 0.3%-li
B) 0.1%-li
C) 5%-li
D) 1%-li
E) 3%-li

Ədəbiyyat:İnkova A.N.(səh-132)

970) Bayılmanın obyektiv əlamətlərinə hansı aid deyil?

A) A/T-in enməsi
B) Bəbəyin genişlənməsi
C) Ətrafların soyuması
D) Dəri örtüyünün kəskin avazıması
E) Dəri örtüyünün qızarması

Ədəbiyyat: İnkova A.N.(səh -113)

971) Kimyəvi yanığın ağırlığı hansı faktordan asılı deyil?

A) Havanın temperaturundan
B) Kimyəvi maddənin qatılığından
C) Kimyəvi maddənin tərkibindən
D) Təsir müddətindən
E) Kimyəvi maddənin temperaturundan

Ədəbiyyat:İnkova.A.N.(səh - 132)

972) Yaranın birincili sağalması neçə gün davam edir?

A) 25 - 30 gün
B) 1 - 2 gün
C) 15 - 20 gün
D) 2 - 3 gün
E) 5 - 8 gün

Ədəbiyyat: H.Sultanov.Cərrahiyyə-1997.(səh-126)

973) Ağciyər zədələnmələrində hansı simptoma rast gəlinmir?

A) Hemotoraks
B) Dərialtı emfizema
C) Qanhayxırma
D) Pnevmotoraks
E) Disfagiya

Ədəbiyyat:B. Ağayev " Cərrahi xəstəliklər" (səh-81)

smk.az ödənişsiz istifadə üçün

974) Ağciyər exinokokkozu üçün xarakterik deyil?

A) Ağrı
B) Öskürək
C) Pnevmotoraks
D) Təngnəfəslik
E) Qanhayxırma

Ədəbiyyat:Ədəbiyyat:B.Ağayev.(səh-110)

975) Sınıqların ümumi klinik əlamətlərinə aid deyil?

A) Krepitasiya
B) Travmatik ödem (şişkinlik)
C) Asfiksiya
D) Ağrı
E) Deformasiya

Ədəbiyyat:H.Sultanov.Cərrahiyyə-1997.(səh-107)

976) Təcili tibbi yardım xidmətinin feldşeri işə gəldikdən neçə dəqiqə sonra çağırışlara tam hazır olmalıdır?

A) 50-60 dəqiqə
B) 3-5 dəqiqə
C) 15 dəqiqə
D) 40-45 dəqiqə
E) 20-30 dəqiqə

Ədəbiyyat:Ədəbiyyat:B.D.Komarov.(səh-22)

977) Xəstənin həkimin iştirakı ilə daşınması zamanı feldşerin yeri harada olmalıdır?

A) Dispetçerin yanında
B) Fərqi yoxdur
C) Xəstənin yanında
D) Xəstəxanaya əvvəlcə gəlir
E) Sürücünün yanında

Ədəbiyyat:B.D.Komarov.(səh-23)

978) Xəstə stasionara çatdırıldıqdan ən gec neçə dəqiqə sonra feldşer xəstə haqqında məlumatı təcili yardımın baş dispetçerinə çatdırmalıdır?

A) 50-60 dəqiqədən sonra
B) 30-40 dəqiqədən sonra
C) Təcili yardım stansiyasına gəldikdən sonra
D) Fərqi yoxdur
E) 10-15 dəqiqədən sonra

sınıq az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:Ədəbiyyat:B.D.Komarov.(səh-23)

979) Müəyyən səbəblərdən huşu özündə olmayan xəstələr xəstəxanaya çatdırıldıqdan sonra onların qiymətli əşyalarını feldşer kimə təhvil verir?

A) Baş həkimə
B) Baş həkimin müavininə
C) Qəbul şöbəsinin növbətçisinə
D) Palata tibb bacısına
E) Müalicə şöbəsinin müdirinə

Ədəbiyyat:Ədəbiyyat:B.D.Komarov.(səh-24)

980) Bunlardan hansı müasir endoskopik cərrahiyyə növünə aid deyil?

A) Torakoskopik üsul
B) Artroskopik üsul
C) Bağırsaq daralmalarında lazer dilatasiyası
D) Xolangioqrafik üsul
E) Laparoskopik üsul

Ədəbiyyat:Ədəbiyyat:B.Ağayev (səh-440)

981) Laporoskopik əməliyyatlarda qarın boşluğuna hansı qaz vurulur?

A) Oksigen
B) Azot oksidi
C) Dəm qazı
D) Neon qazı
E) Karbon qazı

Ədəbiyyat:Ədəbiyyat:B.Ağayev.(səh-441)

982) Bunlardan biri laparoskopik alətlərə aid deyil?

A) Klipator
B) Koxer sıxacı
C) Əməliyyat troakarları və konyulaları
D) Vereşa iynəsi
E) Diatermik sıxac

Ədəbiyyat:Ədəbiyyat:B.Ağayev.(səh-445)

983) Aptekdə hazırlanmış göz məlhəminin saxlanma müddəti neçə gündür?

A) 15
B) 7
C) 2
D) 20
E) 10

test.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 219

984) Qulaq seyvanının termiki yanıqlarında ilkin tibbi yardım nədir?

A) Spirtdə ilsadılmış pambıq qoymaq
B) Yoseptdə ilsadılmış pambıq qoymaq
C) 3 %-li hidrogen-peroksiddə ilsadılmış pambıq qoymaq
D) Gümüş-nitradda ilsadılmış pambıq qoymaq
E) Bor turşusunda ilsadılmış pambıq qoymaq

Ədəbiyyat:: И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 165

985) Donmalar zamanı aşağıdakı maddələrdən hansı gözə damızdırılmalıdır?

A) 5 %-li tanin
B) 20 %-li natrium-sulfasil
C) 0, 1 %-li dekzometazon
D) 15-30 %-li dimeksid
E) 2 % -li bor turşusu

Ədəbiyyat:: И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр195

986) Gözə sarğı nə məqsədlə qoyulur?

A) Müalicə müəssisəsinə daşınması
B) Xarici təsirlərdən müdafiə
C) Zədələnmə zamanı təxirəsalınmaz yardım
D) Əməliyyatdan sonra
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat:: И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 258

987) Konyuktivadan yad cism nə ilə xaric edilir?

A) Konik zondla
B) Nəm pambıq tamponla
C) Xüsusi steril iynə ilə
D) Əşya şüşəsi ilə
E) Rezin baloncuqla

Ədəbiyyat:И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 178

988) Gözün dəlib keçən yaralanmalarında xəstəyə hansı vəziyyət verilir?

A) Oturaq vəziyyətdə
B) Arxası üstə

Sənaz ödənişsiz istifadə üçün

C) Üzü üstə
D) Sağlam tərəfdə yanı üstə
E) Zədələnən tərəfdə yanı üstə

Ədəbiyyat:: И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 189

989) Gözün termomexaniki zədələnmələrində ilkin tibbi yardım nədən ibarətdir?

A) Ağrı kəsici verib,hər iki gözə sargının qoyulması
B) Gözə 1 %-li pilokarpin məhlulunun damızdırılması
C) Gözə 1 %-li tetrasiklin məlhəminin sürtülməsi
D) Gözə 15-20 %-li dimeksid məhlulunun damızdırılması
E) Gözə 30 %-li natrium-sulfasil məhlulunun damızdırılması

Ədəbiyyat:: И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 193

990) Gözün davamlı yuyulması hansı hallarda həyata keçirilir?

A) Qlaukomada
B) Donmalarda
C) Konyuktivitlərdə
D) Kimyəvi yanıqlarda
E) Göz qapaqlarının kontuziyasında

Ədəbiyyat:И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 238

991) Kipriklərin və göz qapağının təmizlənməsində hansı məhluldan istifadə olunur?

A) 1 %-li salisil turşusu
B) 5 %-li kalium permanqanat
C) 0, 02 %-li furasilin
D) 2 %-li natrium hidrokarbonat
E) 3 %-li hidrogen peroksid

Ədəbiyyat:И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 236

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

992) Görmə itiliyi neçə metr məsafədə yoxlanılır?

A) 7
B) 8
C) 4
D) 3
E) 5

Ədəbiyyat:И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 19

993) Göz daxili təzyiqin artması hansı xəstəlikdə müşahidə olunur?

A) Blefarit
B) Katarakta
C) Qlaukoma
D) Konyuktivit
E) Traxoma

Ədəbiyyat:: И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 151

994) Göz daxili təzyiqin ölçülməsi necə adlanır?

A) Perimetriya
B) Qonioskopiya
C) Kampimetriya
D) Tonometriya
E) Oftalmoskopiya

Ədəbiyyat:И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 35-36

995) Gözün turşu ilə yanıqları zamanı hansı maddələrlə gözü yumaq lazımdır?

A) 0, 1 %-li sirkə turşusu
B) 0, 25 %-li dikain
C) 2 %-li bor turşusu
D) 2 %-li natrium-hidrokarbonat
E) 20 %-li natrium-sulpasil

Ədəbiyyat:И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 192

996) Gözün qələvi ilə yanıqları zamanı hansı maddələrlə gözü yumaq lazımdır?

A) 0, 1 %-li deksametazon
B) 2 %-li bor turşusu
C) 4 %-li taufon
D) 5 %-li tanin

Sınaq az olanışsız istifadə üçün

E) 2 %-li natrium-hidrokarbonat

Ədəbiyyat:: И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 192

997) Konyuktivitlər zamanı görə sarğı nə məqsədlə qoyulmur?

A) İfrazatın konyuktival boşluqdan evakuasiyasının qarşısı alınır və buynuz qişada iltihab törədir
B) Skleranı zədələyir
C) Buynuz qişa ilə büllur zədələnir
D) Torlu qişanı zədələyir
E) İfrazatın konyuktival boşluqdan evakuasiyasının qarşısını alır və büllurda iltihab törədir

Ədəbiyyat:: И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 101

998) Konyuktivadan yaxma hansı əşya ilə götürülür?

A) Konik zond
B) Pipetka
C) Şüşə çubuq
D) Tənzif kürəcik
E) Pambıq tampon

Ədəbiyyat:И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 30

999) Konyuktival kisəyə yad cism düşdükdə tibb bacısı gözün yuyulmasından əvvəl nə etməlidir?

A) Göz məlhəmlərini yeritməli
B) Konyuktivial kisədə olan bərk hissəcikləri xaric etməli
C) Kiprik kənarını antiseptik maddələrlə işləməli
D) Konyutivial kisəyə damcı damızdırmalı
E) Konyuktivaaltı sahəyə dərman maddələrini yeritməli

Ədəbiyyat:И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 237

1000) Hansı hallarda gözə sarğı qoyulmur?

A) Blefaritlərdə
B) Donmalarda
C) Yanıqlarda
D) Konyuktivitlərdə
E) Zədələnmələrdə

Ədəbiyyat:И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 101

sırf kazı ödənişsiz istifadə üçün

1001) Gözün ağlı qişasının iltihabı necə adlanır?

A) Sklerit
B) Araxinoidit
C) Rinit
D) Blefarit
E) Keratit

Ədəbiyyat:И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 133

1002) Gözün qurğuşunla xroniki zədələnməsi zamanı ilkin tibbi yardım nədən ibarətdir?

A) Ağrıkəsici maddələrin damızdırılması
B) Konyuktivanın yuyulması
C) Təcili mədənin yuyulması
D) Dezinfeksiyaedici göz məlhəminin sürtülməsi
E) Aseptik sarğının qoyulması

Ədəbiyyat:: И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 200

1003) Gözün selikli qişasının iltihabı necə adlanır?

A) Blefarit
B) Qlaukoma
C) Katarakta
D) Konyuktivit
E) Traxoma

Ədəbiyyat:: И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 97

1004) Gözün görmə sahəsinin müayinəsi nə adlanır?

A) Mikroskopiya
B) Oftalmoskopiya
C) Refraktometriya
D) Tonometriya
E) Perimetriya

Ədəbiyyat:И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 23

1005) Gözə sarğı hansı halda qoyulur?

A) Blefarit
B) Traxoma
C) Keratit

stek.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Gözün yaralanması
E) Konyuktivit

Ədəbiyyat:И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 257

1006) Qlaukomanın profilaktik tədbirlərinə nə aiddir?

A) Görmə itiliyinə nəzarət
B) Vaxtaşırı tonometriya
C) Gözün yuyulması
D) Şəxsi gigiyenaya qulluq
E) İdmanla məşğul olmaq

Ədəbiyyat:И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 162

1007) Görmə itiliyi nəyin köməyi ilə müainə olunur?

A) S.S.Qolovinin cədvəli
B) Y.B.Rabkinin cədvəli
C) Perimetr
D) Refraktometr
E) Tonometr

Ədəbiyyat:И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 19

1008) Polixromatik cədvəlin köməyi ilə gözün hansı funksiyası müayinə olunur?

A) Gözün refraksiyası
B) İşıq duyumu
C) Rəng duyumu
D) Görmə itiliyi
E) Görmə sahəsi

Ədəbiyyat:: И.Н.Шаповалова «Справочник по глазным болезням» для среднего медицинского персонала, Феникс 2000, стр 22

1009) Burunun müayinəsi necə adlanır?

A) Otoskopiya
B) Farinqoskopiya
C) Larinqoskopiya
D) Bronxoskopiya
E) Rinoskopiya

Ədəbiyyat:С.В.Ананьева «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 21

snk.az ödənişsiz istifadə üçün

1010) Burun qanaxması zamanı ilk tibbi yardım hansıdır?

A) Xəstənin başını arxaya əymək
B) Hərarəti ölçmək
C) Xəstəni uzandırmaq
D) Burunun ön tamponadasını etmək
E) Xəstənin başını önə əymək

Ədəbiyyat:C.B.Ананьева «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 32

1011) Burun boşluğundan yaxma nə məqsədlə götürülür?

A) Burun boşluğunun hava keçiriciliyini təmin etmək
B) Burun boşluğundan patoloji möhtəviyyatı götürmək
C) İnfeksiya ilə yoluxma təhlükəsizliyini təmin etmək
D) Terapevtik effekti təmin etmək
E) Bakterioloji tədqiqat üçün material götürmək

Ədəbiyyat:C.B.Ананьева «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 23

1012) Buruna yumşaq sarğının hansı növü qoyulur?

A) Sapandvarı
B) Sümbülvarı
C) Monokulyar
D) Spiralvarı
E) Dairəvi

Ədəbiyyat:C.B.Ананьева «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 280

1013) Arterial hipertenziyalı xəstələrdə burun qanaxmaları zamanı tamponu hansı məhlulda islatmaq olmaz?

A) Aminokapron
B) Atropin
C) Hidrogen-peroksid
D) Efedrin
E) Fizioloji məhlul

Ədəbiyyat:C.B.Ананьева «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 32

1014) Xarici burunun yüngül dərəcəli donması zamanı ilkin tibbi yardım nədir?

A) Buruna isitqac qoyulması
B) Dərman maddələrinin damızdırılması
C) Dərinin qarla sürtülməsi

tsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Dərinin spirtdə isladılmış tamponla sürtülməsi
E) Dəriyə məlhəmin sürtülməsi

Ədəbiyyat:С.В.Ананьева «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 26

1015) Burun qanaxmalarında başa hansı vəziyyət verilir?

A) Yüngül önə əyilmiş
B) Arxaya əyilmiş
C) Kəskin horizontal
D) Kəskin vertikal
E) Güclü önə əyilmiş

Ədəbiyyat:: С.В.Ананьева «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 32

1016) Burun boşluğunda yad cism olduqda təhlükəli ağırlaşma nədir?

A) Kəskin irinli otit
B) Seroz möhtəviyyatın ifrazı
C) Kəskin irinli rinit
D) Burunla tənəffüsün çətinləşməsi
E) Yad cismlə aspirasiya

Ədəbiyyat:: С.В.Ананьева «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 43

1017) Badamcıq lakunalarının yuyulmasına göstəriş:

A) Kəskin tonzilit
B) Adenoidit
C) Paratonzillit
D) Kəskin faringit
E) Xroniki tonzilit

Ədəbiyyat:: С.В.Ананьева «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 100

1018) Haymor(əng) cibinin iltihabı necə adlanır?

A) Etmoidit
B) Haymorit
C) Frontit
D) Bronxil
E) Sfenoidit

Ədəbiyyat:С.В.Ананьева «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 56

snk.az ödənişsiz istifadə üçün

1019) Udlağın müayinəsi necə adlanır?

A) Rinoskopiya
B) Otoskopiya
C) Bronxoskopiya
D) Farinqoskopiya
E) Larinqoskopiya

Ədəbiyyat:: C.B.Ananьeva «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 68

1020) Qırtlağın müayinəsi necə adlanır?

A) Rinoskopiya
B) Larinqoskopiya
C) Bronxoskopiya
D) Farinqoskopiya
E) Otoskopiya

Ədəbiyyat:C.B.Ananьeva «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 116

1021) Qulağın müayinəsi necə adlanır?

A) Larinqoskopiya
B) Rinoskopiya
C) Farinqoskopiya
D) Otoskopiya
E) Bronxoskopiya

Ədəbiyyat:C.B.Ananьeva «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 159.

1022) Xarici qulağa hansı aiddir?

A) İlbiz
B) Təbil boşluğu
C) Qulaq seyvani
D) Məməyəbənzər çıxıntı
E) Eşitmə boşluğu

Ədəbiyyat:C.B.Ananьeva «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 142.

1023) Qulağa damızdırılan maye neçə dərəcə temperaturda olmalıdır?

A) 30 - 35
B) 25 - 30
C) 18 - 20
D) 36 - 37

sok.az ödənişsiz istifadə üçün

E) 20 - 25

Ədəbiyyat:С.В.Ананьева «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 305.

1024) Xarici qulaq keçəcəyindən yad cism nəyin köməkliyi ilə xaric edilir?

A) Pinset
B) Jane şpirisi
C) Şüşə çubuq
D) Burun zondu
E) Kulikov iynəsi

Ədəbiyyat:С.В.Ананьева «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 300.

1025) Xarici qulağın təmizlənməsi necə həyata keçirilir?
1. Qulaq zondu
2. Konik pinset
3. Jane şpris
4. Qulaq qıfı
5. Elektrosorucu
6. Atravmatik pipetka

A) 3, 4, 6
B) 2, 4, 6
C) 1, 3, 5
D) 1, 4, 5
E) 2, 5, 6

Ədəbiyyat:С.В.Ананьева «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 329.

1026) Xarici qulaq keçəcəyindən qanaxma zamanı ilkin tibbi yardım nədən ibarətdir?

A) Buz qovuqcuğu qoyub, xəstəxanaya göndərmək
B) Xarici qulaq keçəcəyini yumaq
C) Qulağı təmizləyib, büzücü dərmanları damızdırmaq
D) Qulağı təmizləyib, qan laxtalarını xaric etmək
E) Qulaq keçəcəyinə steril pambıq kürəcik qoyub, xəstəxanaya göndərmək

Ədəbiyyat:: С.В.Ананьева «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 170

1027) Xarici qulaq keçəcəyinin yuyulması nə ilə həyata keçirilir?

A) Qulaq qıfı
B) Qulaq zondu
C) Steril tampon
D) Jane şprisi

Sadəcə az ölənişsiz istifadə üçün

E) Atravmatik pipetka

Ədəbiyyat:С.В.Ананьева «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 2 2 9

1028) Qulaq seyvanın hematoması zamanı ilkin tibbi yardım nədən ibarətdir?

A) Qulaq seyvanının hidrogen-peroksid ilə işlənməsi
B) Qızışdırıcı sarğının qoyulması
C) Spirtli tamponun qoyulması
D) Aseptik sarğının qoyulması
E) Buz qovuqcuğunun və sıxıcı sarğının qoyulması

Ədəbiyyat:: С.В.Ананьева «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 1 6 9

1029) Qulağa qoyulan qızdırıcı kompress necə təsir göstərir?

A) Spazmolitik və ağrıkəsici
B) Antiseptik və stimuləedici
C) Ağrıkəsici və sorucu
D) Sakitləşdirici və ağrıkəsici
E) Qıcıqlandırıcı və sorucu

Ədəbiyyat:: С.В.Ананьева «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 308

1030) İrinli yaraların müalicəsində enzimoterapiya nə ilə aparılır?

A) Antibiotiklərlə
B) Zərdablarla
C) Qan preparatları ilə
D) Fermentlərlə
E) Məlhəmlərlə

Ədəbiyyat::H.Sultanov. Cərrahiyyə Bakı 1997.səh(130)

1031) Nəcisdə al qırmızı qanın olması hansı orqanın xəstəliyinə şübhə yaradır?

A) Mədənin
B) Qaraciyərin
C) Düz bağırsağın
D) 12 barmaq bağırsağın
E) Ağciyərlərin

Ədəbiyyat:Ədəbiyyat:H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı 1997.Səh(226)

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

1032) Anadangəlmə çıxıqlar hansı oynaqda daha çox rast gəlinir?

A) Diz oynağında
B) Aşıq daban oynağında
C) Bud çanaq oynağında
D) Dirsək oynağında
E) Bazu oynağında

Ədəbiyyat:H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı 1997.Səh(103)

1033) Diz oynağının zədələnmələrində və xəstəliklərində diz oynağına sarğı qoyarkən diz oynağı neçə dərəcəli bucaq altında olmalıdır?

A) 90 °
B) 180 °
C) 130 °
D) 45 °
E) 5 °

Ədəbiyyat:: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı 1997.Səh(95)

1034) Uşaqlarda sınıq nahiyəsində yaranan hemotamaya 1%-li novakain blokadası apararkən nə nəzərə alınmalıdır?

A) Uşağın çəkisi
B) Köklük dərəcəsi
C) Uşağın yaşı
D) Uşağın boyu
E) Uşağın cinsi

Ədəbiyyat::B,D.Komarov.Təcili tibbi yardım.Moskva-1984.Səh(294)

1035) Feldşer hepatitə şübhəli xəstədən sınaq şüşələrinə götürdüyü qanı mərkəzi labarotoriyaya kənddən necə çatdirmalıdır

A) Steril konteynerdə
B) Əllində kağıza bükülü
C) Çantada
D) Açıq ştativdə
E) Şüşə qablarda

Ədəbiyyat::S.A.Aqkatseva.Tibb bacısının praktik vərdişləri.1997.səh(171)

1036) Xəstəyə oksigen yastığı ilə oksigen verilərkən dəqiqə ərzində oksigenin verilmə sürəti neçə litr olmalıdır?

A) 4-5 litr
B) 15 litr
C) 2 litr
D) 10 litr

Pulsuz, az ödənişsiz istifadə üçün

E) 1 litr

Ədəbiyyat::S.A.Aqkatseva.Tibb bacısının praktik vərdişləri.1997.səh(51)

1037) 1 qram zülal neçə kkal enerji verir?

A) 10 kkal
B) 2 kkal
C) 9, 3 kkal
D) 4, 1 kkal
E) 3, 5 kkal

Ədəbiyyat::N.P.Paleyev.Tibb bacısının məlumat kitabı.Bakı-1991.Səh(122)

1038) Burun qanaxmalarında istifadə olunan tamponun ölçüləri nə qədər olmalıdır?

A) 50 - 60 sm x 1 - 1, 5 sm
B) 5 - 6 sm x 2 - 3sm
C) 20 - 30 sm x 4 - 5 sm
D) 30 - 40 sm x 5 - 6 sm
E) 10 - 15 sm x 7 - 8 sm

Ədəbiyyat::A.A.Mixaylov.Feldşerin məlumat kitabı 2-ci cild.Moskva-1990.Səh(451)

1039) Yırtığı xarakterizə edən neçə əlamət var?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 3
E) 5

Ədəbiyyat:: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh(241)

1040) Turnanın düzgün qoyulduğunu təsdiq edən əlamətlərdən biri doğru deyil.

A) Ətrafın qızarması
B) Qanaxmanın dayanması
C) Ətrafın avazıması
D) Ətrafın soyuması
E) Periferik nəbzin itməsi

Ədəbiyyat:: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh(77)

1041) Travmatik qanaxmalar baş verdiyi vaxta görə neçə yerə bölünür?

A) 5
B) 4
C) 3

sırf az ödənişsiz istifadə üçün

D) 6
E) 2 (birincili və ikincili)

Ədəbiyyat:: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh(73)

1042) Narkozun klinik gedişi neçə dövrə bölünür?

A) 2
B) 3
C) 6
D) 4
E) 5

Ədəbiyyat:: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh(51)

1043) Sardonik gülüş, trizm və opistotonus hansı xəstəlik üçün xarakteikdir?

A) Fleqmona
B) Qara yara
C) Qazlı qanqrena
D) Qızıl yel
E) Tetanus

Ədəbiyyat:: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh(149)

1044) Ekzoftalm, tremor, taxikardiya hansı xəstəliyin əsas simptomlarıdır?

A) Qastrit
B) Endokardit
C) Bazedov xəstəliyi(tiretoksikoz)
D) Ezofagit
E) Duodonit

Ədəbiyyat:: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh(149)

1045) Litotriptor nə məqsədlə işlədilir?

A) Böyrək daşlarını parçalamaq üçün
B) Piy toxumasını çıxarmaq üçün
C) Anastamoz qoymaq üçün
D) Traxeostomiya üçün
E) Laparosentez üçün

Ədəbiyyat:S.B.İmanverdiyev.Uroloji şöbədə tibb bacısının işi,Bakı-2004.Səh(48)

1046) Zimnitski sınağında ilk sidik nümunəsi saat neçədən yığılmağa başlanır?

A) 5:00
B) 6:00

test.az ödənişsiz istifadə üçün

C) 12:00
D) 4:00
E) 9:00

Ədəbiyyat:S.A.Aqkatseva.Tibb bacısının praktik vərdişləri.1997.səh(255)

1047) Səthi yanıqlardan sonra dərinin neçə faizi zədələndikdə ambulator müalicəyə cəlb edilir? (Üzün, əllərin, aralığın yanıqları aid edilmir).

A) 3-10%
B) 15-20%
C) 20-30%
D) 6-8 %
E) 1-1.5%

Ədəbiyyat::V.İ.Maslov.Kiçik cərrahlıq.Moskva-1988.Səh(79)

1048) Bud sümüyünün sınaqlarında ən etibarlı immobilizasiya şinası hansıdır?

A) Kramer şinası
B) Şumaxer şinası
C) Böyler şinası
D) Kuzminski şinası
E) Diterexs şinası

Ədəbiyyat:: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh(110)

1049) Böyrəklərin qapalı zədələnmələri zamanı ilk tibbi yardım nədən ibarətdir?

A) Narkotiklərdən istifadə
B) Buz qovuqcuğu qoyub hospitalizə etmək
C) Sidikqovuculardan istifadə
D) İsitqac qoymaq
E) Spazmalitiklərdən istifadə

Ədəbiyyat:: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh(248)

1050) Sidik kisəsini yumaq üçün hansı məhluldan istifadə olunur?

A) Pervomur məhlulundan
B) Hidrogen-peroksid məhlulundan
C) Furasilindən
D) Fizioloji məhluldan
E) 70 %-li spirtdən

Ədəbiyyat::S.B.İmanverdiyev.Uroloji şöbədə tibb bacısının işi,Bakı-2004.Səh(65)

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

1051) Sidik kisəsinin qapalı zədələnmələrində ilk yardım nədən ibarətdir?

A) Sidik qovucular verilir
B) Sidik kisəsi katetetri qoyulur
C) Narkotiklərdən istifadə olunur
D) Buz qovuqcuğu qoyulur
E) Nitroksolin verilir

Ədəbiyyat:: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh(247)

1052) Varikosele hansı xəstəlikdir?

A) Toxum ciyəsinin inkişaf dan qalması
B) Toxum ciyəsi venalarının varikoz genişlənməsi
C) Toxum ciyəsinin iltihabı
D) Toxum ciyəsinin kistası
E) Xayaların böyüməsi

Ədəbiyyat:: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh(259)

1053) Fövqaladə hallarda ilk tibbi yardım ilk növbədə kimlərə göstərilməlidir?

A) Həyat üçün vacib orqanları zədələnmiş insanlara
B) Görmə orqanları zədələnmiş insanlara
C) Dayaq-hərəkət orqanları zədələnmiş insanlara
D) Qorxu və həyəcandan nitqini itirmiş insanlara
E) Yuxarı ətrafları zədələnmiş insanlara

Ədəbiyyat::B.D.Komarov.Təcili tibbi yardım(Feldşerlər üçün)Moskva-1984.Səh(24)

1054) Xüsusi tibbi geyim qanla çirkləndikdə necə dezinfeksiya ediliməlidir?

A) 5 dəq 1 %-li xloramində
B) 2 saat 10 %-li xlorlu əhəng məhlulunda
C) 10 dəq 3 %-li hidrogen-peroksiddə
D) 5 dəq 10 %-li xloramində
E) 60 dəq 0, 2 %-li xloramində

Ədəbiyyat::S.A.Aqkatseva.Tibb bacısının praktik vərdişləri.1997.səh(168)

1055) Hepatitli xəstələrlə kontakta olan tibbi alətlərin dezinfeksiyasında neçə faizli xloramin məhlulu işlədilir?

A) 1%
B) 3%
C) 0,2%
D) 10%
E) 5%

Ədəbiyyat::S.A.Aqkatseva.Tibb bacısının praktik vərdişləri.1997.səh(178)

sınaqlar edənişsiz istifadə üçün

1056) Xəstəxananın qəbul şöbəsinə orta ağır vəziyyətdə xəstə gətirilib. Növbətçi həkim yoxdur, feldşer nə etməlidir?

A) Xəstəni reanimasiya şöbəsinə aparmalı
B) Təcili növbətçi həkimi çağırmalı
C) Həkiməqədər təxirəsalınmaz yardıma başlamalı
D) Xəstənin qəbulu üçün sənədləri doldurmalı
E) Konsilium çağırmalı

Ədəbiyyat::S.A.Aqkatseva.Tibb bacısının praktik vərdişləri.1997.səh(19)

1057) Təmizləyici imalənin qoyulmasına əks göstəriş hansıdır?

A) Meteorizm
B) Planlaşdırılmış əməliyyatdan əvvəl
C) Qəbizlik
D) Bağırsaq qanaxmaları
E) Doğuşdan əvvəl

Ədəbiyyat::S.A.Aqkatseva.Tibb bacısının praktik vərdişləri.1997.səh(237)

1058) Sutkalıq diurez 40ml olarsa bu nəyi göstərir?

A) Nikturiya
B) Poliuriya
C) Oliquriya
D) Dizuriya
E) Anuriya

Ədəbiyyat::S.A.Aqkatseva.Tibb bacısının praktik vərdişləri.1997.səh(250)

1059) Nəfəs yollarının tutulması necə adlanır?

A) Disfaqiya
B) Aspirasiya
C) Displaziya
D) Anevrizm
E) Atrofiya

Ədəbiyyat:: В.Д.Комаров «Скорая медицинская помощь». Москва 1984. Səh. 34

1060) Traxeotom aləti nə üçün istifadə olunur?

A) Konikotomiya üçün
B) Laposentez üçün
C) Episistoma üçün
D) Punksiyalar zamanı
E) Torakosentez üçün

Ədəbiyyat:: В.Д.Комаров «Скорая медицинская помощь». Москва 1984. Səh. 43

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

1061) Poliqlükindən bir dəfəyə maksimum vena daxilinə neçə ml. qədər köçürmək olar?

A) 2500 ml
B) 2000 ml
C) 1500 ml
D) 1600 ml
E) 1800 ml

Ədəbiyyat:: В.Д.Комаров «Скорая медицинская помощь». Москва 1984. Səh. 68

1062) Morfini hansı hallarda işlətmək əks göstərişdir?

A) Yuxarı ətrafların zədələnmələrində
B) Travmatik amputasiyalarda
C) Yanıq şokunda
D) Aşağı ətrafların zədələnmələrində
E) Kəllə beyin travmalarında

Ədəbiyyat:: В.Д.Комаров «Скорая медицинская помощь». Москва 1984. Səh. 70

1063) Sistit nəyin iltihabi xəstəliyidir?

A) Sidik kisəsinin selikli qişasının
B) Sidik axarının
C) Böyrək daxili sidik axarlarının
D) Böyrək ləyənin
E) Urentranın selikli qişasının

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 255

1064) Qanda və sidikdə diastazanın miqdarının artması hansı xəstəlik üçün səciyyəvidir?

A) Kəskin appendisit
B) Kolit
C) Pielonefrit
D) Kəskin xolesistit
E) Kəskin pankreatit

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 237

1065) Koxer üsulu ilə bazu çıxığının yerinə salınması neçə mərhələdən ibarətdir?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 3
E) 5

sirk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 271

1066) Bazu çıxığı yerinə salındıqdan sonra hansı sarğı ilə təsbit olunur?

A) Dezo sarğısı
B) Dairəvi sarğı
C) Spiral sarğı
D) Ləçək sarğısı
E) Sünbül sarğı

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 272

1067) Pielitin əsas əlaməti nədir?

A) Piuriya
B) Fostatouriya
C) Hematuriya
D) Albuminuriya
E) Qlükozuriya

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 250

1068) Donmaların kliniki gedişi neçə dövrə bölünür?

A) 4
B) 2
C) 3
D) 1
E) 5

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 122

1069) Dırnağı yatağından çıxardıqda hansı anesteziya növündən istifadə edilir?

A) Regionar anesteziya
B) Peridural anesteziyadan
C) İlfiltrasion anesteziya
D) Futlyar anesteziya
E) Venadaxili anesteziyadan

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 60

1070) Hansı çıxıqlarda oynaq kisəsi zədələnmir (partlamır)?

A) Dirsəyin
B) Budun
C) Aşağı çənənin
D) Mil biləyin
E) Bazunun

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 181

1071) Odlu silah yaraları hansı üsulla cərrahi işlənir?

A) Piraqov
B) Koçergin
C) Petrovski
D) Topçubaşov
E) Şamov

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 130

1072) Bağırsaq keçməməzliyinin invaginasiya forması ən çox kimlərdə rast gəlinir?

A) Qadınlarda
B) Orta yaşlı insanlarda
C) Gənc yaşlı insanlarda
D) 1 yaşa qədər uşaqlarda
E) Kişilərdə

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 223

1073) Yaranın birincili cərrahi işlənməsi hər hansı səbəbdən gecikərsə nə etmək lazımdır?

A) Yara kənarları antibiotiklərlə blokada edilir
B) Yaraya aseptik sarğı qoyulur
C) Yara spirt-yodla silinir
D) Yara kənarlarına 0,3ml 0,1%-li adrenalin yeridilir
E) Yara spirtlə silinib adi sarğı qoyulur

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 129

1074) Yaranı sarımaq üçün steril material olmadıqda (səhra şəraitində) nə etmək məqsədə uyğundur?

A) Bütün cavablar doğrudur
B) Əl altında olan materialla sarımaq
C) Zərərçəkmişin köynəyini cırıb sarımaq
D) Yaranı açıq saxlamaq
E) Cib dəsmalı ilə kip sarımaq

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 128

1075) Quduzluq əleyhinə vaksin bədənin hansı nahiyəsinə vurulur?

A) Vena daxilinə
B) Bazunun yuxarı üçcə birinə
C) Sarğı nahiyəsinə

Şəxsəz ödənişsiz istifadə üçün

D) Dəri altına
E) Dəri içinə

Ədəbiyyat:: Mövcud təlimata əsasən.

1076) Güllə yaralarının neçə forması var?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 1

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 125

1077) Appendisit kliniki gedişinə görə neçə formada olur?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 1

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 218

1078) Düz bağırsaq sallamasının neçə mərhələsi vardır?

A) 5
B) 3
C) 4
D) 2
E) 6

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 228

1079) Dəriyə qoyulan düyünlü tikişlər arasında olan məsafə neçə sm-dən çox olmamalıdır?

A) 0,5
B) 2
C) 1
D) 0,3
E) 3

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 294

1080) Əzilmələr zamanı ilk yardımda tətbiq edilmir?

A) İsitqac qoymaq

isnk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Qanaxmanı dayandırmaq
C) Buz qovuğu qoymaq
D) Xəstəyə rahatlıq vermək
E) əzilmiş nahiyəni mexaniki qıcıqlardan qorumaq

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı-1997. Səh.(100)

1081) Xəstə 1 litr qan itirdikdə A\T(arterial təzyiq) neçə mm.c.st aşağı düşür?

A) 30 mm c.st
B) 5 mm c.st
C) 10-15 mm c.st
D) 2 mm c.st
E) 6-7 mm c.st

Ədəbiyyat::V.İ.Maslov.Kiçik cərrahlıq.Moskva-1988.Səh(51)

1082) Neçə litr qan itkisi huşunu itirilməsinə ,kollapsa gətirib çıxarır?

A) 1 litr
B) 0.5 litr
C) 1.5 litr
D) 2 litr
E) 0.5-1 litr

Ədəbiyyat::V.İ.Maslov.Kiçik cərrahlıq.Moskva-1988.Səh(51)

1083) Kəskin yerli cərrahi infeksiyaların(furunkul,karbunkul,hidradenit) hansı fazasında novakain antibiotik blokadası tətbiq edilir?

A) İrinli-seroz
B) İnfiltrasiya
C) Nekrotik
D) Seroz
E) Qanqrenoz

Ədəbiyyat:V.İ.Maslov.Kiçik cərrahlıq.Moskva-1988.Səh(43)

1084) Tetanus əleyhinə zərdabın Bezredko üsulu ilə sınağından sonra yaranmış qızartı-papulanın ölçüsü nə qədər olduqda zərdab vurulur?

A) 0.4 sm
B) 0.5 sm-dən az
C) 0.6 sm-dən az
D) 0.9 sm-dən çox
E) 0.7 sm az

Ədəbiyyat::V.İ.Maslov.Kiçik cərrahlıq.Moskva-1988.Səh(64)

ynsk.az ödənişsiz istifadə üçün

1085) Beyin qan damarlarının qısa müddətli spazmı nəticəsində yaranan patoloji hal necə adlanır?

A) Nevroz
B) Şok
C) Kollaps
D) Amneziya
E) Bayılma

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı-1997. Səh.(92) Bayılma,beyin qan damarlarının müəyyən qıcıqların təsirindın qısa müddətli reflektor spazmı nəticəsində yaranır.Beyin qan damarlarının tonusu aşağı düşür.

1086) Köçürülən qanın əsas təsirini göstərin.

A) Sadalananaların hamısı
B) Qandayandırıcı
C) Stimulyasiyaedici
D) Əvəzləyici
E) Zərərsizləşdirici

Ədəbiyyat:: H.A.Sultanov "Cərrahiyyə". Bakı-1997. Səh.(85)

1087) İlk tibbi yardım harada göstərilir?

A) Hərbi hissədə
B) Xəstəxanada
C) Çeşidləmə meydançasında
D) Zədələnmə ocağında
E) Tibb məntəqəsində

Ədəbiyyat:В.М.Рябочкина,.Г.И.Назаренко «Медицина катастроф» Москва 1996 стр.73-76

1088) Uzunmüddətli sıxılma sindromunun ən çox rast gəlinən ağırlaşması hansıdır?

A) Sınıqların əmələ gəlməsi
B) Toksiki şok
C) Ağrı
D) Huşun itməsi
E) Tənəffüsün pozulması

Ədəbiyyat:: В.М.Рябочкина,.Г.И.Назаренко «Медицина катастроф» Москва 1996 стр.124-127

elsk.az ödənişsiz istifadə üçün

1089) Fövqəladə fəlakətlər zamanı fəlakət tibb xidmətinin əsas vəzifələrindən biri hansıdır?

A) Qəza zonasında, xilasetmə və təxirə salınmaz işlərin aparılması, onların axtarılması və ərazidən çıxarılması
B) Tibbi çeşidləmə
C) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməsi və köçürülmə mərhələsində həyati vacib orqanların fəaliyyətinin bərpa edilməsi
D) Qəza zonasında xilasetmə işlərinin təşkili
E) Qüvvə və vasitələrin səfərbər olunması

Ədəbiyyat:: A.Musayev. " Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili " səh.14-19 Bakı - 2008

1090) Fəlakət ocağında hospitala qədər hansı tibbi yardım göstərilir?

A) Xüsusiləşmiş
B) İxtisaslaşmış
C) Cərrahi
D) Əhali tərəfindən
E) İlk

Ədəbiyyat:A.Musayev " Mülki Müdafiə tibbi xidmətinin təşkili ". Səh. 100-101 Bakı - 2008

1091) Uzunmüddətli sıxılma sindromunun aşağıdakı növü yoxdur.

A) Çox uzun müddətli (7saatdan çox)
B) Uzun müddətli (4-7 saat)
C) Orta müddətli (4 saat)
D) Ani (0.5 saat)
E) Qısa müddətli (2-3 saat)

Ədəbiyyat:В.М.Рябочкина,.Г.И.Назаренко «Медицина катастроф» Москва 1996 стр.124-125

1092) İlan vurmada hansı təxirəsalınmaz yardım göstərilmir?

A) İlan sancan yerdən yuxarı jqut qoymaq
B) Alkoqol vermək
C) Zərdab vurmaq
D) Yaranı kalium-permanqanatla yumaq
E) Çoxlu maye vermək

Ədəbiyyat:: Е.М.Чазов «Неотложные состояния и екстренная медицинская помощь» стр.459-461 Москва-Медицина -1988

1093) Kimyəvi zədələnmə ocağında ilk tibbi yardımın əsas tədbirlərinə nə aid deyildir?

A) Antidontların vurulması
B) Əlehqazların geyindirilməsi

sek.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Qanaxmanın daimi dayandırılması
D) Xəsarət almışların zədə ocağından çıxarılması
E) Natamam sanitar təmizləmənin aparılması

Ədəbiyyat:: A.Musayev. “ Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili ” səh. 111-113 Bakı - 2008

1094) Əhalinin kütləvi qırğın silahlarından qorunma üsulları hansıdır?

A) Əhalini şəhər ətrafı ərazilərə köçürülməsi
B) Əhalinin həmin ərazidən çıxarılması və sığınacaqlarda yerləşdirilməsi
C) Tibbi ləvazimatlardan istifadə edilməsi
D) Tibbi yardımın göstərilməsi və müalicəsinin aparılması
E) Əhaliyə xəbərdarlıq edilməsi

Ədəbiyyat:: A.Musayev. “ Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili ”. Səh. 81 - 85 Bakı - 2008

1095) Ətrafın sıxılması zamanı ilk tibbi yardım necə göstərilir?

A) Oksigen inhalyasiya olunur
B) Standart şinalarla immobilizasiya aparılır
C) Antibakterial terapiya aparılır
D) Periferiyadan mərkəzə doğru sıxıcı sarğı qoyulur və ağrıkəsicilər yeridilir
E) Antihistamin maddələrin yeridilir

Ədəbiyyat:: В.М.Рябочкина,.Г.И.Назаренко «Медицина катастроф» Москва 1996 стр.126-128

1096) Əlaltı vasitələrdən istifadə etməklə zədələnmə ocağında hansı növ tibbi yardım göstərilir?

A) Xüsusiləşdirilmiş yardım
B) Təkmilləşmiş həkim yardımı
C) İlk yardım
D) İlk həkim yardımı
E) İxtisaslaşmış yardım

Ədəbiyyat:В.М.Рябочкина,.Г.И.Назаренко «Медицина катастроф» Москва 1996 стр.73-76

1097) Sudaboğulan şəxsə ilk tibbi yardım hansı ardıcıllıqla göstərilməlidir?
1. Sudan çıxarmaq və ağız boşluğundan yad cisimləri xaric etmək
2. Ağciyərlərin süni ventilyasiyası
3. Ürəyin qapalı masajı
4. Bədənin isidilməsi
5. Dərman müalicəsi
6. Ürəyin açıq masajı

A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 1, 5, 6

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) 1, 4, 5
E) 4, 5, 6

Ədəbiyyat:: Е.М.Чазов «Неотложные состояния и екстренная медицинская помощь» стр.465-466 Москва 1988

1098) Hansı zəhərləyici maddələrlə zəhərlənmə zamanı dəridə "boz hipoksiya" əmələ gəlir?

A) Fosgen
B) Ammonyak
C) Dəm qazı
D) Zorin
E) Xlorpikrin

Ədəbiyyat:В.М.Рябочкина,.Г.И.Назаренко «Медицина катастроф» Москва 1996 стр 208-210

1099) Dezaktivasiya nədir?

A) Gəmiricilərin zərərsizlədirilməsi
B) Mikrobların zərərsizləşdirilməsi
C) Radiaktiv maddələrin təmizləməsi
D) Zərərli maddələrin zərərsizləşdirilməsi
E) Antidotların yeridilməsi

Ədəbiyyat:: Ф.И.Комаров «Военно-медицинская подготовка» Москва1989 стр 318-319

1100) Əhalinin kütləvi qırğın silahlarından mühafizə zamanı nədən istifadə edilmir?

A) Metrodan
B) Əlehqazlardan
C) Radiasiyaya qarşı daldanacaqlardan
D) Yeraltı keçidlərdən
E) Binaların zirzəmisindən

Ədəbiyyat:: A.Musayev "Mülkü müdafiə tibb xidmətinin təşkili" Bakı 2008 səh 81

1101) Nüvə zədələnməsi ocaqlarında göstərilən ilk tibbi yardıma hansı aid deyil?

A) Yanan paltarların söndürülməsi
B) Arterial qanaxmanın daimi dayandırılması
C) Qanaxmanın müvəqqəti saxlanılması
D) Yanıqlarda ağrıkəsicilərin vurulması
E) Yuxarı tənəffüs yollarının keçiriciliyinin bərpası

Ədəbiyyat:: A.Musayev "Mülkü müdafiə tibb xidmətinin təşkili" Bakı 2008 səh102
A.Musayev "Mülkü müdafiə tibb xidmətinin təşkili" Bakı 2008 səh 29

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

1102) Bunlardan hansı əhalinin kütləvi qırğın silahlarından mühafizəsi üsullarına aid deyil?

A) Əhalinin evlərdə, binalarda gizlənməsi.
B) Əhalinin mühafizə qurğularında yerləşdirilməsi
C) Əhalinin sayının seyrəkləşdirilməsi
D) Fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edilməsi
E) Əhalinin şəhərkənarı əraziyə təxliyyəsi

Ədəbiyyat:: A.Musayev "Mülkü müdafiə tibb xidmətinin təşkili" Bakı 2008 səh 81

1103) Fərdi mühafizə vasitələrinə bunlardan nə aid deyil?

A) Radiasiyaya qarşı daldanacaqlar
B) Dərinin mühafizə vasitəsi
C) Əlehqazlar
D) Respiratorlar
E) Tənəffüs üzvlərinin mühafizə vasitəsi

Ədəbiyyat:: A.Musayev "Mülkü müdafiə tibb xidmətinin təşkili" Bakı 2008 səh 92

1104) Kimyəvi zədələnmə ocağında ilk tibbi yardımın əsas tədbirlərinə aid deyil?

A) Natamam sanitar təmizlənmənin aparılması
B) Əlehqazların geyindirilməsi
C) Təkmilləşdirilmiş və ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımın təşkili
D) Antidotların vurulması
E) Xəsarət almışların zədə ocağından çıxarılması

Ədəbiyyat:: A.Musayev "Mülkü müdafiə tibb xidmətinin təşkili" Bakı 2008 səh 122

1105) Bakterioloji ocağın ləğv olunması tədbirlərinə nə daxil deyil?

A) Sanator- kurort müalicəsi aparılır
B) Karantin və observasiya təşkil olunur
C) Bakterioloji ocağın sərhədləri müəyyən olunur
D) Ümumi kəşfiyyatların nəticələrinə görə əhali xəbərdar edilir
E) Ərazidə bioloji kəşfiyyatın aparılması

Ədəbiyyat:A.Musayev "Mülkü müdafiə tibb xidmətinin təşkili" Bakı 2008 səh 126

1106) Hansı zəhərli maddə sinir iflic edici təsirə malikdir?

A) Qıcıqlandırıcı və gözyaşardıcı maddələr
B) Fosgen, difosgen
C) İprit,luizit
D) Zarin,zoman vi-iks
E) Linil turşusu

Ədəbiyyat:: Ф.И.Комаров «Военно-медицинская подготовка» Москва1989 стр 252

smart az ödənişsiz istifadə üçün

1107) Bunlardan hansı boğucu təsirli zəhərli maddələrdir.

A) Sulfat turşusu
B) Fosgen,difosgen
C) Sinil turşusu
D) Gözyaşardıcı maddələr
E) İprit, lüizit

Ədəbiyyat:: Ф.И.Комаров «Военно-медицинская подготовка» Москва1989 стр 259

1108) Kəskin şüa xəstəliyi zamanı ilk tibbi yardım necə aparılır?

A) Zərərçəkəni zədələnmə ocağından çıxarmaq, hissəvi sanitar təmizləmə aparmaq, içməyə 1 tab etapirazin vermək, şüalanmanın qarşısını almaq üçün - sistamin (6 tab bir dəfəyə vermək)
B) Parenterol qidalanma
C) Polivitamin, dimedrol, antibiotiklərin tətbiqi
D) Təzə sitralt,qan trambositlər, eritrositar kütlənin yeridilməsi
E) Qüvvətləndirici və medikamentoz terapiya

Ədəbiyyat:: Ф.И.Комаров «Военно-медицинская подготовка» Москва1989 стр 247

1109) Kütləvi qırğın silahlarına nə aid deyil?

A) Əlbəyaxa döyüş
B) Nüvə silahının tətbiqi
C) Kimyəvi silahların tətbiqi
D) Terror məqsədi ilə törədilən partlayışlar.
E) Bakterioloji silahın tətbiqi

Ədəbiyyat:: Ф.И.Комаров «Военно-медицинская подготовка» Москва1989 стр 95

1110) Boğucu təsirli zəhərli maddə fosgenlə zəhərləndikdə bu əlamətlərdən hansı müşahidə olunmur?

A) Ağızda xoşagəlməz dad
B) Mədə nahiyyəsində ağrılar və qusma
C) Öskürək, boğulma
D) Gözlərin və tənəffüs yollarının qıcıqlanması
E) Hallüsinasiyalar

Ədəbiyyat:Ф.И.Комаров «Военно-медицинская подготовка» Москва1989 стр 259

1111) Ümumi təsirli, zəhərli maddələrlə zədələndikdə ilk tibbi yardım zamanı hansı tədbir aparılmır.

A) Süni tənəffüs verilir.
B) Antibiotiklər, dezensibilizəedici maddələr ,transfuzion terapiya
C) Zədə alana əlehqaz geyindirilir
D) Zədələnmə ocağında çıxarılır.

Sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

E) Antidot yeridilir

Ədəbiyyat:: Ф.И.Комаров «Военно-медицинская подготовка» Москва1989 стр 258

1112) Termiki yanıqlar zamanı zərdab hansı xəstəliyin profilaktikası məqsədilə vurulur?

A) Vəba
B) Quduzluq
C) Tetanus
D) Qarayara
E) Botulizm

Ədəbiyyat:: B.X.Abbasov "Ümumi cərrahlıq" Bakı 1987 səh 296-297

1113) Yanıq xəstəliyi bədənin neçə faizi yandıqda əmələ gəlir?

A) 3-5%
B) 6-7 %
C) 8-9 %
D) 10% və daha çox
E) 1-2%

Ədəbiyyat:В.М.Рябочкина,.Г.И.Назаренко «Медицина катастроф» Москва 1996 стр 174-175

1114) Yanıq xəstəliyi nəticəsində hansı şok əmələ gəlir?

A) Hipovolimik
B) Travmatik
C) Anafilkatik
D) Bakterial
E) Kardiogen

Ədəbiyyat:B.X.Abbasov "Ümumi cərrahlıq" Bakı 1987 səh 294-295

1115) Yanıqların infuzion müalicəsində hansı növ məhlullardan istifadə edilir?

A) Duz tərkibli
B) Zülal tərkibli
C) Antihistamin təsirli
D) Polyarlaşmış
E) Dezintoksikosion təsirli

Ədəbiyyat:Е.М.Чазов «Неотложные состояния и екстренная медицинская помощь» стр.239-241 Москва 1988

1116) Psixomotor oyanıqlıq zamanı xəstəyə təxirəsalınmaz yardım üçün hansı preparatdan istifadə olunur?

nsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Koffein
B) Aminazin
C) Analgin
D) Ensefabol
E) Pirasetam

Ədəbiyyat:: N .R Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı”. Bakı 1990. Səh.453

1117) Tibb işçilərinin danışıq tərzinin ehtiyatsızlığı nəticəsində müşahidə edilən psixi pozuntu nədir.?

A) Xəstələrə nəzarətin təşkili
B) Xəstənin əmək reablitasiyasiyası
C) Xəstənin xəstəxanaya yerləşdirilməsi
D) Xəstənin dərmanla müalicəsi
E) Xəstənin psixikasına sözlə təsir etmə

Ədəbiyyat:N .R Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı”. Bakı 1990. Səh.470

1118) Tibb işçilərinin ehtiyatsızlığı nəticəsində müşahidə olunan psixi pozuntu nədir?

A) Yatrogeniya
B) Diqqət pozuntusu
C) Düşüncə pozuntusu
D) Yaddaş pozuntusu
E) İradi-hərəki pozuntu

Ədəbiyyat:: N .R Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı”. Bakı 1990. Səh.476

1119) Kəskin beyin-qan dövranının pozuntusu zamanı yataq rejiminə neçə gün müddətinə riayət olunur?

A) 14
B) 21
C) 6
D) 30
E) 10

Ədəbiyyat:R.Şirəliyeva: “Sinir xəstəlikləri”. Bakı 2003. Səh 126

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

1120) Meningit xəstəliyini təsdiqləyən müayinə üsulu hansıdır?

A) Qanın müayinəsi
B) Şəkərin müayinəsi
C) Sidiyin müayinəsi
D) Onurğa beyin mayesinin müayinəsi
E) Ultrasəs müayinəsi

Ədəbiyyat:R.Şirəliyeva: “Sinir xəstəlikləri”. Bakı 2003. Səh 152

1121) Miqren tutması zamanı ilk tibbi yardım hansıdır?

A) Xəstəni yarıqaranlıq, havası dəyişdirilmiş, sakit bir yerdə yerləşdirmək
B) Oksigen vermək
C) Zəli qoymaq
D) Başı soyuq su ilə yumaq
E) Sıxıcı paltarlardan azad etmək

Ədəbiyyat:N .R Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı”. Bakı 1990. Səh.462

1122) Epilepsiya üçün xarakter əlamət nədir?

A) Qıcolma
B) Başgicəllənmə
C) Ürəkbulanma
D) Özünə qapanma
E) Nitqin tormozlanması

Ədəbiyyat:N. İsmayılov: “Psixiatriya”. Səh 211

1123) Epileptik status zamanı mexaniki asfiksiyanın qarşısını almaq üçün tibb bacısının taktikası:

A) Xəstəni təmiz havaya çıxartmalı
B) Xəstəni uzatmaq :tənəffüs yollarını təmizləmək, diş protezi varsa onu xaric etmək
C) Başa hündür vəziyyət verməli
D) Mədə-bağırsaq traktını yumalı
E) Başa buz qoymalı

Ədəbiyyat:: N. İsmayılov: “Psixiatriya”. Bakı 1992. Səh 220

1124) Hemoratik insult zamanı təxirəsalınmaz yardım:

A) Xəstənin başına buz qoyub, uzanıqlı vəziyyət vermək
B) Xəstəyə başıaşağı vəziyyət vermək
C) Xəstəni sol tərəfə çevirmək
D) Xəstəni sağ tərəfə çevirmək
E) Xəstəyə yarıoturaq vəziyyət vermək

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:N .R Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı”. Bakı 1990. Səh. 560

1125) Qeyd edilən preparatlardan narkotik qrupa aid olanı hansıdır?

A) Kofein
B) Morfi
C) Aminazin
D) Barbital
E) Diazepam

Ədəbiyyat:: N. İsmayılov: “Psixiatriya”. Bakı 1992. Səh 309

1126) Afaziya nədir?

A) Yuxu pozuntusu
B) Yaddaş pozuntusu
C) Nitq pozuntusu
D) Diqqət pozuntusu
E) Düşüncə pozuntusu

Ədəbiyyat:R.Şirəliyeva: “Sinir xəstəlikləri”. Bakı 2003. Səh 103

1127) İsterik tutma zamanı tibb işçisinin taktikası:

A) Oksigen verməli
B) Başa buz qoymalı
C) Xəstəni təcili yardım nəqliyyatı ilə xəstəxanaya çatdırmalı
D) Başa hündür vəziyyət verməli
E) Xəstəyə yarıoturaq vəziyyət verməli

Ədəbiyyat:: N .R Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı”. Bakı 1990. Səh.458

1128) Beyinə qan sızan xəstə hansı vəziyyətdə daşınmalıdır?

A) Başa hündür vəziyyət verilməli
B) Gövdənin vəziyyəti tez-tez dəyişdirilməli
C) Başın vəziyyəti dəyişməməli, sabit saxlanmalı
D) Ayaqları yuxarı qaldırılmalı
E) Başın vəziyyəti tez-tez dəyişdirilməli

Ədəbiyyat:Z.Salayeva: “Sinir xəstəlikləri”. Bakı 1983. Səh 58

1129) Alkoqolla zəhərlənmə zamanı ilk təxirəsalınmaz yardım :

A) Sıxıcı paltarlardan azad etmək
B) Ayaqlarına isitqac qoymaq
C) Zond vasitəsilə mədənin yumaq, qarın işlədici duzlar vermək, sürətləndirilmiş diurez

Ofis-kaz ödənişsiz istifadə üçün

D) Başına buz qoymaq
E) Təmiz havaya çıxartmaq

Ədəbiyyat:N .R Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı ”. Bakı 1990. Səh 567

1130) Böyrək patologiyası olan xəstələrə hansı qrup preparatları təyin etmək olmaz?

A) Penisillinlər
B) Tetrasiklinlər
C) Aminoqlikozidlər
D) Ftorxinolonlar
E) Uroseptiklər

Ədəbiyyat:: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 479

1131) Eşitmə sinirin nevriti zamanı hansı preparatı təyin etmək olmaz?

A) Streptomisin
B) Pefloksasin
C) Oksasillin
D) Penisillin
E) Eritromisin

Ədəbiyyat:E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 480

1132) Hansı preparatı hamilə qadınlara təyin etmək olmaz?

A) Oksasillin
B) Penisillin
C) Streptomisin
D) Pefloksasin
E) Ampisillin

Ədəbiyyat:: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 480

1133) Rifampisin preparatını qəbul etdikdə sidik hansı rəngə boyanır.

A) Göy
B) Narıncı
C) Qara
D) Yaşıl
E) Qırmızı

Ədəbiyyat:A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 321

sask.az ödənişsiz istifadə üçün

1134) Pnevmokok pnevmoniyanın müalicəsi zamanı effektlidir.

A) Penisillin
B) İzoniazid
C) Sulfadimetoksin
D) Furadonin
E) Furozalidon

Ədəbiyyat:A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 302

1135) Bronxial astma tutmaların profilaktikası üçün istifadə edilir.

A) Salbutamol
B) Prednizolon
C) İntal
D) Astmopent
E) Epinefrin(Adrenalin)

Ədəbiyyat:: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 203

1136) Bronxial astma xəstəliyin müalicəsi zamanı istifadə edilən inhalyasion qlükokortikosteroid hansıdır?

A) Astmopent
B) Beklametazon
C) Adrenalin
D) Berotek
E) Salbutamol

Ədəbiyyat:: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 267

1137) İnhalyasion qlukokortikosteroidlərin əlavə təsirini göstərin

A) Parez
B) Addison xəstəliyi
C) Ağız boşluğunun kandidomikozu
D) Miasteniya
E) Nistaqm

Ədəbiyyat:: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 267

1138) Astmatik status zamanı istifadə edilən preparat.

A) Astmopent
B) Berotek
C) Salbutamol

tek.az ödənişsiz istifadə üçün

D) İntal
E) Prednizolon

Ədəbiyyat:: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 270

1139) Revmatizmin profilaktikası məqsədilə hansı preparat istifadə edilir?

A) Oksasillin
B) Gentamisin
C) Bisillin
D) Tetrasiklin
E) Rifampisin

Ədəbiyyat:: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 305

1140) Hipertoniya xəstəliyin müalicəsi zamanı istifadə edilən AÇF(adenozin çevirici fermentin inhibitoru) preparatı göstərin.

A) Bendazol(Dibazol)
B) Enalapril
C) Papaverin
D) Penisillin
E) Raunatin

Ədəbiyyat:: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 259

1141) Hipertoniya xəstəliyin müalicəsi zamanı istifadə edilən angiotenzin- I reseptorların blokatoru hansıdır?

A) Klofelin
B) Furosimid
C) Dibazol
D) Kofein
E) Valzartan

Ədəbiyyat:E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 259

1142) Hipertoniya xəstəliyin müalicəsi zamanı istifadə edilən kalsium ionlarının antaqonisti hansıdır?

A) Rausedil
B) Enalapril
C) Klofelin
D) İzoptin
E) Kaptopril

Ədəbiyyat:A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 129

smk.az ödənişsiz istifadə üçün

1143) Hipertoniya xəstəliyin müalicəsi zamanı istifadə edilir?

A) Diuretiklər
B) Qlukokortikosteroidlər
C) Sitostatiklər
D) Uroseptiklər
E) Bronxolitiklər

Ədəbiyyat:E.Ağayev, İ.Rəhimov "Farmakologiya". Bakı 2005. Səh 260

1144) AÇF(adenozin çevirici fermentin) inhibitorların hansı preparat aiddir?

A) İzoptin
B) Kaptopril
C) Anaprilin
D) Valzartan
E) Raunatin

Ədəbiyyat:: E.Ağayev, İ.Rəhimov "Farmakologiya". Bakı 2005. Səh 257

1145) Antiaterosklerotik preparatı göstərin.

A) Nitroqliserin
B) Anaprilin
C) Dibazol
D) Nitronq
E) Simvastatin

Ədəbiyyat:: E.Ağayev, İ.Rəhimov "Farmakologiya". Bakı 2005. Səh 265

1146) Antiaritmik preparatı göstərin.

A) Nitroqliserin
B) Raunatin
C) Lidokain
D) Dibazol
E) Papaverin

Ədəbiyyat:: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov "Farmakoterapiyanın əsasları". Bakı 2001. Səh 93

1147) Nitroqliserinin təsiri neçə dəqiqədən sonra başlayır?

A) 10-15 dəq
B) 1-2 dəq.
C) 15-20 dəq.
D) 35-40 dəq
E) 20-30 dəq.

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 125

1148) Nitroqliserinin əlavə təsiri hansıdır?

A) Baş ağrıları, hipotenziya
B) Koronar arteriyaların genişlənməsi
C) Artan diurez
D) Ürəkbulanma, qusma
E) Koronar arteriyaların daralması

Ədəbiyyat:: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 125

1149) Miokardın infarktı zamanı trombolitik terapiya üçün istifadə edilən preparat hansıdır?

A) Streptokinaza
B) Dibazol
C) Morfin
D) Baralgin
E) Analgin

Ədəbiyyat:A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 222

1150) Neyroleptanalgeziya zamanı istifadə edilən preparatları göstərin.

A) Morfin, atropin
B) Validol, nitroqliserin
C) Analgin, baralgin
D) Fentanil, droperidol
E) Heparin,klofelin

Ədəbiyyat:E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 169

1151) Miokard infarktın müalicəsində istifadə edilən birbaşa (düz) təsirli antikoaqulyant hansıdır?

A) Heparin
B) Fentanil
C) Morfi
D) Nitroqliserin
E) Promedol

Ədəbiyyat:: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 218

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

1152) Heparindən artıq dozada istifadə etdikdə hansı fəsad baş verir?

A) Hemorragiya
B) Piuriya
C) Nikturiya
D) Dizuriya
E) Anuriya

Ədəbiyyat:: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov "Farmakoterapiyanın əsasları". Bakı 2001. Səh 219

1153) Hipotiazidin qəbul qaydası necə olmalıdır?

A) Günorta
B) Kalium preparatları ilə səhər
C) Axşam
D) Kalium preparatları ilə axşam
E) Səhər

Ədəbiyyat:: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov "Farmakoterapiyanın əsasları". Bakı 2001. Səh 167

1154) Simetidin hansı qrup preparatlara aiddir?

A) Adrenomimetiklərə
B) Spazmolitiklərə
C) Analgetiklərə
D) H2 histaminblokatorlara
E) Xolinolitiklərə

Ədəbiyyat:E.Ağayev, İ.Rəhimov "Farmakologiya". Bakı 2005. Səh 284

1155) Atropinlə zəhərlənmə zamanı baş verən əlamətlər hansılardır?

A) Göz bəbəklərin genişlənməsi
B) Baş ağrıları
C) Nistaqm
D) Zəiflik
E) Göz bəbəklərin daralması

Ədəbiyyat:E.Ağayev, İ.Rəhimov "Farmakologiya". Bakı 2005. Səh 106

1156) Öd kisəsi daşlarını əridici xüsusiyyəti olan preparat hansıdır?

A) Atropin
B) Xolosas
C) Kontrikal
D) Ursofalk
E) Panzinorm

sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat:A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 187

1157) Pielonefritin müalicəsində istifadə edilən uroseptik hansıdır?

A) Ursofalk
B) Baralgin
C) Neviqramon
D) Laziks
E) Heparin

Ədəbiyyat:A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 336

1158) Dimedrolun əlavə təsiri nədir?

A) Saçın tökülməsi
B) Aclıq
C) Yuxu gətirici
D) Qəbizlik
E) Piylənmə

Ədəbiyyat:: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 433

1159) Dəri dermatozların müalicəsində istifadə edilən preparatlar hansılardır?

A) Antihistaminlər
B) Antibiotiklər
C) Sitostatiklər
D) Dezaqreqantlar
E) Diuretiklər

Ədəbiyyat:: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 432

1160) Qlukokortikosteroidlərin əlavə təsiri hansıdır?

A) Hipotenziya
B) Ödem əmələ gətirmə
C) Bronxospazm
D) Hiperrefleksiya
E) Yuxugətirici

Ədəbiyyat:E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 379

1161) Ürək qlikozidləri ilə zəhərlənmə zamanı istifadə edilən antidot hansıdır?

A) Aktiveşdirilmiş kömür
B) Unitiol
C) Papaverin

Şərqə az ödənişsiz istifadə üçün

D) Nalorfin
E) Bemeqrid

Ədəbiyyat:E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 384

1162) Revmatoid artridlərin müalicəsində istifadə edilən əsas preparatları göstərin.

A) İltihab əleyhinə preparatlar
B) Antiaqreqantlar
C) Antibiotiklər
D) Diuretiklər
E) Ürək qlikozidləri

Ədəbiyyat:: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 412

1163) Dərinin funksiyasına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) İstilik tənzimləmə
B) D vitamininin sintezi
C) Piqment əmələgətirmə
D) İmmun müdafiə
E) Hormonal tənzimləmə

Ədəbiyyat: Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 12)

1164) Dərinin hansı sahələrində piy vəziləri mövcud deyil?

A) Başın tüklü hissəsi
B) Sifət
C) Ətraflar
D) Ovuc və ayaqaltı
E) Gövdə

Ədəbiyyat: Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 11)

1165) Köpüşük nədir?

A) Kiçik qovuqcuqdur
B) Epidermisin defektidir
C) Qaşınmanın nəticəsində əmələ gəlir
D) Dəri şişidir
E) Birincili morfoloji elementdir

Ədəbiyyat: Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 18)

1166) Dərinin elastikliyini itirməsi nəticəsində aşağıdakılardan hansı əmələ gəlir?

A) Yara

sesk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Qartmaq
C) Çat
D) Kəpək
E) Eroziya

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 22)

1167) Qartmaq nədir?

A) Dəri qüsuru
B) Epidermisin buynuz qatından qopan hüceyrələr
C) Qurumuş ekssudat
D) Dəri şəklinin (cizgisinin) hamarlanması
E) Dəri şəklinin (cizgisinin)kəskin dəyişməsi

Ədəbiyyat: Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 20)

1168) Epidermis və derma arasında az miqdarda maye toplanması ilə xarakterizə olunur?

A) Düyüncük
B) Köpüşük
C) Qovuqcuq
D) Ləkə
E) Qabarcıq

Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1. (səh. 123)

1169) Eroziya hansı səpgilərdən sonra əmələ gələ bilər:

A) Köpüşük, ləkə
B) Qovuq, qabarcıq
C) Düyün, düyüncük
D) Qovuqcuq, pustul
E) Ləkə, düyün

Ədəbiyyat:Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1. (səh. 123)

sinaq.az ödənişsiz istifadə üçün

1170) Dəri xəstəliklərinin müalicə üsullarına aiddir:

A) Diatermokaoqulyasiya
B) Elektrakardioqrafiya
C) Appendektomiya
D) Qastroskopiya
E) Endoskopiya

Ədəbiyyat:Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1. (səh. 157)

1171) Kəpəklənən (rəngbərəng) dəmrov üçün xarakterikdir:

A) Müsbət yod sınağı
B) Eritema
C) İntensiv qaşınma
D) Eroziyalar
E) Hemmorragik ləkələr

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 106)

1172) Dərinin göbələk xəstəliyinə aid olmayan xəstəlik:

A) Mikrosporiya
B) Ayaqların mikozu
C) Rubromikoz
D) Trixofitiya
E) Övrə

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 51)

1173) Başın tükləri dərinin hansı göbə¬lək xəstəliklərində zədələnə bilməz:

A) Favus
B) Dərin trichophytiya
C) Rəngbərəng (əlvan) dəmrov
D) Mikrosporiya
E) Səthi trichophytiya

Ədəbiyyat:Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1. (səh. 295)

1174) Mikrosporiyanın diaqnozu üçün hansı müayinə metodu istifadə olunur?

A) Yod sınağı
B) Vasserman reaksiyası
C) Qanın ümumi analizi
D) Lüminissent lampası metodu

sek.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Qanın serologı reaksiyası

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990. (səh 107)

1175) Mikozların əmələ gəlməsində aşağıdakılardan hansı rol oynamır?

A) Dar ayaqqabı geymək
B) Sulfanilamid preparatların qəbulu
C) Ümumi hamamda cimmək
D) Ayaqların çox tərləməsi
E) Başqasının corabını geymək

Ədəbiyyat: Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 104)

1176) Başın tüklü hissəsinin göbələk xəstəliyinin müalicəsində təyin olunur:

A) Flusinar
B) Unna kremi
C) Mikoseptin
D) Vilkinson məlhəmi
E) Qrizeofulvin

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 113)

1177) Dərinin göbələk xəstəliyinin əmələ gəlməsində rol oynamır:

A) Şəkərli diabet
B) Antibiotiklərin, kortikosteroidlərin qeyri düzgün qəbulu.
C) Hipovitaminoz
D) İbtidailər
E) Patogen göbələklər

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 105)

1178) Favus (keçəllik) xəstəliyinin klinik əlaməti hansıdır?

A) Seroz qovucuqlar
B) Köpüşüklü səpkilər
C) Follikulyar aparatın atrofiyası
D) Eroziyalar
E) İntoksikasiya

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh.112)

snskaz ödənişsiz istifadə üçün

1179) Dərinin göbələk xəstəliklərinin hansı növündə ağızın selikli qişaları zədələnir?

A) Mikrosporiya
B) Kandidoz (süd yarası)
C) Qasıq epidermofitiyası
D) Ayaqların mikozu
E) Trichophytiya

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh.121)

1180) Pedikulyoz törədicisinin hansı mikroorqanizmlərə aid olduğunu göstərin?

A) Göbələklər
B) Bakteriyalar
C) Fotobakteriyalar
D) Viruslar
E) Parazitlər

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh.134)

1181) Kəmərləyici dəmrova xas olan xüsusiyyət hansıdır?

A) Gecə qaşınması
B) Bakteriyalar törədir.
C) Simmetrik papulalar
D) Ağrı sindromu
E) Tükləri zədələyir

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh.141)

1182) Ziyillərin müalicəsində istifadə edilmir?

A) Elektrokoaqulyasiya
B) Dapson
C) Krioterapiya
D) Podofillin
E) Hipnoz

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh.144)

1183) Sadə herpesin müalicəsində daha effektlidir:

A) Penisillin inyeksıyası
B) Diklofenak məlhəmi
C) Sintomisin emulsiyası
D) Flusinar məlhəmi

Şəxsi az ödənişsiz istifadə üçün

E) Asiklovir məlhəmi

Ədəbiyyat: Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 88)

1184) Aşagıda göstərilən xəstəliklərdən hansı virus etiologiyalı deyil:

A) Yoluxuçu molyusk
B) Ziyillər
C) Mikrosporiya
D) Sadə herpes
E) Kəmərləyiçi dəmrov

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 107)

1185) Sadə herpes üçün daha xarakterik olan səpgi elementlərini göstərin:

A) Qovuqcuq, eroziya, seroz qartmaq
B) İrincik, qartmaq
C) Pustula, yara, irinli qartmaq
D) Qabarçıq, eroziya, hemorragik qartmaq
E) Düyünçük, qabıq, piqmentasiya

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 138)

1186) İnfeksion molyusk hansı yolla keçir:

A) Alimentar yolla
B) Hava-damcı yolu ilə
C) Cinsi yolla
D) Hemotransfuziya zamanı
E) Anadan uşağa doğuş vaxtı

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 144)

1187) Vulqar (adi) sızanaqların lokalizasiya yerlərini göstərin:

A) Dodağın qırmızı haşiyəsi və ağızın selikli qişası
B) Üz, sinə və kürək
C) Cinsiyyət orqanların dərisi və selikli qişası
D) İri və xırda büküşlər
E) Əl və ayaq barmaqları

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 74)

ynska az ödənişsiz istifadə üçün

1188) Furunkulun xarici müalicəsində tətbiq olunmur:

A) Sintomisin məlhəmi
B) Eritromisin məlhəmi
C) Gentamisin məlhəmi
D) İxtiol məlhəmi
E) Kükürd məlhəmi

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 86)

1189) Dərman qrupundan hansı toksikodermiyaya səbəb olmur?

A) Kortikosteroidlər
B) Sulfanilamidlər
C) Pirazolon preparatları
D) Salisilatlar
E) Antibiotiklər

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 42)

1190) Atopik dermatitin əlamətləri ən çox hansı yaşda rast gəlinir?

A) Bir yaşlı uşaqlarda
B) Anadangəlmə
C) Məktəb yaşında
D) Bir aylıq uşaqlarda
E) Məktəbəqədər yaşda

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 46)

1191) Atopik dermatitin müalicəsində hansı preparatlar tətbiq olunmur:

A) Sitostatiklər
B) Sedativlər
C) Kortikosteroidlər
D) Antihistaminlər
E) Qaşınma əleyhinə dərmanlar

Ədəbiyyat:Рациональная фармакотерапия, заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем. Руководство для практикующих врачей. Под редакцией А.А.Кубановой, В.И.Касиной, М., Литтерра, 2005. (səh. 248)

1192) Təmas dermatitində qıcıqlandırıcı dəriyə hansi yolla keçərək təsir edir:

A) Hematogen yolla
B) Ağ ciyərlərdən
C) Dərialtı piy qatından

Sınaq.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Epidermisdən
E) Limfogen yolla

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 38)

1193) Kəskin övrənin klinik əlamətlərinə hansı aid deyil:

A) Köpüşüklər
B) Kəpəklənmə
C) Nevrotik vəziyyət
D) Qarında ağrı
E) Dəri qaşınnması

Ədəbiyyat:Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.2. (səh. 98)

1194) Vezikul (qovuqcuq) əmələ gəlməsi və sulanma xarakterikdir:

A) Follikulitə
B) Ekzemaya
C) Furunkula
D) Dermatitə
E) Psoriaza

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 43)

1195) Ekzema xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunmur:

A) Tinidazol
B) Natrium tiosulfat
C) Klaritin
D) Prednizolon
E) Kalsium qlukonat

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 43)

1196) Səpgi elementinin 3 qat olması ilə seçilir:

A) Psoriaz
B) Herpesşəkilli dermatit
C) Vulqar pemfiqus
D) Vulqar sızanaqlar
E) Ekzema

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 65)

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

1197) Qırmızı yastı dəmrova aid deyil:

A) Bir sıra dərmanların qəbulundan əmələ gələ bilər
B) Qaşınma və nevrotik vəziyyət xarakterikdir.
C) Uikxem toru mövcud olur.
D) Papulaları tipik formaya malikdir.
E) Tipik lokalizasiyası- başın tüklü hissəsidir

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 64)

1198) Dəri vərəminin mütləq diaqnostik əlamətlərinə aiddir:

A) Vərəm mikobakteriyalarının aşkar olunması
B) Müsbət mantu reaksiyası
C) “Zond” sindromu
D) Xəstənin əvvəllər ağ ciyər vərəmi keçirməsi
E) “Alma jelesi” sindromu

Ədəbiyyat:Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1. (səh. 355)

1199) Qovuqlu dermatozlara aid deyil:

A) Rozeolyoz pemfiqus
B) Vegetasiya edən pemfiqus
C) Eritematoz pemfiqus
D) Vulqar pemfiqus
E) Yarpaqşəkilli pemfiqus

Ədəbiyyat:Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.2. (səh. 247)

1200) Sifilis xəstəliyinin törədicisi hansıdır?

A) Candida albicans
B) Leyşmaniya tropica
C) Sporothrix schenki
D) Treponema pallidum
E) Pitrosporum orbiculare

Ədəbiyyat: Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 159)

1201) Sifilis xəstəliyinin mütləq diaqnostikasına aiddir?

A) Anamnez məlumatları
B) Solğun treponemanın mikroskopik aşkar olunması
C) Klinik əlamətlər

ofek.az İdənişsiz istifadə üçün

D) Seroloji reaksiyalar
E) Limfa vəzilərinin müayinəsi

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 197)

1202) Sifilisin spesifik müalicəsi əsasən aparılır:

A) Tetrasiklin sırası preparatlarla
B) Sefalosporin sırası preparatlarla
C) Makrolidlərlə
D) Benzilpenisillin və ya onun uzunmüddətli preparatları ilə
E) Penisillinin sintetik preparatları ilə

Ədəbiyyat:Рациональная фармакотерапия, заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем. Руководство для практикующих врачей. Под редакцией А.А.Кубановой, В.И.Касиной, М., Литтерра, 2005. (səh. 510)

1203) Sifilisin diaqnostikasında aşağıdakılardan hansı istifadə olunmur?

A) Spesifik yod sınağı
B) Vasserman reaksiyası
C) Seroloji reaksiyalar kompleksi
D) Solğun treponemlərin immobizasiyası (RİBT)
E) İmmunoflorensiya (RİF)

Ədəbiyyat: Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 198)

1204) Sifilis haqqında səhv fikir:

A) Sifilisin II dövründə rozeola müşahidə olunur
B) Sifilisin IV dövründə yumşaq şankr müşahidə olunur
C) Sifilisin III dövründə qumma müşahidə olunur
D) Eritromisin sifilisin rezerv müalicə dərmanlarına aiddir
E) Sifilisin I dövründə bərk şankr müşahidə olunur

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 182)

1205) Qonoreyanın inkubasiya dövrü

A) Orta hesabla 17-19 gün
B) Orta hesabla 3-5 gün
C) Orta hesabla 7-9 gün
D) Orta hesabla 11-13 gün
E) Orta hesabla 21-23 gün

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 215)

sirk üçün ödənişsiz istifadə

1206) Trixomoniazın müalicəsində hansı preparatlar daha təsirlidir?

A) Sulfanilamidlər qrupu
B) Penisillin sırası antibiotiklər
C) Salisilatlar
D) Makrolid -antibiotiklər
E) Metronidazol qrupu

Ədəbiyyat:Рациональная фармакотерапия, заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем. Руководство для практикующих врачей. Под редакцией А.А.Кубановой, В.И.Касиной, М., Литтерра, 2005. (səh. 576)

1207) Xlamidiozun müalicəsində daha təsirli müalicə vasitəsi hansıdır?

A) Levamizol
B) Azitromisin (eritromisin)
C) Penisillin
D) Seftriakson
E) Metronidazol

Ədəbiyyat:Рациональная фармакотерапия, заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем. Руководство для практикующих врачей. Под редакцией А.А.Кубановой, В.И.Касиной, М., Литтерра, 2005. (səh. 542)

1208) Xüsusi dermotoloji müayinələrə aid deyil:

A) Lüminist diaqnostika
B) Yod sınağı
C) Pasternatski simptomu
D) İzomorf reaksiya alınması
E) Nikolski simptomu

Ədəbiyyat: Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 60, 65, 107, 141)

1209) Dərinin bədxassəli şişi deyil:

A) Ekstramamilyar xərçəng
B) Adenoma
C) Sarkoma
D) Epitelioma
E) Melanoma

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 79)

1210) Səpgi elementi qovuq və ya qovuqcuq deyil:

onek.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Gec anadangəlmə sifilis
B) Erkən anadangəlmə sifilis
C) Herpes
D) Pemfiqus
E) Ekzema

Ədəbiyyat:Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 194)

1211) QİÇS zamanı tez-tez rast gəlinən dəri şişi hansıdır?

A) Adenoma
B) Kaposi sarkoması
C) Melanoma
D) Eksramammilyar xərçəng
E) Seboreyalı diskeratoz

Ədəbiyyat: Б.И.Зудин.Кожные и венерические болезни. Москва-«Медицина» 1990 (səh. 79)

1212) Qonoreyanın spesifik müalicəsində tətbiq olunur:

A) Antibiotiklər
B) Vitaminlər
C) Antiparazitar preparatlar
D) Salisilatlar
E) Pirogen preparatlar

Ədəbiyyat:Рациональная фармакотерапия, заболеваний кожи и инфек¬ций, передаваемых половым путем. Руководство для практику¬ющих врачей. Под редакцией А.А.Кубановой, В.И.Касиной, М., Литтерра, 2005. (səh. 531)

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün