Laboratoriya işi ixtisası üzrə test tapşırıqları

25.01.2024

1) Mədəaltı vəzinin diaqnostikasının biokimyəvi göstəricilərindən biri olan lipazanın aktivliyinin fizioloji artmasına səbəb olan dərman preparatlarını müəyyən edin:

A) İnsulin, furosemid

B) Xolinergik maddələr, etanol

C) Etanol, fenitoin

D) Kodein, narkotik maddələr

E) Amfoterisin B, kalsiferol

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

2) Hepatositlərin zədələnməsi nəticəsində qanda sitoplazmatik fermentlərin sekresiyası artmışdır:

A) Qlutamatdehidrogenaza, qələvi fosfataza

B) Alaninamintransferaza, laktatdehidrogenaza

C) Qlutamatdehidrogenaza, kreatinfosfokinaza

D) Aspartatamintrasferaza, qlutamatdehidrogenaza

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Kreatinfosfokinaza, qələvi fosfataza

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

3) De-Ritis əmsalı nədir və qaraciyər zədələnmələri zamanı qiyməti müvafiqdir:

A) ALT/QQT; ≤1

B) ALT/AST; ≤1

C) AST/ALT; ≥1

D) AST/ALT; ≤1

E) ALT/AST; ≥1

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

4) Hamilələrin qan serumunda qələvi fosfataza fermentinin aktivliyinin aşağı olması:

A) plasentanın tam inkişafını müəyyən edir;

B) progesteronun sekresiyyasının artmasını göstərir

C) kontraseptiv dərman preparatlarından uzun müddət istifadə edildiyini müəyyən edir;

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) plasentanın natamam inkişafını müəyyən edir;

E) estrogen hormonunun sekresiyyasının artmasını bildirir

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

5) Hemolitik sarılığa aid olmayan ifadə:

A) sidikdə sterkobilin artır

B) sidikdə bilirubin aşkarlanmır

C) eritrositlərin kütləvi parçalanması nəticəsində əmələ gəlir

D) qanda düz bilirubinin miqdarı artır

E) qanda vasitəli bilirubinin miqdarı artır

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

6) Enzimopatik sarılıqda hemolitik sarılıqda fərqli olaraq:

A) qlukuroniltransferaza fermentinin fəallığı artır; xolemiya müşahidə edilir

B) bilirubinuriya müşahidə edilir; qeyri-düz bilirubinin qatılığı artır

C) qlukuroniltransferaza fermentinin fəallığı azalır;qələvi fosfatazanın fəallığı artır

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) qlukuroniltransferaza fermentinin fəallığı azalır; qeyri-düz biliru¬bininqatılığı azalır

E) bilirubinuriya müşahidə edilir; düzbilirubininqatılığı artır

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

7) Doğru fikri müəyyən edin:

A) hemoxromatozlar zamanı ferritinin qanda miqdarı 500 mkq/l-dan aşağıdır

B) qanda ferritinin az miqdarda olması orqanizmdə çoxlu miqdarda dəmirin ehtiyat halında toplandığını göstərir

C) kəskin mieloblast leykoz zamanı qanda ferritinin konsentrasiyası azalır

D) ferritin kəskin faza zülallarına daxil deyil

E) limfoqranulamatozlar və qaraciyər şişləri zamanı qanda ferritinin konsentrasiyası yüksəlir;

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

8) Kobalamin kofermentlərinin çatışmazlığı nəticə¬sin¬də hansı metabolizm pozulmaları törənirlər?

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

A) metioninin, neytral piylərin və fosfolipidlərin sintezinin pozulması, qaraciyərin piy infiltrasiyası

B) metioninin, xolinin və fosfolipidlərin sintezinin pozulması, böyrəklərin piyinfiltrasi¬yası

C) metioninin məsnimsənilməsinin və lipidlərin sin¬tezinin pozul¬ma¬sı, qaraciyərin piy infiltrasiyası

D) metioninin, xolinin və piy turşuların sintezinin pozulması, qaraciyərin piy infiltrasiyası

E) metioninin çatışmazlığı, xolinin və sfinqomielinlərin sin¬tezinin pozulması, qaraciyərin piy infiltrasiyası

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

9) Sağlam insanın qanında albumin, qlobulin, fibrinogenin miqdarı müvafiqdir:

A) 35-50 q/l, 2-4 q/l, 2,0-3,0 q/l

B) 35-50 q/l, 2,0-3,5 q/l, 2-4 q/l

C) 20-30 q/l, 1-2 q/l, 1-2 q/l

D) 65-85 q/l, 2-3,5 q/l, 1-2 q/l

E) 2,0-3,0 q/l, 35-50 q/l, 2-4 q/l

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

10) Hiperproteinemiyanın səbəbi:

1. müxtəlif böyrək mənşəli patologiyalar zamanı;

2. kəskin infeksiyalar zamanı;

3. virus hepatitlərinin sağalma mərhələsində;

4. uzunmüddət kortikosteroidlərlə müalicə zamanı;

5. aktiv fiziki iş zamanı

A) 2, 3, 5

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 1, 4, 5

E) 2, 3, 4

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

11) Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Disproteinemiya;

2. Paraproteinemiya.

a. zülal fraksiyalarının nisbətinin dəyişilməsi;

b. zülal fraksiyalarının nisbətinin artması;

c. qanda anomal zülalların aşkarlanması;

sınaq az ödənişsiz istifadə üçün

d. qanda transferinin aşkarlanması

A) 1-a; 2-c

B) 1 a, d; 2-b

C) 1-b, c; 2-a

D) 1- c, d; 2-a

E) 1-a, b; 2-c, d

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

12) α-1-antitripsinə aid yalnış mülahizə:

A) qanda tripsinin aktivliyini 90% azaldır

B) qanda tripsinin aktivliyini 10% azaldır

C) katepsinlərin inhibitorudur

D) qlikoproteid təbiətlidir

E) qaraciyərdə sintez olunur

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

13) Seruloplazminin metabolizm xüsusiyyətlərinə aiddir:

a. oksidaza aktivliyinə malikdir.

b. α-1-qlobulin fraksiyasının zülalıdır

c. dəmirin metabolizmində iştirak edir.

d. qaraciyərdə sintez olunur.

e. Zn asılı metalloproteindir.

A) c, d, e

B) a, c, d

C) a, b, e

D) b, c, d

E) a, d, e

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

14) Böyrəklərin qlomerulyar filtrasiyasının sürətinin markeri:

A) kreatinfosfat

B) kreatinin

C) sidik turşusu

D) kreatin

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) qalıq azot

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

15) Böyrəklərin funksional vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün klinik praktikada qanda tədqiq edilir:

A) sidik turşusu, bilirubin

B) bilirubin, kreatinin

C) karbamid, kreatinin

D) sidik cövhəri, kratin fosfat

E) karbamid, kreatinfosfat

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

16) Qanda karbamidin miqdarının azalma səbəbidir:

A) uzunmüddətli aclıq

B) dehidratasiya

C) zülalla zəngin qida qəbulu

D) qlomerulyar filtrasiya sürətinin azalması

snsk.az dənişsiz istifadə üçün

E) hamiləlik

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с. : ил

17) Hamilələrdə karbamidin miqdarının azalması izah olunur:

A) dehidratasiya ilə

B) zülallarla zəngin qidalanma ilə

C) hamiləlik hestozları ilə

D) böyrəklərin qlomerulyar filtrasiya sürətinin artması ilə

E) böyrəklərin qlomerulyar filtrasiya sürətinin azalması ilə

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

18) Qanda karbamidin miqdarının artma səbəbidir:

A) zülalla zəngin olmayan qida qəbulu

B) qaraciyər patologiyaları

C) uzunmüddətli aclıq

D) hamiləlik

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) qlomerulyar filtrasiya sürətinin artması

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

19) Orqanizmdə azot mübadiləsinin vəziyyətini müəyyən edir:

A) qanda sidik turşusunun təyini

B) sidikdə kreatinin təyini

C) sidikdə qalıq azotun təyini

D) sidikdə sərbəst aminturşuların təyini

E) qanda sidik cövhərinin təyini

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

20) Böyrək çatışmazlığının inkişafına səbəb olan amillər:

a. böyrəklərin qan təchizatının azalması

b. böyrək filtrinin zədələnməsi

c. sidiyin xaric olmasının çətinləşməsi

d. böyrəklərin qan təchizatının artması

e. hipotoniya xəstəliyi

sndk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) a, c, e

B) a, b, c

C) a, b, d

D) a, d, e

E) c, d, e

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

21) Uremiya:

A) qanda karbamidin miqdarının azalması

B) qanda kreatinin midarının artması

C) qanda sidik turşusunun miqdarının artması

D) qanda qalıq azotunun miqdarının artması

E) qanda karbamidin miqdarının artması

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

22) Azot balansının qiymətləndirilməsi üçün:

snsk az ödənissiz istifadə üçün

A) gündəlik sidikdə kreatininin təyini

B) qanda sidik turşusunun təyini

C) qanda karbamidin sintezinin aralıq metabolitlərinin qatılığının təyini

D) qanda kreatininin təyini

E) gündəlik sidikdə karbamidin qatılığının təyini

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

23) Azot balansının qiymətləndirilməsi üçün:

A) qanda karbamidin qatılığının təyini

B) gündəlik sidikdə ümumi azotun qatılığının təyini

C) gündəlik sidikdə kreatininin təyini

D) qanda kreatininin təyini

E) qanda sidik turşusunun təyini

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

24) Yetkin insanın qanında hemoqlobin A1 (HbA1) ibarətdir:

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) 2α və 2ε zəncir

B) 2γ və 2β zəncir

C) 2α və 2β zəncir

D) 2ε və 2β zəncir

E) 2α və 2γ zəncir

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

25) Yeni doğulmuşların hemoqlobini ibarətdir:

A) 2α və 2ε zəncir

B) 2γ və 2β zəncir

C) 2α və 2β zəncir

D) 2ε və 2β zəncir

E) 2α və 2γ zəncir

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с. : ил. -Библиогр.

26) Leykositar düstur:

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Qan yaxmasında leykositlərin tərkibində bazofillərin miqdarı

B) Qan yaxmasında leykositlərin tərkibində metamielositlərin miqdarı

C) Qan yaxmasında leykositlərin müxtəlif növlərinin faizlə nisbəti

D) Qan yaxmasında leykositlərin tərkibində eozinofillərin miqdarı

E) Qan yaxmasında eritrositlərin leykositlərə miqdarının faizlə nisbəti

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с. : ил

27) Leykoformulada sola meyillik göstərir:

A) Monositlərin artmasını

B) neytrofillərin cavan formalarının artmasını

C) seqmentnüvəlilərin artmasını

D) Eozinofillərin artmasını

E) Limfositlərin artmasını

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

28) Leykoformulada sağa meyillilik göstərir:

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Limfositlərin artmasını

B) Monositlərin artmasını

C) Eozinofillərin artmasını

D) seqmentnüvəlilərin və poliseqmentnüvəlilərin artmasının

E) neytrofillərin gənc formalarının artmasını

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

29) Leykoformulada sola meyillilik müşahidə edilir:

A) trombositopatiyalarda

B) krupoz pnevmoniyada

C) hipotireozda

D) allergiyalarda

E) hipertireozda

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

30) Aqranulositoz:

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) periferik qanda monositlərin azalmasıdır

B) periferik qanda eritrositlərin azalmasıdır

C) periferik qanda neytrofillərin artmasıdır

D) periferik qanda neytrofillərin tamamilə itməsidir

E) periferik qanda limfositlərin itməsidir

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

31) Vesterqen üsulu ilə təyin olunur:

A) trombokrit

B) leykoformula

C) eritrositlərin çökmə sürəti

D) hematokrit

E) eritrositlərin orta həcmi

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

32) Eritrositlərin çökmə sürəti prosesinin ardıcıllığını müəyyən edin

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

1. aqreqasiya

2. sedimentasiya

3. eritrosit sütuncuqlarının çökməsi

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 2

C) 2, 1, 3

D) 3, 2, 1

E) 3, 1, 2

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

33) Eritrositlərin çökmə sürətinə aid yalnış fikri müəyyən edin:

A) EÇS-i xəstəliyin diaqnostikasında spesifik göstəricidir

B) qan nümunəsinin saxlanma müddəti və laboratoriyanın temperaturu EÇS-nin təyininə təsir göstərir

C) hamiləliyin son aylarında EÇS-in qiyməti maksimumaçatır

D) EÇS-nin təyini Vesterqen və Pançekov üsullarına əsaslanır

E) hematokritin <35%-dən kiçik qiyməti EÇS-nin qiymətinin təhrifinə səbəb olur

sınıq az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

34) Eritrositlərin çökmə sürətinin azalması müşahidə edilir:

A) şiş xəstəlikləri

B) hamiləlik

C) iltihabi xəstəliklər

D) anemiya

E) reaktiv eritrositoz

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

35) Birincili trombositoz müşahidə edilir:

A) mielofibroz zamanı

B) amiloidoz zamanı

C) osteomielit zamanı

D) revmatoid artrit zamanı

E) limfoqranulomatoz zamanı

sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

36) Mieloqramma:

A) uşaqlıq boynundan götürülmüş yaxmanın sitoloji müayinəsidir

B) sidik nümunəsindən hazırlanmış yaxmanın müayinəsidir

C) periferik qan yaxmasında hüceyrə elementlərinin faizlə nisbətidir

D) ağız boşluğunun yaxmasının müayinəsidir

E) onurğa beyni mayesindən götürülmüş yaxmada hüceyrə elementlərinin faizlə nisbətidir

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

37) Klinik praktikada immunelektroforez istifadə edilir:

A) fermentlərin aktivliyinin təyinində

B) revmatoid amillərin təyinində

C) Bens-Cons zülalın təyinində

D) qan qrupun təyinində

E) antistreptolizinin titrin təyinində

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

37) Qanın ümumi analizinə daxildir:

1. hemoqlobinin qatılığı

2. qlükozanın qatılığı

3. fermentlərin aktivliyinin təyini

4. formalı elementlərin miqdarı

5. zülalların qatılığı

6. qanın leykositar düsturu

7. retikulositlərin miqdarı

A) 2, 5, 6, 7

B) 1, 3, 4, 7

C) 2, 3, 6, 7

D) 3, 4, 5, 6

E) 1, 4, 6, 7

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

38) Eritrositlərin əmələ gəlmə ardıcıllığı:

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

1. **qanyaradıcı kök hüceyrələr**
2. **eritroblastlar**
3. **normositlər**
4. **retikulositlər**
5. **eritrositlər**

A) 4-2-3-1-5

B) 4-1-2-2-5

C) 1-4-3-2-5

D) 2-4-3-1-5

E) 3-1-4-2-5

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

39) Qanın formalı elementlərinin sələfi:

A) qranulositlər

B) qan yaranmanın kök hüceyrələri

C) retikulositlər

D) kariositlər

E) monositlər

smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

40) Kök hüceyrədən yetkin eritrositlərin inkişaf ardıcıllığını müəyyən edin:

1. hüceyrədaxili orqanoidlərin itirilməsi

2. bölünmə qabiliyyətinin itirilməsi

3. hüceyrənin ölçüsünün tədricən azalması

4. nüvənin itirilməsi

5. hemoqlobinlə hüceyrənin həcminin tutulması

A) 2-4-3-1-5

B) 1-4-3-2-5

C) 3-4-2-1-5

D) 3-1-4-2-5

E) 4-1-2-2-5

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

41) T limfositlərin əmələ gəlmə ardıcıllığını müəyyən edin:

1. limfoblast

ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

2. sütun limfa hüceyrələri

3. sümük iliyinin qanyaranma hüceyrələri

4. prolimfosit

5. limfosit

A) 3-1-4-2-5

B) 1-4-3-2-5

C) 3-2-1-4-5

D) 4-1-2-2-5

E) 2-4-3-1-5

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

42) Mədəaltı vəzi şirəsinin proteolitik fermentləri və optimum pH arasında uyğunluğu müəyyən edin:

A) pepsin pH: 3,0-3,5; qastriksin pH: 4,0-4,5; rennin pH 1,5-2,5

B) pepsin pH: 1,0-1,5; qastriksin pH: 3,0-4,5; rennin pH 4,0-4,5

C) pepsin pH: 4,0-4,5; qastriksin pH: 3,0-3,5; rennin pH 1,5-2,5

D) pepsin pH: 3,0-3,5; qastriksin pH: 1,5-2,5; rennin pH 4,0-4,5

E) pepsin pH: 1,5-2,5; qastriksin pH: 3,0-3,5; rennin pH 4,0-4,5

snck.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

43) Mədə şirəsinin sekressiyasının stimulə edir:

A) kininlər, enteroqastrin

B) somatostatin

C) histamin, qastrin

D) histidin, sekretin

E) somatostatin, qastrin

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

44) Keton cisimcikləri sidikdə aşkar edilir:

A) sidik daşı xəstəliyində

B) böyrək vərəmində

C) kəskin nefritdə

D) xroniki böyrək çatışmazlığında

E) şəkərli diabetdə

snsk.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

45) Kəskin sistitin diaqnostikasında və müalicəsinin effektivliyinin qiymətləndirilməsində sidik çöküntüsündə müəyyən edilir:

A) böyrək epiteli

B) sistein

C) keçid epiteli

D) yastı epitel

E) leykositlər

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

46) İzotonik dehidratasiya üçün xarakterikdir:

A) hemoqlobin artır , hemotakrit artır, MCV-norma həddi

B) hemoqlobin azalır, hemotakrit artır, MCV-norma həddi

C) hemoqlobin azalır, hemotakrit artır, MCV artır

D) hemoqlobin artır, hemotakrit artır, MCV artır

E) hemoqlobin azalır, hemotakrit azalir, MCV artır

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

47) Hipertonik dehidratasiya üçün xarakterikdir:

A) eritrositlər artır, hemoqlobin azalır, MCV artır

B) eritrositlər artır, hemoqlobin artır, MCV artır

C) eritrositlər azalır, hemoqlobin azalır, MCV azalir

D) eritrositlər azalır, hemoqlobin artır, MCV artır

E) eritrositlər artır, hemoqlobin artır, MCV azalır

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

48) Qlikozilləşmiş hemoqlobin (HbA1) aid doğru mülahizə:

A) nefrotik sindromlu xəstələrdə yüksək olur

B) II tip şəkərli diabetli xəstələrdə yüksək olmur

C) Sağlam şəxlərin qanında aşkarlanır

D) şəkərli diabeti olan xəstələrin qanında aşağı olur

E) qlükozaya qarşı tolerantlığın göstəricisidir

snsk.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

49) C-peptid haqda yalnış mülahizə:

A) sağlam şəxslərdə qida qəbulundan sonra C-peptidin konsentrasiyası yüksəlir

B) C-peptidin yarımparçalanma müddəti insulinə nisbətən çox qısadır

C) insulin və C-peptid qanda bərabər miqdarda sintez olunur

D) C-peptid/insulin nisbəti 5:1-ə müvafiqdir

E) C-peptid insulin anticisimləri ilə çarpaz reaksiyaya daxil olmur

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

50) Qlükaqona aid deyil:

A) 29 aminturşu qalığından ibarət polipeptiddir

B) mədənin α-hüceyrələrində sintez olunur

C) insulinin funksional antaqonistidir

D) sağlam insan qanında norma 20-100 pq/ml-dir

E) mədənin β-hüceyrələrində sintez olunur

snsk.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: (2019) Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие/ Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -720 с

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün