Ftiziatriya

1) Vərəm mikobakteriyaları ilə yoluxma riski yüksək olan uşaqlar qrupuna hansılar aid deyil?

A) Vərəm ocaqlarında yaşayan uşaqlar

B) Vərəm keçirənlər

C) Yarımçıq doğulmuşlar, tez-tez və uzun müddətli xəstələnən uşaqlar

D) Postvaksinal çapığı olmayanlar

E) Vərəm əleyhinə peyvənd almayan uşaqlar

Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Metodik təlimat "Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin qiymətləndirilməsi" Bakı 2006

2) Vərəm əleyhinə peyvənd materialının optimal saxlanma temperaturu neçədir?

A) 4° C

B) 0° C

C) 5° C

D) 2 - 8° C

E) 2° C

snsk.az

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. 7 əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;

Tarix: 06.05.2022 19:11:33

3) Vərəm əleyhinə peyvəndin orqanizmə daxil edilmə yolu hansıdır?

A) Dəri altı

B) Dəri içi

C) Daxilə və buruna

D) Dəri üstü

E) Əzələ daxili

Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

4) Düzgün aparılmış vaksinasiya və revaksinasiyadan sonra dəridə nə qalır?

A) Kelloid çapıq

B) Çapıq

C) Ləkə

D) Ulduzvari çapıq

E) Bütün sayılanlar

Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018

snsk.az

5) Vaksinasiyadan sonra əmələ gələn çapığın ölçüsü neçə mm olmalıdır?

A) 10-15 mm

B) 3-5 mm

C) 2-10 mm

D) 1-3 mm

E) 5-8 mm

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. 6 əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;

6) Sağlam yenidoğulmuşlara VƏP nə vaxt edilir?

A) Həyatının 5-7-ci günü

B) Həyatının 1-ci ayında

C) Həyatının 10-cu sutkasında

D) Həyatının 1-ci sutkasında

E) Həyatının 10-12-ci günündə

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018

7) Vərəm əleyhinə vaksinin açıldıqdan sonra saxlanma müddəti nə qədərdir?

snsk.az

A) 7 saat

B) Bir sutka

C) Müddətsizdir

D) 8 saat

E) 4-6 saat

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. 9 saylı əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;

8) 2 TV ilə Mantu sınağı nə vaxt müsbət sayılır?

A) Papulanın ölçüsü 1-2 mm olarsa

B) Reaksiyanın izi yoxdursa

C) Papulanın ölçüsü 3-4 mm olarsa

D) Papulanın ölçüsü 5 mm və daha böyük olarsa

E) Hiperemiya əmələ gələrsə

Ədəbiyyat: M.B.Qurbanova, Y.Ş.Şıxəliyev, E.N.Məmmədbəyov, M.A.Şıxlinskaya. Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin qiymətləndirilməsi (metodik təlimat) Bakı - 2006

9) Bir yaşa qədər uşaqlarda dəri içərisinə daxil edilən vərəm əleyhinə peyvəndin miqdarı nə qədər olmalıdır?

snsk.az

A) 0.1 ml

B) 1.0 ml

C) 0.2 ml

D) 0.05 ml

E) 0.025 ml

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. 7 saylı əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;

10) Vərəm əleyhinə peyvənd aparılandan sonra ailədə vərəmli xəstə olarsa uşağın izolyasiya müddəti nə qədərdir?

A) 1 ay

B) 5 ay

C) 1 il

D) İzolyasiya vacib deyil

E) 2 ay

Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018

11) Postvaksinal immunitetin müddəti nə qədərdir?

A) Bütün həyat boyu saxlanılır

snsk.az

B) 6 il

C) 2 il

D) 8 ildən artıq

E) 1 il

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

12) Mikobakteriya ifraz edən kontingentin abasilləşməsi göstəricisi necə hesablanır?

A) I qrup dispanser qeydiyyatında olan abasilləşən xəstələrin sayıdır

B) VMB mənfi olan xəstələrin sayının 100-ə hasilinin VMB (+) olan xəstələrin sayına nisbətidir

C) VMB (-) olan xəstələrin bütün kontingentə olan nisbətidir

D) Basilyar qeydiyyatından çıxarılan xəstələrin sayının 100-ə hasilinin kontingentin sayına nisbətidir

E) Cari ildə abasilləşmiş və basilyar qeydiyyatından çıxarılmış xəstələrin sayının 100-ə hasilinin ilin axırında qeydiyyatda olan VMB (+) müsbət olan xəstələrin orta illik sayına olan nisbətidir

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998.

13) Vərəm xəstəliyinin intensiv göstəricisi sayılan xəstələnmə nə deməkdir?

snsk.az

A) 100 min əhaliyə görə ilkin qeydiyyata götürülən fəal xəstələrin sayının əhalinin orta illik sayına nisbəti

B) İlkin xəstələr arasında fibroz-kavernoz vərəmin səviyyəsi

C) İlkin xəstələr arasında ocaqlı vərəmin səviyyəsi

D) İlkin xəstələr arasında "viraj"ın səviyyəsi

E) İlkin xəstələr arasında infiltrativ vərəmin səviyyəsi

Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973. Metodik təlimat "Vərəm xəstəliklərinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları" Bakı 1998

14) Vərəmlə xəstələnmənin intensiv göstəricisi nə deməkdir?

A) İlkin xəstələr arasında fibroz-kavernoz vərəmin səviyyəsi

B) 100 min əhaliyə görə dispanser qeydiyyatında olan fəal xəstələrin sayının əhalinin orta illik sayına nisbəti

C) İlkin xəstələr arasında ocaqlı vərəmin səviyyəsi

D) İlkin xəstələr arasında infiltrativ vərəmin səviyyəsi

E) İlkin xəstələr arasında "viraj"ın səviyyəsi

Ədəbiyyat: С.П.Буренков. Современные принципы противотуберкулезный работы в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Metodik təlimat "Vərəm xəstəliklərinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları" Bakı 1998

15) Vərəmdən ölümün intensiv göstəriciləri hansılardır?

snsk.az

A) İlkin xəstələr arasında infiltrativ vərəmdən ölənlərin səviyyəsi

B) 100 min əhaliyə görə dispanser qeydiyyatında olan fəal xəstələrdən ölənlərin sayının əhalinin orta illik sayına nisbəti

C) İlkin xəstələr arasında səpələnmiş vərəmdən ölənlərin səviyyəsi

D) İlkin xəstələr arasında ocaqlı vərəmdən ölənlərin səviyyəsi

E) İlkin xəstələr arasında fibroz-kavernoz vərəmindən ölənlərin səviyyəsi

Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Metodik təlimat "Vərəm xəstəliklərinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları" Bakı 1998

16) Epidemioloji gərginlik hansı göstəricilərlə izah olunur?

A) İlkin xəstələr arasında fibroz-kavernoz və vərəm meningitinin səviyyəsi

B) İlkin xəstələr arasında "viraj"ın səviyyəsi

C) İlkin xəstələr arasında ocaqlı vərəmin səviyyəsi

D) İlkin xəstələr arasında infiltrativ vərəmin səviyyəsi

E) İlkin xəstələr arasında tuberkulin sınağının "hiperergiya"sının səviyyəsi

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

17) Yoluxma ilə mikobakteriya ifraz edən xəstələrin sayı arasındakı əlaqədə hansı uyğunluq doğru sayılır?

snsk.az

A) 1% yoluxma 50 nəfər mikobakteriya ifraz edən xəstəyə uyğundur

B) 1% yoluxma 100 nəfər mikobakteriya ifraz edən xəstəyə uyğundur

C) 1% yoluxma 150 nəfər mikobakteriya ifraz edən xəstəyə uyğundur

D) 1% yoluxma 150-500 nəfər mikobakteriya ifraz edən xəstəyə uyğundur

E) 1% yoluxma 1000 nəfər mikobakteriya ifraz edən xəstəyə uyğundur

Ədəbiyyat: Р.Барри, Блума. Туберкулез Москва 2002. Д.Ж.Крофтон. Клиника туберкулеза 1996. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

18) İnsanların yoluxma mənbəyi olan heyvanlar hansılardır?

A) Pişiklər və itlər

B) İri buynuzlu qaramal

C) Quşlar

D) Sürünənlər

E) Suda quruda yaşayanlar

Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları" Bakı 2003.

19) Yeniyetmələr üçün vərəmə görə "risk" qruplarına sadalananlardan hansı aid deyil?

A) Rentgenoloji kiçik və böyük qalıq əlamətləri olanlar

B) Vərəm ocağında yaşayanlar

snsk.az

C) Ümumi pediatrik şəbəkədə risk qrupu kimi qeydiyyatda olmayanlar

D) Əvvəlcə lokal vərəm keçirmiş, kliniki sağalanlar

E) Çoxdan yoluxmuşlar

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 2003.

20) Tez-tez xəstələnən uşaq və yenyetmələrin vərəmə görə müayinəsi kimlər tərəfindən aparılır?

A) Ftiziatr

B) Cərrahlar tərəfindən

C) Ftiziatr və pediatr tərəfindən

D) Həkim-terapevt

E) Həkim-mütəxəssis tərəfindən

Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988 в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

21) Miliar vərəminə aid simptomları?

A) Pişik cırmağı

B) Zınqrov

C) Tarelkada kürü

D) Tüstü borusu

snsk.az

E) Qar lopası

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016

22) Epidemioloji cəhətdən gərgin vəziyyət zamanı vərəmlə xəstələnmək təhlükəsi kimlərdə daha çox müşahidə olunurr?

A) Ahıl yaşlılarda

B) Yeniyetmələrdə

C) Uşaq və yeniyetmələrdə

D) Orta yaşlılarda

E) Uşaqlarda

Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov “Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar” dərslik, Bakı 2018.

23) Yarımkəskin hematogen səpələnmiş vərəmdə əmələ gələn kavernalar:

A) Sekvesterləşmiş

B) Alterativ

C) Ştampvari

snsk.az

D) Parafokal

E) Ateromatoz

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56

24) Vərəmlə xəstələnmə üçün risk qrupu aşağıdakılardan hansılar sayılmır?

A) Kasıblar

B) Qaçqınlar

C) Miqrantlar

D) Normal qidalananlar və mənzil məişət şəraiti kafi olanlar

E) Evsizlər

Ədəbiyyat: Д.Ж.Крофтон. Клиника туберкулеза 1996. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

25) Əvəllər vərəm keçirmiş, rentgenoloji qalıq əlamətləri olan adamlarda vərəmlə xəstələnmə ehtimalı sağlam adamlara nisbətən neçə dəfə yüksəkdir?

A) 3 dəfə

B) 2 dəfə

snsk.az

C) 17 dəfə

D) 5-10 dəfə

E) 70 dəfə

Ədəbiyyat: М.С.Греймер. Организация противотуберкулезной службы и диспансеризации детского населения в кн.: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

26) KJB vaksinasiya və revaksinasiya kimlər tərəfindən həyata keçirilir?

A) Ftiziatr tərəfindən

B) Doğum evlərinin işçiləri

C) Ftiziopediatr tərəfindən

D) Ümumi tibbi şəbəkə işçiləri tərəfindən

E) Vərəm dispanserinin işçiləri tərəfindən

Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

27) Sadalananlardan uşaq və yeniyetmələrin vərəm əleyhinə stasionarının əsas vəzifələrinə aid olmayan hansıdır?

A) Sanitar maarif işinin aparılması

B) Diaqnostika

C) Uşaq və yeniyetmələrə dispanser nəzarəti

snsk.az

D) Müalicə

E) Sağlamlaşdırma tədbirləri

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. əlavə 3. Bakı 2001;

28) KJB vaksinasiyası üçün hansı preparat istifadə edilir?

A) Pirke sinağı üçün tuberkulin

B) PPD-L tuberkulini

C) Koxun alt tuberkulini

D) KJB və KJB –M vaksini

E) Standart tuberkulin məhlulu

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr.əlavə 7. Bakı 2001;

29) KJB vaksini hansıdır?

A) Diri mikobakteriyadır

B) Tərkibində mikobakteriyanın elementləri yoxdur

C) Sadalananların heç biri düz deyil

D) Apatogen, zəif virulent KJB ştammı mikobakteriyaları

E) Ölü mikobakteriyalar

snsk.az

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr.əlavə 7. Bakı 2001;

30) Vaksinasiyanın effektsizlik göstəricisi hansıdır?

A) 1-3 mm

B) Çapıq yoxdur

C) 9-10 mm ölçüdə çapığin olması

D) 5-8 mm ölçüdə çapığın olması

E) 4 mm ölçüdə çapığın olması

Ədəbiyyat: В.Н. Кривохиж. Специфицеская профилактика и химиопрофилактика. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr.əlavə 7. Bakı 2001;

31) Aerogen yoluxma zamanı vərəm mikobakteriyalarını ilkin olaraq hansı hüceyrələr fagositoz edir?

A) Eritrositlər

B) Limfositlər

C) Makrofaqlar və neytrofillər

D) II –ci sıra alveolositlər

E) I –ci sıra alveolositlər

smsk.az

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.; E.N.Məmmədbəyov “Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar” dərslik, Bakı 2018.

32) Sağ ağciyərin neçə seqmenti var?

A) 6

B) 7

C) 8

D) 10

E) 2

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

33) Şəhərdə fəal vərəm xəstələrinin müalicə olunduğu çarpayılar il ərzində neçə gün işləməlidir?

A) 360 gün

B) 290 gün

C) 300 gün

D) 320 gün

E) 340 gün

snsk.az

Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988. Metodik təlimat “Vərəm xəstəliklərinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları” Bakı 1998

34) Hansı vərəm ocağı daha təhlükəlidir?

A) Ocaqda hamilə qadın yaşayır, lakin mənzil şəraiti qənaətbəxşdir

B) Ocaqda 2 yaşlı xəstə yaşayır mənzil şəraiti qənaətbəxşdir

C) Ocaqda yaşlı insan yaşayır, mənzil şəraiti qeyri-kafidir

D) Ocaqda uşaq, yeniyetmə və hamilə qadın yaşayır, mənzil şəraiti qeyri-kafidir

E) Ocaqda uşaq,yeniyetmə yaşayır, lakin mənzil şəraiti qənaətbəxşdir

Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

35) Vərəm xəstəliyinin yoluxucu formalarının aşkarlanması üçün tətbiq olunan metodlar hansılardır?

A) Xəstələrin subyektiv və obyektiv şikayətləri

B) Qanın kliniki və biokimyəvi analizləri

C) Mikroskopiya metodu, flotasiya, əkmə

D) Tuberkulindiaqnostika

E) Rentgenoqrafiya və rentgenoskopiya

smsk.az

Ədəbiyyat: Д.Ж.Крофтон. Клиника туберкулеза 1996. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov “Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar” dərslik, Bakı 2018.

36) ÜST-nin tələbinə görə göstərilən kliniki formalardan hansı ağciyərdən kənar vərəmə aiddir?

A) İnfiltrativ vərəm və vərəm artriti

B) Vərəmperikarditi,vərəmplevriti,vərəmlimfadeniti

C) Fibrozkavernoz vərəm,bel fəqərələrinin vərəm osteomieliti

D) Kavernoz vərəm,plevranın empiemasıilə fəsadlaşma

E) Ocaqlı vərəm,ekssudativ plevritilə fəsadlaşma

Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина»1988

37) Fibroz-kavernoz vərəmdə daxili qat necə adlanır?

A) Perifokal iltihab

B) Spesifik fibroz qat

C) Piogen-kazeoz–nekrotik irinli qat

D) Qranulyasiya qatı

E) Qeyri spesifik fibroz qat

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-

snsk.az

157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

38) Fibroz-kavernoz vərəmdə “Ciğır” simptomunun tərkibi nədir?

A) Bronx qidalandırıcı vena

B) Ağciyərin perifokal iltihabi

C) Bronx qidalandırıcı arteriya

D) Kavernaya açılan bronxun endo və peribronxial əlamətləri və limfa yolu

E) Seqmentar bronx

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

39) Vərəmin sputogen yayılması nədir?

A) Limfogen yolla xəstəliyin yayılması

B) Limfobronxogen yayılması

C) Vərəm mikobakteriyaların bəlğəmli öskürəklə bronxun bifurkasiyasina çatır və öskürəkdən sonra nəfəs alanda ağciyərin digər hissəsinə yayılır

D) Diffuziya yolu ilə toxuma daxili yayılması

E) Hemotogen yolla xəstəliyin yayılması

sinsk.az

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

40) Spesifik bronxektaziya nədir?

A) Rentgenoloji bronxektaziya

B) Stafilakok pnevmaniyasında destruktiv boşluq

C) Emfizema və qeyri spesifik bronxektaziya

D) Xroniki vərəm zaman inkişaf etmiş birləşdirici toxumanın fonunda baş vermiş bronxoektatik dəyişikliklərdə mikobakteriyanın tapılması

E) Perifokal iltihab

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

41) Birincili vərəmin ən çox rast gəlinən fəsadı:

A) Plevrit

B) Amiloidoz

ynsk.az

C) Ağciyər ürək çatışmazlığı

D) Spontan pnevmatoraks

E) Ağciyər qanaxması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

42) Spesifik prosesin fəallığının qiymətləndirilməsi zamanı bu kriteriyalardan hansı əsasdır?

A) Tuberkulin sınaqlannın dinamikasına

B) Qanın biokimyəvi göstəriciləri

C) Xəstəliyin kliniki əlamətlərinə

D) Rentgen-tomoqrafık müayinələrin nəticələrinə

E) Sidikdə zülalın olması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

43) Vərəmə yoluxmanın erkən dövründə (viraj) profilaktik müalicə hansı sxem əsasında apanlmalıdır:

sinsk.az

A) 2 ay müddətinə ildə iki dəfə izoniazidlə

B) 3 ay müddətində izoniazidlə

C) 6 ay müddətində izoniazidlə

D) 4 ay müddətində 2 preparatla (İzonazid + rifampisin)

E) 5 ay müddətində ftivazidlə

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstələrinin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi" dərs vəsaiti 2015 səh 140-440; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56

44) Ağciyər kökünün genişlənməsi əksərən bu xəstələrdə olur:

A) Eozinofıl pnevınoniyası

B) Ağciyərin periferik xərçəngi

C) Vərəm intoksikasiyası

D) Bronxopulmonal qrupdan olan döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmi

E) Ağciyərin xoşxassəli törəməsi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda

snsk.az

vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

45) Uşaq və yeniyetmələr arasında vərəm intoksikasiyası üçün xarakterikdir:

A) Yüksək hərarət

B) Mantu sınağının ötən ilə nisbətən 6 mm və daha çox artması

C) Tuberkulin sınağının ilk dəfə müsbət olması

D) Qanhayxırma

E) Tuberkulin sınaqlarının virajı ilə üst-üstə düşən və ya ondan sonrakı illərdə ön plana çıxan funksional dəyişikliklər (bədən hərarətinin subfebril olması, iştahsızlıq və poliadenopatiya) və ümumi intoksikasiya (tez yorulma, qıcıqlanma, halsızlıq, yuxunun pozulması və s.)

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

46) Birincili vərəmdə bronxların hansı total zədələnmir?

A) Diffuz kataral-irinli qeyri spesifik endobronxit

B) Bronxlardakı xoralı və fıstullu proseslər

C) Peribronxit

D) Məhdud kataral endobronxit

E) Bronxlardakı infıltrativ dəyişikliklər

sinsk.az

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

47) Sirroz nədir?

A) Divararalığı üzvlərin yerini dəyişə bilməsi

B) Fibroz dəyişiklik ağciyərin geniş sahəsini əhatə edir, ağciyər toxumasının anatomik qurluşunu və alveolun hava tutumunu pozur

C) Plevrada baş verən dəyişiklik

D) Fibroz toxuma ağciyərdə məhdud yerləşir, alveolun hava tutumunu pozmur

E) Qabırğa arası sahədə dəyişikliyin olması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

48) Spesifik fibroz nədir?

A) Fibroz dəyişiklik iki payı tutur

B) Fibroz dəyişiklik ağciyərdə geniş yayılır

snsk.az

C) Fibroz dəyişiklik bir payı tutur

D) Spesifik fibroz dəyişiklik ağciyərdə məhdud yerləşir və alveolun hava tutumu pozulur

E) Fibroz dəyişiklik iki seqmenti tutur

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

49) Spesifik pnevmoskleroz nədir?

A) Pnevmoskleroz ağciyər vəraminin müxtəlif kliniki formaların geriyə sorulma mərhələsi

B) Qabırğa arası sahələr genişlənir

C) Ağciyərin bütün sahələrini tutur

D) Kəskin tənəffüs çatmazlığı müşahidə olunur

E) Divararalığı üzvləri yerini dəyişir

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

snsk.az

50) “Bronx girəcəyinin ölü vəziyyəti” simptomu hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Bronxun tozlanması

B) Bronxun xərçəngi

C) Bronxun aktinomikozu

D) Bronxun vərəmi

E) Bronxektaziya

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

51) Xəstədə ağciyərdə vərəm ocağı olmadığı halda bəlğəmdə vərəm çöpləri tapılarsa bu hansı üzvün vərəminə aiddir?

A) Bronx və traxeyanın vərəmi

B) Bronxun adenoması

C) Ağciyər exnokoku

D) Bronxun aktinomikozu

E) Bronxun sıxılması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-

sinsk.az

157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

52) İlkin vərəm kompleksi ilə döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəminin differensiasiyası necə apanlır:

A) İmmunoloji dəyişikliklərə əsasən

B) Kliniki simptomokomplekslərə əsasən

C) Rentgenoloji əlamətlərə əsasən

D) Tuberkulinə olan həssaslığa əsasən

E) Hemoqrammada olan dəyişikliklərə əsasən

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

53) Genezinə görə bu kliniki forma birincili vərəm sayılır:

A) Fibroz-kavemoz vərəmi

B) İlkin vərəm kompleksi

C) İnfiltrativ ağciyər vərəmi

D) Səpələnmiş ağciyər vərəmi

E) Ocaqlı ağciyər vərəmi

sinsk.az

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

54) Yaşlı xəstələrdə döş qəfəsi daxili limfa vəzilərinin vərəmi dedikdə nəzərdə tutulur:

A) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin zədələnməsi ilə müşayiət olunan tənəffüs orqanlarının vərəmi

B) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərində lokalizə olunmuş ikincili vərəm

C) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərində lokalizə olunmuş iltihabi proses

D) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəminin residivi

E) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin lokalizə olunmuş birincili və ya ikincili vərəmi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

55) İlkin vərəm kompleksi zamanı bipolyarlıq adətən bu fazada olur:

A) İnfiltrasiya

B) Dağılma

snsk.az

C) Sorulma

D) Səpələnmə

E) Kirəcləşmə

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

56) İlkin vərəm kompleksinin evalyutiv prosesin rentgenoloji mərhələləri:

A) Pevmonik faza, dağlma fazası, Qon ocağının əmələ gəlməsi

B) Dağlma fazası, sirrozun inkişafı

C) Pnevmonik faza, bərkimə fazası, infıltrasiya mərhələsinə keçməsi

D) Pnevmonik faza, sorulma, bərkimə fazaları, Qon ocağının əmələ gəlməsi

E) Pnevmonik faza, dağılma fazası, kavemanın əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

57) Birincili vərəm zamanı infeksiyanın daxil olma yolu:

snsk.az

A) Pis vərdişlər

B) Sputogen

C) Ekzogen

D) Endogen

E) Kontakt

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

58) Birincili vərəmİn həyat üçün ən təhlükəli ağırlaşması:

A) Atelektaz

B) Limfogen və bronxogen səpələnmə

C) Nodulobronxial fistula

D) Plevrit

E) Meningit

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

snsk.az

59) Paraspesifik reaksiyaya aiddir:

A) Spondilit

B) Ponse revmatizmi

C) Koksit

D) Qonit

E) Artrit

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

60) Paraspesifik reaksiyalar qeyd olunur:

A) İkincili vərəmdə

B) Sarkoidozda

C) Silikozda

D) Limfoqranulomatozda

E) Birincili vərəmdə

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda

snsk.az

vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

61) Döş qəfəsi orqanlarının icmal rentgenoqrammasında aşkarlanması mümkün olmayan birincili vərəmin kliniki forması:

A) Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmi

B) Ocaqlı vərəm

C) Vərəm plevriti

D) İlkin vərəm kompleksi

E) Uşaq və yeniyetmələrdə vərəm intoksikasiyası

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

62) Uşaq və yeniyetmələrdə vərəm intoksikasiyasının əlaməti:

A) Öskürək

B) Təngənəfəslik

C) Döş qəfəsində ağrılar

D) Bəlğəm

E) Subfebril hərarət

snsk.az

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

63) Silikotuberkulyoz üçün əsas amil nə sayılır?

A) Vərəm exnokokla yanaşı

B) Vərəm xərçənglə yanaşı

C) Vərəm qabırğaların osteoparozu ilə yanaşı

D) Vərəm xəstəliyi tozlu şəraitdə işləmiş insanda baş verir

E) Vərəm bronxektaziya ilə yanaşı

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

64) Bakterial növlərin persistə etməsi nə dəməkdir?

A) Bakteriyaların dərmana davamlı formaya keçməsi

B) Bakteriyaların məhv olması

C) Bakteriyaların göbələyə çevrilməsi

D) Bakteriyaların çoxalması

snsk.az

E) Bakteriyaların virusa çevrilməsi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

65) Bakteriya növlərinin reversiyası nədir?

A) Bakterial formaya keçməsi

B) Virusa keçməsi

C) Stafilokoka bənzəməsi

D) Göbələyə dəyişməsi

E) Meninqokoka dəyişməsi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

66) Bakteriyaların süzülən formaları hansılardır?

A) göbələyə çevrilməsi

B) Virusa persislə olunmuş formaları (L-forma)

snsk.az

C) Dəyişməyən forması

D) Stafilokoka dəyişməsi

E) Meninqokoka çevrilməsi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

67) L-forma mikobakteriyaların xarici qatında hansı dəyişikliklər var?

A) L-forma mikobakteriya xarici qatında defektlər var

B) L-forma mikobakteriya xarici qatı yalnız qan damarlarından ibarətdir

C) L-forma mikobakteriya xarici qatı qalınlaşmış olur

D) L-forma mikobakteriya xarici qatında defekt yoxdur

E) L-forma mikobakteriyaların xarici qatı olmur

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

68) L-forma mikobakteriyalar ətraf üçün epidemioloji təhlükə nə vaxt yaradır?

snsk.az

A) Heç vaxt epidemioloji təhlükə törətmir

B) Daim epidemioloji təhlükə törədir

C) İnsan üçün təhlükəli deyil

D) Heyvanlar üçün təhlükəlidir

E) Uzun müddətdən sonra reversiya edərək yoluxucu mikobakteriyalara çevrildikdə

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

69) Ilkin vərəm infeksiyasının erkən dövrü üçün 'paraspesfflk reaksiyalar xarakterikdir:

A) Ağciyər atelektazı (rentgenoloji)

B) Qanhayxırma

C) Düyünlü eritema, yumşaq, elastik konsistensiyalı mikropoliadenopatiya sindromu

D) Ağciyərdə destruktiv vərəm

E) Mədə qanaxması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda

snsk.az

vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

70) İlkin vərəm kompleksinin birinci mərhələsidir:

A) Kirəcləşmə

B) İnfiltrasiya

C) Tumoroz

D) Pnevmonik

E) Sorulma

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

71) İlkin vərəm kompleksinin ikinci mərəhələsidir:

A) Pnevmonik

B) Kirəcləşmə

C) İnfiltrasiya

D) Sorulma

E) Tumoroz

snsk.az

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

72) İlkin vərəm kompleksinin proqressivləşməsinə aiddir:

A) Limfohematogen disseminasiyası

B) Bronxial fıstula

C) Amiloidoz

D) Qanaxma

E) Spontan pnevmatoraks

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

73) İlkin vərəm kompleksinin evalyutiv proseslərinin rentgenoloji diaqnostikası:

A) 5 mərhələdə gedir

B) 2 mərhələdə gedir

C) 4 mərhələdə gedir

D) 6 mərhələdə gedir

snsk.az

E) 3 mərhələdə gedir

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

74) Ilkin vərəm kompleksi ilə döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəminin rentgenoloji fərqi:

A) Atelektazın ağciyərdə baş verməsi

B) Vərəm prosesinin bronxopulmonal limfa vəzlərində olması

C) Hiperplaziya olmuş limfa vəzləri ilə ağciyərdəki affekt arasında əlaqənin olmaması

D) Vərəm prosesinin traxeobronxopulmonal limfa vəzlərində olması

E) Hiperplaziya olmuş limfa vəzləri ilə ağciyərdəki affekt arasında limfangitin olması ilkin vərəm kompleksi üçün xarakterikdir

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

75) Limfoqranulamatozun döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmindən fərqi:

snsk.az

A) Prosesin birtərəfli olması

B) Prosesdə destruksiyanın olması

C) Limfa vəzilərinin böyüməsi ikitərəfli olaraq "boru" simptomuna malik olması

D) Ağciyər toxumasında infiltrasiyanın olması

E) Ağciyər kökünün ətrafında intensiv kölgəliyin olması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

76) Miliar vərəm zamanı səpələnmiş ocaqların tipik morfoloji əlamətlərinə nə aid deyil?

A) Ağciyərlərin bütün sahələrini əhatə edən intertsial yerləşmiş ocaqlar

B) Yuxarı pay lokalizasiyalı müxtəlif ölçülü ocaqlar

C) Strukturun eynicinsli olmaması

D) Ocaq ətrafı nəzərəçarpan infiltrasiya

E) Səpələnmiş ocaqların daxilində nekrotik dəyişiklik

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

snsk.az

77) Səpələnmiş vərəmin inkişafı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir:

A) KgV vaksinasiyasının aparılmaması

B) Çəki defisiti

C) Ağciyərlərdə xroniki qeyri-spesifik iltihab

D) Hipertoniya vərəmi

E) Xroniki anemiya

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

78) Səpələnmiş vərəm zamanı xüsusilə bu orqanın zədələnməsi həyat üçün təhlükə yaradır:

A) Onurğa

B) Dalaq

C) Beyinin yumşaq qişası

D) Böyrək

E) Qaraciyər

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov

snsk.az

“Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

79) Bir ağciyərin çoxsaylı ocaqlarla zədələnməsi vərəm mikobakteriyasının bu yolla yayılması zamanı yaranır:

A) Sputogen

B) Bronxogen

C) Limfogen

D) Kontakt

E) Hematogen

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

80) Ağciyərlərdə ikitərəfli simmetrik ocaqlı disseminasiya vərəm mikobakteriyasının bu yolla yayılması zamanı yaranır:

A) Limfogen

B) Sputogen

C) Kontakt

D) Hematogen

sinsk.az

E) Bronxogen

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

81) Miliar vərəm bu formalan var:

A) Tifoid, ağciyər, meningial, septiki

B) Abortiv, fəsadlaşmamış, fəsadlaşmış

C) Birincili, ikincili, üçüncülü

D) Erkən, gecikmiş, xroniki gedişli

E) Təzə, xroniki, yarımkəskin

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

82) Miliar vərəm zamanı:

A) Ocaqların ölçüləri 1-2 mm-dir

B) Ocaqlar polimorfdur

snsk.az

C) Ocaqların ölçüləri müxtəlifdir

D) Ocaqların ölçüləri 3-6 mm-dir

E) Ocaqların ölçüləri 6-10 mm-dir

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

83) Səpələnmiş vərəmdə ocaqların lokalizasiyası:

A) Müalicə fonunda bioloji sağalma ilə qurtaran ocaqlar

B) Ocaqların subplevral lokalizasiyası ilə

C) Ocaqlar ağciyərin ən azı üç seqmentini zədələyir

D) Ağciyərdən kənar orqanların vərəminin formalaşması ilə nəticələnən ocaqlar

E) Ağciyərin aşağı paylarında yerləşir

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56 Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

84) Miliar vərəmli xəstələrdə Perkussiya və auskultasiya zamanı əksər hallarda aşkar olunur:

snsk.az

A) Hər iki ağciyərin aşağı payında qısalmış ağciyər səsi, sərt tənəffüs, krepitasiya

B) Qutu səsi, bronxial tənəffiis

C) Cuzi dəyişiklik, nadir hallarda xırıltılar, perkutor səsin qısalması

D) Kürəkarası nahiyyədə kütləşmiş ağciyər səsi

E) Timpanik ağciyər səsi, sərt tənəffüs, tək-tək kiçik qabarcıqlı yaş xırıltılar

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

85) Miliar vərəmin forması:

A) Septiki

B) Vaskulit

C) Bakteremiya

D) Xroniki

E) Kəskin

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

snsk.az

86) Sağlam insanlarda havanın kondensləşməsi hansı şaxələnmə səviyyəsində başa çatır?

A) Membran bronxlarının başlanğıc şöbələrində

B) Subseqmentar bronxlarda

C) Seqmentar bronxlarda

D) Pay bronxlarıda

E) Tənəffüs bronxlarında

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

87) Rentgenoqrammada hər iki ağciyərin orta və yuxan paylarında ölçüsü 5-10 mm çox saylı kiçik və orta intensivlik, konqlomerat əmələ gətirməyə meylli, qeyri-hemcins strukturlu ocaqlann tapılması vərəmin bu formasını təsdiq edir:

A) Xroniki səpələnmiş vərəm

B) Ocaqlı vərəm

C) Səpələnmiş vərəmin yarımkəskin forması

D) Miliar vərəm

E) Kazeoz sətəlcəm

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda

snsk.az

vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

88) Rentgenoqrammada ağciyər köklərinin "yuyulmuş" kölgəliyi və ağciyər şəklinin zəifləməsi ilə birlikdə rast gəlinən, hər iki ağciyərin bütün sahələrinə yayılmış, ölçüsü 2 mm-dək, kiçik intensivlikli, çox saylı, eynitipli ocaqlann tapılması bu diaqnozu təsdiq edir:

A) Yarımkəskin səpələnmiş vərəm

B) Xroniki səpələnmiş vərəm

C) Ocaqlı vərəm

D) Miliar vərəm

E) Kazeoz sətəlcəm

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

89) Tənəffüs yollarından seliyin ağız boşluğuna nəqlində əsas rolu nə oynayır?

A) Kirpikli epitelinin kirpikciklərinin ehtizazı

B) Seliyin osmotik təzyiqindəki fərq

C) Öskürək

D) Sadalananların hamısı doğrudur

E) Tənəffüs zamanı havanın hərəkəti

sinsk.az

Ədəbiyyat: A.E.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

90) Xroniki səpələnmiş vərəm zamanı ocaqlarm polimorfizmi şərtlənir:

A) Vərəm mikobakteriyasının eyni zamanda hematogen, limfogen, bronxogen yolla yayılması

B) Vərəm mikobakteriyasının eyni zamanda külli miqdarda qana daxil olması

C) Vərəm mikobakteriyasının hematogen və bronxogen yolla yayılmasının birlikdə rast gəlinməsi

D) Vərəm mikobakteriyasının fasiləsiz olaraq qana daxil olması

E) Disseminasiya dalğalarının təkrarlanması

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

91) Ağciyərlərdə disseminasiyalı patologiya olan xəstələrdə adətən döş qəfəsi daxili adenopatiyaya da rast gəlinir:

A) Silikoz zamanı

B) Mikrolitiaz zamanı

C) İntoksikasiya zamanı

sinsk.az

D) Səpələnmiş vərəm zamanı

E) Sarkoidoz zamanı

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov “Vərəm” 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov “Vərəm” dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

92) Bronx ağciyər aparatının kökündə böyümüş limfa düyünləri hansı xəstəliklərdə müşahidə oluna bilər?

A) Vərəm və şişlərdə

B) Ürəyin kəskin işemik xəstəliklərində

C) Xroniki pnevmoniya

D) Kiçik qan dövranında durğunluq zamanı

E) Xroniki bronxitdə

Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016.

93) Vərəmin hansı kliniki formasında ştampvari kavernalar tipik əlamətidir:

A) Miliar vərəmin

B) Yarımkəskin hematogen səpələnmiş vərəmin

C) Səpələnmiş vərəmİn tifoid formasının

snsk.az

D) Səpələmiş vərəmin kəskin formasının

E) Səpələnmiş vərəmin xroniki formasının

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

94) Səpələnmiş ağciyər vərəminin yayılma yolları:

A) Hava damcı yolu ilə

B) Alimentar yol ilə

C) Hematogen, limfogen, bronxogen

D) Dəri-selikli qişa təması ilə

E) Sputagen yol ilə

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

95) "Nəlbəkidə ikra" simptomu hansı kliniki formaya aidir?

A) Miliar vərəm

snsk.az

B) Yarımkəskin səpələnmiş ağciyər vərəmi

C) Xroniki gedişli səpələnmiş vərəm

D) Kəskin gedişli ağciyər vərəmi

E) Bronxogen səpələnmiş ağciyər vərəmi

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016.

96) Göstərilən xəstəliklərin hansı vərəmə görə risk qrupuna daxildir?

A) Ağciyər qanqrenası

B) Xroniki kolit

C) Xroniki qastrit

D) Şəkərli diabet

E) Ağciyər absesi

Ədəbiyyat: Л.И.Юкелис Флюорография легких Ленинград 1988. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

97) Kliniki gedişə görə səpələnmiş vərəmin neçə forması var?

snsk.az

A) 4 forması var

B) 3 forması var (kəskin, yarımkəskin, xroniki)

C) 1 forması var

D) 5 forması var

E) 2 forması var

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası" Bakı 2003 "Elm" səh 4-56.n Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016

98) Vərəm mikobakteriyasının DNK-sının aşkar olunmasında daha çox istifadə olunan üsul hansıdır?

A) Histolojı müayinə

B) Sitoloji müayinə

C) Bioloji üsul

D) Kultural üsul

E) Molekulyar genetik Genexpert MBT/Rif metodu

Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin erkən aşkarında bakterioloji müayinə metodunun təşkili (metodik təlimat) Bakı 2001. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

snsk.az

99) DOT strategiyası üzrə xəstələr neçə kateqoriyaya bölünür?

A) 8 və daha çox

B) 2

C) 4

D) 6

E) 8

Ədəbiyyat: ÜST-nin vərəmin müalicəsi üçün metodik tövsiyəsi və proqramması 2-ci buraxılış 1998-il. Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəlikləri" dərslik, Bakı 2016. E.N.Məmmədbəyov "Vərəmin aşkarlanması, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşmalar" dərslik, Bakı 2018.

100) Rentgenoqrammada ağciyərlərin yuxarı və orta paylannda torşəkilli fibrozla yanaşı rast gəlinən çoxsaylı polimorf ocaqlann tapılması, ağciyər köklərinin yuxanya doğru dislokasiyası, damcıyabənzər ürək, bazal emfizema vərəmin bu formasını təsdiq edir:

A) Sirrotik vərəm

B) Ocaqlı vərəm

C) Miliar vərəm

D) Yanınkəskin səpələnmiş vərəm

E) Xroniki səpələnmiş vərəm

Ədəbiyyat: Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания. Москва 1988, səh 75-87, 194-333; Ə.B.İnsanov "Vərəm" 2003 səh 226-438; F.M.İsmayılov N.Ə.Abbasov "Vərəm" dərslik. Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004 səh 142-157; Y.Ş.Şıxəliyev "Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda

snsk.az

vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma texnikası” Bakı 2003 “Elm” səh 4-56. Y.Ş.Şıxəliyev “Vərəm xəstəlikləri” dərslik, Bakı 2016

snsk.az