Psixiatriya

1) Şizofreniyanin patogenezində aşağıdakı neyromediatorlardan hansının mübadilə pozğunluğu daha səciyyəvidir?

A) Qlutamin turşusu

B) Asetilxolin

C) Serotonin

D) Dopamin

E) Noradrenalin

Ədəbiyyat: Nadir İsmayılov Psixiatriya, Bakı 2004

2) Aşağıda sadalananlardan hansı anlaqsızlığın tibbi meyarına aid deyil?

A) Digər psixi xəstəlik

B) Kəmağıllıq

C) Affekt vəziyyəti

D) Psixi fəaliyyətin müvəqqəti pozulması

E) Xroniki psixi xəstəlik

Ədəbiyyat: B. Əsədov, R. Qəmərlinski. Məhkəmə Psixiatrik Ekspertizasının Əsasları, Bakı 2010

snsk.az

3) Aşağıdakılardan hansı katatonik şizofreniyanın əlamətlərinə aid deyil?

A) Stupor (ətraf mühütə qarşı reaksiyanın, spontan hərəkətlərin və aktivliyin aşağı düşməsi) və ya mutizm

B) Yüksək özünüdəyərləndirmə və dahilik ideyaları

C) Neqativizm (pozanı dəyişmək və ya yerindən tərpətməyə cəhdə cavab olaraq, əks istiqamətdə mənasız müqavimət və ya hərəkət)

D) Donub qalma (öz arzusu ilə adekvat olmayan və qəribə pozanın alınması və saxlanması)

E) Yüksək plastiklik (bədəni narahat və qəribə vəziyyətdə saxlama)

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г.

4) Zorakılığa məruz qalmış insanlara daha çox rast gəlinən pozuntu hansıdır?

A) reaktiv psixoz

B) təlaş (panik) pozuntusu

C) sosial fobiya

D) post-travmatik stress pozuntusu

E) biopolyar affektiv pozuntu

snsk.az

Ədəbiyyat: İsmayılov N. V., İsmayılov F. N. Tibbi psixologiya və psixoterapiya, 2-ci nəşr, Bakı, 2008

5) Psixi pozuntuları olan xəstənin qeyri-könüllü hospitallaşdırılması üçün nə əsas ola bilər?

1. Psixotik simptomlar (sayıqlama və hallüsinasiyalar)

2. özü və ətrafdakılar üçün birbaşa təhlükə kəsb etmək

3. əsas həyat tələbatlarını ödəmək iqtidarında olmamaq

4. müalicədən imtina

5. sağlamlığına qarşısıalınmaz zərər yetirməsi və müalicəsini mümkünsüz etməsi

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 5

D) 1, 4, 5

E) 2, 4, 5

Ədəbiyyat: Psixiatriya yardımı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bakı, 2011.

6) XBT-10-nun nevrotik pozuntular fəslinə hansı aiddir?

A) şəxsiyyətin anankastik pozuntusu

snsk.az

B) bipolyar affektiv pozuntu

C) siklotimiya

D) rekurrent depressiya

E) post-travmatik stress pozuntusu

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

7) 31 yaşlı kişi ailə münasibətlərindəki problemləri həll etmək üçün psixoterapevtik müalicə alır. Pasiyentin həyat yoldaşına xəyanət etməsi səbəbindən ailəsində problemlər yaranmışdır. Törətdiyi əmələ görə pasiyent dərin peşmançılıq hissi keçirir, özünü daim günahlandırır. Pasiyent həmçinin əmindir ki, terapevt ona qarşı kəskin mənfi münasibət göstərir. Pasiyentin terapevtin ona qarşı münasibəti barədə fikirləri həqiqətə uyğun deyil. Aşağıdakılardan hansı pasiyentin terapevt barədə fikirlərini daha dəqiq əks etdirir?

A) Əks-transfer

B) Repressiya

C) Transfer

D) İndentifikasiya

E) Proyeksiya

Ədəbiyyat: İsmayılov N. V., İsmayılov F. N. Tibbi psixologiya və psixoterapiya, 2-ci nəşr, Bakı, 2008

snsk.az

8) Neyroleptiklərlə müalicə almış 45 yaşlı qadında günəş şüalarının altında gəzdikdən sonra bədənin açıq yerlərində qeyri-bərabər piqmentasiya əmələ gəlmişdir. Aşağıda göstərilən antipsixotik preparatlardan hansı bu vəziyyəti yarada bilər ?

A) Etaperazin

B) Xlorpromazin

C) Olanzapin

D) Klozapin

E) Haloperidol-dekanoat

Ədəbiyyat: Г.И. Каплан, Б.Дж. Сэдок Клиническая психиатрия. Перевод с английского. Издательство: Медицина 1999 г

9) Kütlə qarşısında çıxış etmək və qida qəbul etmək qorxusu, ictimai yerlərdə ünsiyyət qurmaq, iclaslarda iştirak etməkdən çəkinmək hansı diaqnoz üçün xarakterikdir?

A) obsessiv-kompulsiv pozuntu

B) generalizə olunmuş təşviş pozuntusu

C) sosial fobiya

D) spesifik (izolə edilmiş) fobiyalara

E) aqorafobiya

snsk.az

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

10) Aşağıdakı neyroleptiklərdən hansının istifadəsi digərləri ilə müqayisədə şəkərli diabetin inkişafına daha çox səbəb olur?

A) Ziprazidon

B) Klonzapin

C) Olanzapin

D) Paliperidon

E) Haloperidol

Ədəbiyyat: Машковский М. Д. Лекарс твенные средства.— 16-е изд., перераб., испр. и доп.— М.: Новая волна, 2010.— 1216 с.

snsk.az

11) Şizofreniyanın daha çox yayılmış forması hansıdır?

A) Sadə forma

B) Hiberfrenik forma

C) Paranoid forma

D) Katotonik forma

E) Nevrozabənzər forma

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi Şizofreniya diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, Bakı 2009

12) İfadəli produktiv simptomlar şizofreniyanın hansı mərhələsində müşahidə edilir?

A) prodromal mərhələdə

B) remissiya mərhələsində

C) bütün mərhələlərdə

D) kəskin mərhələdə

E) stabilizasiya mərhələsində

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi Şizofreniya diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, Bakı 2009

13) Cədvəllərdən hansı biopolyar affektiv pozuntunun kliniki qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunur?

1. Yanq Cədvəli

2. Yel-Braun Cədvəli

3. Hamilton Cədvəli

snsk.az

4. PANSS Cədvəli

5. Edinburq Cədvəli

A) 3, 4

B) 2, 3

C) 4, 5

D) 1, 2

E) 1, 3

Ədəbiyyat: N. A. Əliyev, F. İ. Məmmədova, M. Z. Sultanov. Əsas psixiatrik reytinq (psixometrik) cədvəllərinin toplumu. Bakı. 2009 il

14) Distimiya hansı psixi pozuntular növünə aiddir?

A) üzvi psixi pozuntulara

B) uşaq və yeniyetməlik dövründə yaranan pozuntulara

C) əhval-ruhiyyə (affektiv) pozuntulara

D) sayıqlama pozuntularına

E) nevrotik pozuntulara

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

snsk.az

15) Depressiyanı hansı halda yalnız ixtisaslaşdırılmış yardım sistemində müalicə etmək lazımdır?

A) depressiyanın bütün hallarında

B) rekurrent depressiya zamanı

C) 12 həftə ərzində terapiyanın rezistentliyi zamanı

D) əgər depressiya təşviş ilə müşayiət olunursa

E) depressiyanın birinci epizodunda

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi Depressiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, Bakı 2009

16) Sadalanan faktorlardan hansı daha çox depressiya zamanı intihar təhlükəsi ilə əlaqədardır?

A) depressiyaya irsi meyillilik

B) spirtli içkilərdən və ya narkotik vasitələrdən istifadə

C) qadın cinsinə mənsubluq

D) orta yaş dövrü

E) hamiləlik

snsk.az

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi Depressiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, Bakı 2009

17) Bipolyar pozuntunun müalicəsində karbomazepinin standart başlanğıc sutkalıq dozası hansı intervaldadır?

A) 400 mq

B) 800 mq

C) 200 mq

D) 100 mq

E) 50 mq

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nəzirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi Bipolyar affektiv pozuntunun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, Bakı 2008

18) Aşağıda göstərilənlərdən hansı preparatın qəbulu zamanı hipotiroidizmin yaranma ehtimalı daha yüksəkdir?

A) Karbamozapin

B) Litium

C) Lamotricinin

D) Paroksetin

E) Fluvoksamin

snsk.az

Ədəbiyyat: Машковский М. Д. Лекарс твенные средства.— 16-е изд., перераб., испр. и доп.— М.: Новая волна, 2010.— 1216 с.

19) 24 yaşlı kişi pasiyent antidepressantla (sertralin 75 mq) qoruyucu müalicə qəbul edir. Pasiyent vaxtaşırı pivə qəbul edir. Hansı əlavə təsirin yaranması ehtimalı daha yüksəkdir?

A) Alkoqolun təsirinin güclənməsi

B) Erektil disfunksiya

C) Alkoqol abstinensiyası

D) Serotonin sindromu

E) Şəkərli diabet

Ədəbiyyat: Машковский М. Д. Лекарс твенные средства.— 16-е изд., перераб., испр. и доп.— М.: Новая волна, 2010.— 1216 с.

20) 32 yaşlı pasiyent ağır dərəcəli depressiv epizod diaqnozu ilə stasionar müalicə alır. Xəstəxanada 12 həftə müddətində dərman müalicəsinin müxtəlif sxemləri tətbiq edilmişdir. Müalicəyə baxmayaraq pasiyentin vəziyyətində yaxşılaşma qeyd olunmayıb. Pasiyentə elektrokonvulsiv terapiya təyin etmək planlaşdırılır. Elektrokonvulsiv terapiya təyin olunan zaman pasiyent sertalin(sutkada 200mq), və lamotrijin (sutkada 300 mq) ilə müalicə alır. Elektrokonvulsiv terapiyanın tətbiqi zamanı medikamentoz müalicə taktikası necə olmalıdır?

A) Sertralin və lamotrijinin dozasını başlanğıc dozaya qədər endirmək

B) Sertralin və lamotrijini kəsmək və elektrokonvulsiv terapiya qurtardıqdan sonra medikamentoz müalicəni davam etdirmək

smsk.az

C) Pasiyentin aldığı medikamentoz müalicəni davam etdirmək

D) Lamotrijini kəsmək və sertralini əvvəlki dozada saxlamaq

E) Sertralini kəsmək və lamotrijini əlləlki dozada saxlamaq

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi. Depressiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009

21) Paranoid şizofreniyaya daha çox xas olan psixi simptomlar hansılardır?

A) Neqativizm

B) Oneyroid tipli düşüncə pozuntusu

C) Psevdohalüsinasiyalar

D) Katalepsiya

E) Apatiya

Ədəbiyyat: Nadir İsmayılov Psixiatriya, Bakı 2004

22) Aşağıdakı preparatlardan tritsiklik antidepressantlara hansı aid deyil?

A) Amitriptilin

B) İmipramin

C) Trazodon

D) Nortriptilin

snsk.az

E) Klomipramin

Ədəbiyyat: Машковский М.Д, Лекарственные средства издание 15, Изд-Новая волна, 2005

23) Neyroleptiklərin M- xolinoblokator təsiri özünü nədə göstərir?

A) Əzələ gərginliyi, hipokineziya, sakitlik tremoru

B) Üz hiperkinezləri (çeynəmə hərəkətləri, dil tremoru, göz qırpma)

C) Patoloji hövsələsizlik

D) Ortostatik hipotoniyada

E) Ağızda quruluq, sidik ifrazın çətinləşməsi, qlaukomanın kəskinləşməsi

Ədəbiyyat: AR Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi, Şizofreniyanın diaqnostikası və mualicəsi uzrə kliniki protokol, Bakı, 2009

24) Akatiziya nə deməkdir?

A) Patoloji hövsələsizlik

B) Ortostatik hipotoniya

C) Əzələ gərginliyi, hipokineziya, sakitlik tremoru

D) Kardioqrammada QT intervalının uzadılması

E) Üz hiperkinezləri (çeynəmə hərəkətləri, dil tremoru, göz qırpma)

snsk.az

Ədəbiyyat: AR Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi, Şizofreniyanın diaqnostikası və mualicəsi uzrə kliniki protokol, Bakı, 2009

25) Yuxunun deprivasiyası metodu hansı pozuntunun müalicəsində istifadə olunur?

A) Nevrasteniya

B) Şizofreniya

C) Depressiya

D) Hamısı düzdür

E) Epilepsiya

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nəzirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi Depressiyanın diaqnostika və mualicəsi uzrə klinik protokol, Bakı 2008

26) Asetilxolinin metabolizminin inhibitoru olan takrin preparatından hansı pozuntular zamanı istifadə olunur?

A) Şizofreniya

B) Kəllə-beyin travması

C) Altsheymer xəstəliyi

D) Bipolyar affektiv pozuntu

E) Epilepsiya

snsk.az

Ədəbiyyat: Г.И. Каплан, Б.Дж. Сэдок Клиническая психиатрия. Перевод с английского. Издательство: Медицина 1999 г

27) Gecə enurezi müalicəsi zamanı bunlarda ən effektli olanı hansıdır?

A) Fluoksetin

B) Sitalopram

C) İmipramin

D) Trazadon

E) Milnasepran

Ədəbiyyat: Г.И. Каплан, Б.Дж. Сэдок Клиническая психиатрия. Перевод с английского. Издательство: Медицина 1999 г

snsk.az

28) Antidepressantlar hansı hallarda effektiv deyil?

A) Deliriy

B) Depressiya

C) Obsessiv-kompulsiv pozuntu

D) Bulimiya

E) Enurez

Ədəbiyyat: Филипп Дж. Яничак, Джон М. Дэвис, Шелдон Х. Прексорн, Фрэнк Дж. Айд Принципы и практика психофармакологии (пер с англ) Киев Ника-Центр 1999

29) Katatonik şizofreniyaya aşağıda qeyd olunanlardan hansı xas deyil?

A) Ambulator avtomatizm

B) Oyanıqlıq

C) Rigidlik

D) Stupor

E) Neqativizm

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, КЛАСС V МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ (10-й ПЕРЕСМОТР); КЛАССИФИКАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г.

30) Bu preparatlardan daha çox dərman asılılığı yaradanı hansıdır?

A) Antidepressantlar

B) Nootroplar

C) Trankvilizatorlar (anksiolitiklər)

D) Neyroleptiklər

E) Normotimiklər (əhval-ruhiyyə stabilizatorları)

Ədəbiyyat: Машковский М.Д, Лекарственные средства издание 15, Изд-Новая волна, 2005

snsk.az

31) Ən çox antixolinergetik kənar təsirləri yaradan preparatı hansıdır?

A) Klassik neyroleptiklər

B) Normotimiklər (əhval-ruhiyyə stabilizatorları)

C) Trankvilizatorlar (anksiolitiklər)

D) Tritsiklik Antidepressantlar

E) Nootroplar

Ədəbiyyat: Машковский М.Д, Лекарственные средства издание 15, Изд-Новая волна, 2005

32) Psixopatoloji simptomatikanın olmaması aşağıdakılardan hansı üçün səciyyəvidir?

A) Bipolyar pozuntu üçün xarakterik deyil

B) Bipolyar pozuntunun bütün epizodlar çərçivəsində qeyd olunur

C) Bipolyar pozuntu – maniakal epizod

D) Bipolyar pozuntu – depressiv epizod

E) Bipolyar pozuntu – intermissiya dövrü

Ədəbiyyat: Nadir İsmayılov Psixiatriya, Bakı 2004

snsk.az

33) Droperidol, Haloperidol və Trifluperidolun (trisedil) kimyəvi tərkibi nədən ibarətdir?

A) Tioksantenlər

B) Butirofenonlar

C) Alifatik fenotiozinlər

D) Piperidin fenotiazinlər

E) Piperazin fenotiazinlər

Ədəbiyyat: Машковский М.Д, Лекарственные средства издание 15, Изд-Новая волна, 2005

34) Xlorpromazin (aminazin), Promazin (propazin) və Levomepromazinin (tizersin) kimyəvi tərkibi nədən ibarətdir?

A) Tioksantenlər

B) Butirofenonlar

C) Piperazin fenotiazinlər

D) Alifatik fenotiazinlər

E) Piperidin fenotiazinlər

Ədəbiyyat: Машковский М.Д, Лекарственные средства издание 15, Изд-Новая волна, 2005

smsk.az

35) Depressiv epizod diaqnozunu qoymaq üçün depressiya əlamətləri neçə müddət davam etməlidir?

A) 1 aydan az olmayaraq

B) 2 həftədən az olmayaraq

C) 2 aydan az olmayaraq

D) 1 həftədən az olmayaraq

E) Müddət diaqnostik əhəmiyyət daşımır

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi Depressiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, Bakı 2008

36) Maniakal epizodun müalicəsində istifadə olunmayan preparat hansıdır?

A) Karbamazepin

B) Olanzapin

C) Metilfenidat

D) Litium duzları

E) Natrium Valproat

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi Bipolyar affektiv pozuntunun diaqnostika və müalicəsi üzrə kliniki protokol, Bakı 2008

snsk.az

37) Hallüsinasiyalar aşağıdakılardan hansı üçün tipik deyil?

A) Şizofreniya

B) Şizoaffektiv pozuntu

C) Alkoqol psixozu

D) İnfeksion psixoz

E) Psixotik əlamətlərlə maniakal epizod

Ədəbiyyat: Г.И. Каплан, Б.Дж. Сэдок Клиническая психиатрия. Перевод с английского. Издательство: Медицина 1999 г

38) Deley və Denniker tərəfindən kəşf edilmiş ilk neyroleptik necə adlanır?

A) Rezerpin

B) Levomepromazin

C) Tioridazin

D) Haloperidol

E) Xlorpromazin

Ədəbiyyat: Машковский М.Д, Лекарственные средства издание 15, Изд-Новая волна, 2005

39) Böyüklər üçün haloperidolun orta sutkalıq dozası nə qədərdir?

snsk.az

A) 10-30 mq

B) 1,5-4 mq

C) 300-600 mq

D) 60-100 mq

E) 30-80 mq

Ədəbiyyat: Машковский М.Д, Лекарственные средства издание 15, Изд-Новая волна, 2005

40) Litiumun qəbulu zamanı ən yaxşı profilaktik təsir hansı xəstəliyə məruz qalmış pasiyentlərdə müşahidə edilir?

A) Qeyd olunan bütün pozuntulara

B) Rekurrent depressiyaya

C) Bipolyar pozuntuya

D) Obsessiv-kompulsiv pozuntulara

E) Şizofreniyaya

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi Bipolyar affektiv pozuntunun diaqnostika və müalicəsi üzrə kliniki protokol, Bakı 2008

41) "Psixotik əlamətlərsiz maniya epizodu" diaqnozunu qoymaq üçün ən azı nə qədər müddət tələb olunur?

A) İki həftə

B) Bir həftə

snsk.az

C) Beş həftə

D) Üç həftə

E) Dörd həftə

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

42) Fenelzin hansı sinif antidepressantlara aiddir?

A) MAO geri dönməyən inhibitor

B) Monoaminlərin geri udulmasının qeyri-sellektiv inhibitoru

C) MAO geri dönən inhibitor

D) Antidepressiv təsirə malik deyil

E) Serotoninin geri udulmasının sellektiv inhibitoru

Ədəbiyyat: Машковский М.Д, Лекарственные средства издание 15, Изд-Новая волна, 2005

43) Tipik depressiv epizodların hər 3 ağırlıq səviyyəsinə aşağıdakı kriteriyalardan hansı uyğun deyil?

A) Epizodu psixoaktiv maddənin istifadə olunması ilə əlaqəndirmək mümkün deyil

B) Epizodu istənilən üzvi psixi pozuntu ilə izah etmək olmaz

snsk.az

C) Depressiv epizod 2 həftədən artıq davam etməməlidir

D) Anamnezdə heç vaxt hipomaniakal və maniakal simptomlar olmayır

E) Depressiv simptomlar 2 həftədən çox davam edilməlidir

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

44) Fluoksetin hansı sinif psixotrop maddələrə aiddir?

A) Antidepressant

B) Antikonvulsant

C) Nootrop

D) Anksiolitik

E) Antipsixotik

Ədəbiyyat: Машковский М.Д, Лекарственные средства издание 15, Изд-Новая волна, 2005

45) Sertralin hansı qrup antidepressantlara aiddir?

A) MAO inhibitor

B) Trisiklik (TSA)

C) Serotonin interreseptor udulmasının seçici inhibitor (SİUSİ)

D) Andidepressant deyil

snsk.az

E) Serotonin və noradrenalin interreseptor udulmansının seçici inhibitor (SNİUSİ)

Ədəbiyyat: Машковский М.Д, Лекарственные средства издание 15, Изд-Новая волна, 2005

46) Pozitiv və Neqativ Simptomlar Cədvəlində neçə pozitiv əlamət qiymətləndirilir?

A) 20

B) 16

C) 14

D) 7

E) 10

Ədəbiyyat: N.A. Əliyev, F.İ. Məmmədova, M.Z. Sultanov. Əsas psixiatrik reytinq (psixometrik) cədvəllərinin toplumu. Bakı. 2009-cu il

47) Aşağıda sadalanan Hamiltonun Depressiya Reytinqi Cədvəlinin ümumi balın hansı göstəriciləri yüngül dərəcəli depressiv pozuntunun olmasını bildirir?

A) 19-22 ball

B) 1-3 ball

C) 14-18 ball

D) 3-7 ball

E) 8-13 ball

snsk.az

Ədəbiyyat: N.A. Əliyev, F.İ. Məmmədova, M.Z. Sultanov. Əsas psixiatrik reytinq (psixometrik) cədvəllərinin toplumu. Bakı. 2009 -cu il

48) Lyuşer testində nədən istifadə edilir?

A) Adam şəkillərindən

B) Piktoqramlardan

C) Müxtəlif rəngli kağız parçalarından

D) Həyat sujetlərinin təsviri verilmiş rəsmlərdən

E) Mürəkkəb ləkələrindən

Ədəbiyyat: Жариков Н.М., Тюльпин Ю.Т. Психиатрия. Москва. Издательство «Медицина» 2000 г.

49) Psixotik depressiv epizoda ən çox hansı xarakterikdir?

A) Özünü böyütmə sayıqlaması

B) Özünütəqsirləndirmə sayıqlaması

C) Qısqanclıq sayıqlaması

D) Təsir sayıqlaması

E) Təqib sayıqlaması

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi Depressiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə kliniki protokol, Bakı 2008

snsk.az

50) Özünə məxsus fikir, hiss və arzuların qeyri-şüuri olaraq başqalarının ayağına yazmaq necə adlanır?

A) Proyeksiya

B) Sıxışdırıb çıxarma

C) Rasionalizasiya

D) İnkar etmə

E) Reqressiya

Ədəbiyyat: İsmayılov N.V., İsmayılov F.N. Tibbi psixologiya və psixoterapiya, 2-ci nəşr, Bakı, 2008

51) Aşağıdakı fikirlərdən hansı tsiklotimiyaya aid deyil?

A) Tsiklotimiyanın gedişatı bütün yaşlı dövrdə davam edə bilər

B) Tsiklotimiyaya bipolyar affektiv pozuntusu olan xəstələrin qohumlarında tez-tez rast gəlinir

C) Əhval-ruhiyyə dəyişikliyinin ayrı-ayrı epizodları maniakal epizodun dəqiq kriterilərinə cavab verir

D) Tsiklotimiya adətən gənc yaşlarda inkişaf edir

E) Tsiklotimiyalı bəzi şəxslər nəticədə bipolyar affektiv pozuntudan əziyyət çəkə bilərlər

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация

snsk.az

ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

52) Atipik depressiyaya xarakterik olan xüsusiyyət hansıdır?

A) Psixotik əlamətlər

B) Pozitiv hadisələrə cavab olaraq əhval-ruhiyyənin qısamüddətli yaxşılaşması

C) Şəxsiyyətlərarası münasibətlərin pozulmasına biganəlik

D) Yuxusuzluq

E) İştahanın və ya çəkinin azalması

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi Depressiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, Bakı 2008

53) Daha erkən yaş dövrünə xas olan davranış tərzinə qayıtma necə adlanır?

A) Rasionalizasiya

B) İnkar etmə

C) Reqressiya

D) Sıxışdırıb çıxarma

E) Affektin təcrid edilməsi

Ədəbiyyat: İsmayılov N.V., İsmayılov F.N. Tibbi psixologiya və psixoterapiya, 2-ci nəşr, Bakı, 2008

snsk.az

54) Hərəki aktivliyin yüksəlməsi, coşğun fəaliyyətə olan meyllik hansı sindrom üçün daha xarakterik dir?

A) Obsessiv-kompulsiv sindromun

B) Sadalanan bütün sindromların

C) Sadalanan sindromlardan heç birinin

D) Depressiv sindromun

E) Maniakal sindromun

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

55) Diqqət yayınmasının artması nəyin xarakterik əlamətidir?

A) Depressiv sindromun

B) Obsessiv-kompulsiv sindromun

C) Sadalanan bütün sindromların

D) Maniakal sindromun

E) Sadalanan sindromlardan heç birinin

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

snsk.az

56) Hipomaniakal sindrom zamanı sadalananlardan hansına rast gəlinmir?

A) Öz imkanlarını yüksək dəyərləndirmək

B) Ünsiyyətə can atmaq

C) Hiperseksuallıq

D) Diqqət yayınmasının artmasına

E) Xaotik-impulsiv hərəkətlərə

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

57) Z. Freydin nəzəriyyəsinə görə, psixoseksual inkişaf necə gedir?

A) Genital mərhələ, fallik mərhələ, oral mərhələ, Edip kompleksi mərhələsi

B) Oral mərhələ, Edip kompleksi mərhələsi, anal mərhələ, genital mərhələ, latent mərhələ

C) Oral mərhələ, anal mərhələ, fallik mərhələ, Edip kompleksi mərhələsi, latent mərhələ, genital mərhələ

D) Latent mərhələ, oral mərhələ, anal mərhələ, fallik mərhələ, Edip kompleksi mərhələsi, genital mərhələ

E) Edip kompleksi mərhələsi, oral mərhələ, anal mərhələ, fallik mərhələ, genital mərhələ

sinsk.az

Ədəbiyyat: İsmayılov N.V., İsmayılov F.N. Tibbi psixologiya və psixoterapiya, 2-ci nəşr, Bakı, 2008

58) "İntermissiya" anlayışını daha dəqiq ifadə edən tərif hansıdır?

A) Depressiya və maniya arasında aralıq vəziyyət

B) İki tutma arasında psixi pozuntu əlamətlərin tam keçməsi dövrü

C) Depressiya və maniya əlamətlərinin uzlaşması

D) Bipolyar pozuntu zamanı funksianal dezadaptasiya vəziyyəti

E) Tam remissiya səviyyəsinə çatmayan müvəqqəti əhval yaxşılaşması

Ədəbiyyat: Nadir İsmayılov Psixiatriya, Bakı 2004

59) Bipolyar pozuntunun maniakal epizodların davametmə müddəti:

A) Depressiv epizodlardan uzundur

B) Depressiv epizodlardan qısadır

C) Depressiv epizodların davametmə müddəti qədərdir

D) Əvvəlki epizodların sayından asılıdır

E) Xəstəliyin "başlanma yaşı"ndan asılıdır

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi Bipolyar affektiv pozuntunun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, Bakı 2008

snsk.az

60) Bunlardan hansı koqnitiv-davranış terapiyasının koqnitiv texnikasına aid deyil?

A) Məntiqi səhvlərin analizi

B) Yuxugörmələrin analizi

C) Problem həllərinin axtarışı

D) Fikirlərin dayandırılması

E) Avtomatik fikirlərin aşkara çıxarılması

Ədəbiyyat: İsmayılov N.V., İsmayılov F.N. Tibbi psixologiya və psixoterapiya, 2-ci nəşr, Bakı, 2008

snsk.az

61) Posttravmatik stress pozuntusu üçün göstərilənlərdən hansı düzgündür?

A) Üzvi tipli ağır qüsura gətirib çıxarır

B) Ağır travmatik hadisədən sonra 6 ay müddətində baş verir

C) Minimum 2 il müddətində qeyd olunmalıdır

D) Sarsıntıdan 24-28 saat sonra keçib getməyə başlayır

E) Ağır baş-beyin travmasından sonra baş verir

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация

ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

62) Fiziki pozuntularla izah edilə bilinməyən və həkimlər tərəfindən heç bir patologiyanın olmadığının bildirilməsi zamanı belə, buna inanmayan, müxtəlif somatik simptomlardan şikayətlənən xəstə daim həkim təkrar məsləhətlərini almağa cəhd göstərir. Ehtimalı daha çox olan diaqnozu göstərin.

A) Şizofreniya

B) Bipolyar pozuntu (depressiv epizod)

C) İpoxondrik pozuntu

D) Nevrosteniya

E) Somatoform pozuntu

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

63) Aşağıda göstərilən situasiyaların hansında aqorafobiyada olan xəstədə təşviş yaranmır?

A) Evdən kənar hərəkət etmə

B) İctimai yerlər

C) Əlverişsiz metereoloji şərait

D) İnsan kütləsi

E) Tək-tənha səyahət

smsk.az

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

64) Paroksizmal həyəcan neçə vaxt davam etdikdə panik pozuntu diaqnozu təyin edilir?

A) 2 həftə

B) 1 ay

C) 3 ay

D) 2,5 ay

E) 2 ay

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

65) Obsessiv-kompulsiv pozuntu adətən hansı yaşda başlanır?

A) Ahıl yaşlarında

B) Uşaq və ya yeniyetməlik yaşlarında

C) Yetkin yaşlarda

D) Erkən uşaqlıq dövründə

E) Yaşın əhəmiyyəti yoxdur

sinsk.az

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

66) Əvvəllər baş vermiş bədbəxt və ağır hadisədən bir neçə ay sonra yaranmış, keçirilmiş hadisə ilə bağlı parlaq sarışan xatirələr(flaşbek), başqa insanlardan təcrid olunmağa meyllik, ətraf sosial hətata emosional reaksiyanın zəyifləməsi hansı pozuntuya xasdır?

A) Depressiv pozuntu

B) Şizofreniya

C) Dissosiativ pozuntu

D) Posttravmatik stress pozuntusu

E) Obsessiv-kompulsiv pozuntu

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

67) İnterpersonal psixoterapiya apararkən aşağıda göstərilən psixoterapevtik üsulların hansından istifadə edilmir?

A) Rol oyunu

B) Transfer analizi

C) Ünsiyyət analizi

ynsk.az

D) Aydınlaşdırma

E) Sosial aktivliyin stimulyasiyası

Ədəbiyyat: G. Gəraybəyli, M. Sultanov, R. Qəmərlinski İnterpersonal psixoterapiya, Bakı 2010

68) 24 yaşlı pasiyent şikayətlənir ki, yeniyetmə yaşlarından utancaqlıqdan ictimai ayaqyolundan istifadə edə bilmir. Pasiyentə tez-tez özünü evə çatdıra bilməyəcəyinə dair fikirlər və qorxular qeydə alınır ki, bu da onu daim gərginlik içərisində saxlayır. Daha çox ehtimal edilən diaqnoz hansıdır?

A) Şəxsiyyətin emosional-davamsız pozuntusu (sərhədli tip)

B) Obsessiv-kompulsiv pozuntu

C) Depressiv pozuntu

D) Tələşlı pozuntu

E) Sosial fobiya

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

69) Aqorafobiyanın diaqnostik kriterilərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Tək-tənha səyahət şəraitində yarana bilər

B) Təşviş nəticəsində vegetativ simptomlar qeydə alınır

C) Fobiyalı vəziyyətlərdən çəkinmə qeyd olunur

D) İzdihamlı yerlərdə, evdən kənarda olan şəraitində yarana bilər

snsk.az

E) Heç olmazsa, iki həftə ərzində bütün günü və ya sutkanın əksər hissəsində əhval-ruhiyyənin aşağı olması qeydə alınır

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

70) Bunlardan ailə psixoterapiyasının məqsədinə aid olmayanı hansıdır?

A) Müxtəlif cinslər və nəsillər arasında rol əlaqələrinin normallaşdırılması

B) Bir-birininin emosional tələbatlarını qəbul etmək və başa düşmək

C) Ailə üzvlərinin ailə daxilində və ailədən kənar problemlərin həll etmək qabiliyyətinin artması

D) Ailədə patogen münaqişənin həll olunması və ya zəiflədilməsi

E) Psixoseksual inkişaf mərhələlərinin erkən uşaq yaşlarında müəyyənləşdirilməsi

Ədəbiyyat: Г.И. Каплан, Б.Дж. Сэдок Клиническая психиатрия. Перевод с английского. Издательство: Медицина 1999 г

71) İstintaq materialından məlumdur ki, təqsirləndirilən şəxs arvadının ayrılmaq niyyətindən xəbər tutaraq, bıçağa əl atıb və ona öldürücü zərbə endirib. Söhbət hansı pozuntudan gedir?

A) Fizioloji affekt

B) Qısqanclıq sayıqlaması

snsk.az

C) Diaqnostika üçün məlumat kifayət qədər deyil

D) Psixi pozuntu əlamətləri yoxdur

E) Patoloji affekt

Ədəbiyyat: Жариков Н.М., Тюльпин Ю.Т. Психиатрия. Москва. Издательство «Медицина» 2000 г.

72) 28 yaşlı xəstə qadın baş ağrılarından, yuxusuzluqdan, daimi gərginlik hissindən, özünün və ya uşaqlarının başına gələ biləcək bədbəxt hadisələrlə bağlı qorxulardan şikayətlənir. Belə vəziyyət artıq bir neçə aydır ki, davam edir. Ehtimalı daha çox olan diaqnoz hansıdır?

A) Obsessiv-kompulsiv pozuntu

B) Panik pozuntu

C) Sosial pozuntu

D) Generalizə olunmuş təşvişl pozuntu

E) Depressiv pozuntu

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

73) Hansı pozuntular zamanı tam sağalma mümkündür?

A) Qeyd olunan bütün pozuntular zamanı

B) Obsessiv-kompulsiv pozuntu

C) Dissosiativ pozuntu

snsk.az

D) Fobik pozuntu

E) Pozuntuların heç birində

Ədəbiyyat: Г.И. Каплан, Б.Дж. Сэдок Клиническая психиатрия. Перевод с английского. Издательство: Медицина 1999 г

74) İctimai-təhlükə törədən şizofreniyalı xəstə hansı halda anlaqlı qəbul edilir?

A) Anlaqlı qəbul edilə bilməz

B) Sabit remissiya vəziyyətində

C) İfadə olunmuş şəxsiyyət dəyişiklikləri zamanı

D) Kəskin psixotik vəziyyətdə

E) Həmişə anlaqlı hesab edilir

Ədəbiyyat: Nadir İsmayılov Psixiatriya, Bakı 2004

75) Əgər şəxs sui-qəsdə cəhd göstəribsə və müayinədən keçməyə razılıq vermirsə, həkim-psixiatr hansı tədbirlərə əl atmalıdır?

A) Yaxın qohumlarından müayinə üçün ərizə almalıdır

B) Müayinədən imtina etməlidir

C) Yerli icra orqanlarına müraciət etməlidir

D) Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir

E) Şəxsi onun razılığı olmadan müayinədən keçirməyə qərar verməlidir

snsk.az

Ədəbiyyat: Psixiatriya yardımı haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu

76) Konversiya mexanizmi üzrə yaranmış simptomlar hansı pozuntuda üstünlük təşkil edir?

A) Posttravmatik stress pozuntusu

B) Generalizə olunmuş təşvişli pozuntu

C) Dissosiativ pozuntu

D) Təcrid olunmuş (adi) fobiyalar

E) Obsessiv-kompulsiv pozuntu

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

77) Qanzer sindromunu təşkil edən əlamətlər hansıdır?

A) Sarışan hərəkətlər (kompulsiyalar)

B) Adi suallara cavab verə bilməmək və məsələləri həll etmək iqtidarında olmamaq

C) Aqressiv xaotik oyanma

D) Düşüncənin alaqaranlıq halı

E) Kədərli və qəzəbli əhval-ruhiyyə (disforiya)

smsk.az

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

78) Dissosiativ pozuntu aşağıda göstərilən simptomlardan hansı ilə müşayiət edilmir?

A) Sayıqlama ideyaları

B) Düşüncənin daralması

C) Davranışın nümayişkaranəliyi

D) Puerilizm

E) Boğazda “qəhər” hissi

Ədəbiyyat: Nadir İsmayılov Psixiatriya, Bakı 2004

79) Nevrasteniyalı xəstələrdə göstərilən əlamətlərdən hansı müşahidə olunmur?

A) Yüksək əsəbilik

B) Ümumi əzginlik

C) Tez yorulma

D) İpoxondrik sayıqlama

E) Baş ağrısı

Ədəbiyyat: Nadir İsmayılov Psixiatriya, Bakı 2004

snsk.az

80) Trixotillomaniya nədir?

A) Saçları yolmağa sarışan meyl

B) Zöhrəvi xəstəliyinə tutulma qorxusu (AİDS də daxil olmaqla)

C) Zorakı (impulsiv) hərəkətlər

D) Səfilliyə meyl

E) Kompulsiv hərəkətlər

Ədəbiyyat: Nadir İsmayılov Psixiatriya, Bakı 2004

81) Sadalananlardan hansı nozofobiyalara aid deyil?

A) Kanserofobiya

B) Sifilofobiya

C) Klaustrofobiya

D) Kardiofobiya

E) Spidofobiya

Ədəbiyyat: Nadir İsmayılov Psixiatriya, Bakı 2004

82) Aşağıdakı əlamətlərdən hansı isterik və epileptik tutmaları differensasiya etmək üçün əsas deyil?

snsk.az

A) Ətrafda baş verənləri qəbul etmək və dəyərləndirmək bacarığının qorunub saxlanması

B) Nümayişkarlıq

C) Psixogen faktorun olması

D) Başvermənin qəfilliyi

E) Göz bəbəklərinin işığa reaksiyasını qoruyub saxlaması

Ədəbiyyat: Nadir İsmayılov Psixiatriya, Bakı 2004

83) Yüksək yorğunluqla müşayiət edilən əsəbi zəiflik və vegetativ pozuntuların uzlaşması necə adlanır?

A) Həyəcan

B) Fobiya

C) Asteniya

D) Obsessiya

E) İsteriya

Ədəbiyyat: Nadir İsmayılov Psixiatriya, Bakı 2004

84) 44 yaşlı xəstədə tez-tez səbəbsiz daxili gərginlik halları yaranır. Həmin vəziyyəti təsfir edərkən "Mənə daim elə gəlir ki, nə isə pis bir şey baş verməlidir" deyir. Daxili gərginlik zamanı onda qan təzyiqinin yüksəlməsi, ürəkdöyünmə, baş ağrıları qeyd olunur. Xəstənin fikrinə görə bu, Bu gərginlik ona gündəlik həyat fəaliyyətində mane olur. Daha çox ehtimal edilən diaqnoz hansıdır?

snsk.az

A) Nevrosteniya

B) Generalizə olunmuş təşviş pozuntu

C) Obsessiv-kompulsiv pozuntu

D) Dissosiativ pozuntu

E) İpoxondrik pozuntu

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

85) Parkinson xəstəliyi zamanı bu metodlardan beyin zədələnməsinin neyroanotomik xarakteristikasını müəyyənləşdirəni hansıdır?

A) Nüvə-maqnit rezonansı

B) Bütün metodlar

C) Elektroensefaloqrafiya

D) Reoensefaloqrafiya

E) Kompyuter tomoqrafiyası

Ədəbiyyat: Г.И. Каплан, Б.Дж. Сэдок Клиническая психиатрия. Перевод с английского. Издательство: Медицина 1999 г

86) Nəticələr barədə düşünmədən hərəkət etmək tendensiyasının qabarıq ifadə olunması, əhval-ruhiyyənin dayanıqsızlığı, ətrafdakıların ittihamlarına cavab

snsk.az

olan və əksərən zorakarlığa gətirib çıxaran intensiv qəzəbli affekt coşmalar hansı şəxsiyyət pozuntusuna aiddir?

A) Şəxsiyyətin dissosial pozuntusu

B) Emosional davamsız şəxsiyyət pozuntusu (sərhədli tip)

C) Şəxsiyyətin təşvişli pozuntusu

D) Şəxsiyyətin isterik pozuntusu

E) Emosional davamsız şəxsiyyət pozuntusu (impulsiv tip)

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

87) Kliniki psixoloqun funksiyasına aid olmayanı hansıdır?

A) Psixi pozuntuları olan şəxslərin dərman terapiyası

B) Psixi pozuntuları olan şəxslərin psixoterapiyası

C) Sadalananların heç biri

D) Psixi pozuntuları olan şəxslərin psixoloji ekspertizası

E) Psixi pozuntuları olan şəxslərin müayinəsi

Ədəbiyyat: İsmayılov N.V., İsmayılov F.N. Tibbi psixologiya və psixoterapiya, 2-ci nəşr, Bakı, 2008

snsk.az

88) Aşağıdakı seksual pozuntulardan ən təhlükəlisi hansıdır?

A) Fetişizm

B) Transvestizm

C) Pedofiliya

D) Transseksualizm

E) Vuayerizm

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998

89) V kurs tələbəsi onda pornosaytları seyr etməyə qarşısıalınmaz həvəsin yarandığını bildirib. Cinsi ehtiras yalnız başqalarının seksual münasibətlərini izləyərkən yaranır və masturbasiya ilə müşayiət edilir. Real cinsi əlaqəyə girmək istəyi yoxdur. Söhbət hansı pozuntudan gedir?

A) Transvestizm

B) Eksqibisionizm

C) Fetişizm

D) Vuayerizm

E) İmpotensiya

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

smsk.az

90) Aşağıdakılardan cinsi mənsubiyyətin pozuntusuna aid olmayanı hansıdır?

A) Homoseksualizm

B) Qızlarda cinsi mənsubiyyətin pozulması

C) Oğlanlarda cinsi mənsubiyyətin pozulması

D) Transseksualizm

E) Transvestizm

Ədəbiyyat: Всемирная Организация Здравоохранения, Класс V Международной классификации болезней (10-й пересмотр); Классификация ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ; Клинические описания и указания по диагностике Geneva1992, (пер с англ) Москва 1998 г

91) Bu psixi pozuntulardan ürəyin işemik xəstəliyi üçün daha çox xarakterik olanı hansıdır?

A) Total ağıl zəifliyi fonunda epileptik tutmalar

B) Psixi avtomatizmlərlə müşayiət olunan artan amneziya

C) Yaddaş pozulması ilə müşayiət olunan verbal hallüsinoz

D) Astenik əlamətlərin üsünlüyü ilə keçən nevrotik pozuntular

E) Təqib sayıqlaması ilə müşayiət olunanverbal hallüsinoz

Ədəbiyyat: İsmayılov N.V., İsmayılov F.N. Tibbi psixologiya və psixoterapiya, 2-ci nəşr, Bakı, 2008

snsk.az

92) Pellaqra zamanı yaranan psixi pozulmaların əsas müalicə metodu hansıdır?

A) Nikotin turşusunun yüksək dozalarla qəbul olunması

B) Antidepressantların standart dozaları

C) Nootropların standart dozaları

D) B6 vitaminin yüksək dozalarla qəbul olunması

E) Antiretrovirus terapiyası

Ədəbiyyat: İsmayılov N.V., İsmayılov F.N. Tibbi psixologiya və psixoterapiya, 2-ci nəşr, Bakı, 2008

93) Oliqofreniyanın ən ağır ifadə olunmuş forması hansıdır?

A) İmbesillik

B) İdiotiya

C) Lakunar (natamam) demensiya

D) Debillik

E) Total demensiya

Ədəbiyyat: İsmayılov N.V., İsmayılov F.N. Tibbi psixologiya və psixoterapiya, 2-ci nəşr, Bakı, 2008

94)) Eyni zamanda iki bir-birinə zidd emosional halın meydana çıxması necə adlanır?

snsk.az

A) Ambivalentlik

B) Emosional zəiflik

C) Patoloji affekt

D) Emosional kütlük

E) Emosional ləbillik

Ədəbiyyat: İsmayılov N.V., İsmayılov F.N. Tibbi psixologiya və psixoterapiya, 2-ci nəşr, Bakı, 2008

95) Dərin düşüncə pozuntusundan ayılandan sonra caryan edən hadisələrin bir neçə gün sonra xəstənin yaddaşından silinməsi necə adlanır?

A) Dismneziya

B) Retroqrad amneziya

C) Paramneziya

D) Anteroqrad amneziya

E) Fiksasion amneziyası

Ədəbiyyat: Жариков Н.М., Тюльпин Ю.Т. Психиатрия. Москва. Издательство «Медицина» 2000 г.Düzeliş aparıldı professor Bilal Əsədov17.12.2018

96) Sadalanan pozuntulardan produktiv simptomatikaya aid olmayanı hansıdır?

snsk.az

A) Düşüncə pozuntusu

B) Hallüsinasiyalar

C) Sayıqlama

D) Affektin kütləşməsi

E) Depressiya

Ədəbiyyat: Жариков Н.М., Тюльпин Ю.Т. Психиатрия. Москва. Издательство «Медицина» 2000 г.

97) Bu pozuntulardan yaddaş pozulmasına aid olmayanı hansıdır?

A) Amneziya

B) Hipomneziya

C) Perseverasiya

D) Hipermneziya

E) Psevdoreminssensiya

Ədəbiyyat: İsmayılov N.V., İsmayılov F.N. Tibbi psixologiya və psixoterapiya, 2-ci nəşr, Bakı, 2008

98) Aşağıdakılardan hallüsinasiyalar üçün xarakterik olanı hansıdır?

snsk.az

A) Reallıqda mövcud olmayan obyekt və ya hadisənin yanlış qavranmasıdır

B) Yuxarıda sadalananların hamısı doğrudur

C) Reallıqda mövcud olan obyekt və ya hadisənin təhrif olunmuş qavranmasıdır

D) Neqativ simptomlara aiddir

E) Yalnız şizofreniya və digər endogen psixozlarda rast gəlinir

99) Neyrotransmitteri müəyyən edən aşağıdakı kriterilərdən hansı yanlışdır?

A) Stimulyasiya (membranın depolyarizasiyası) edildikdə ifraz olunur

B) Monoaminləri presinaptik neyronun qovuqlarına aparan daşıyıcı zülal

C) Sinir hüceyrəsinin presinaptik terminalında (qurtaracağında) yerləşir

D) Presinaptik neyronla sintez olunur

E) Spesifik reseptoru var

Ədəbiyyat: Жариков Н.М., Тюльпин Ю.Т. Психиатрия. Москва. Издательство «Медицина» 2000 г.

100) Serotonin hansı maddədən yaranır?

A) Qlutamin turşusu

B) Xolin

C) Triptofan

snsk.az

D) Noradrenalin

E) L-dofa

Ədəbiyyat: Жариков Н.М., Тюльпин Ю.Т. Психиатрия. Москва. Издательство «Медицина» 2000 г.

snsk.az